

叶兴阳

双语音标有声读物

叶兴阳
英语教育创始人
双音阅读教育创始人

中国英语教育界领军人物
英语教育界领军人物
英语教育界领军人物

双语音标 阅读创始人

注音阅 读英语 教育之父

叶兴阳

叶兴阳先生是著名英语教育专家，曾任教于多所知名大学，从事英语教学工作多年，具有丰富的教学经验和深厚的学术造诣。

叶兴阳先生是著名英语教育专家，曾任教于多所知名大学，从事英语教学工作多年，具有丰富的教学经验和深厚的学术造诣。他致力于英语教育研究，特别是在英语发音和听力理解方面有着独到的见解。他的研究成果广泛应用于英语教学中，为提高学生的英语水平做出了重要贡献。

叶兴阳先生是著名英语教育专家，曾任教于多所知名大学，从事英语教学工作多年，具有丰富的教学经验和深厚的学术造诣。他致力于英语教育研究，特别是在英语发音和听力理解方面有着独到的见解。他的研究成果广泛应用于英语教学中，为提高学生的英语水平做出了重要贡献。

叶兴阳先生是著名英语教育专家，曾任教于多所知名大学，从事英语教学工作多年，具有丰富的教学经验和深厚的学术造诣。他致力于英语教育研究，特别是在英语发音和听力理解方面有着独到的见解。他的研究成果广泛应用于英语教学中，为提高学生的英语水平做出了重要贡献。

叶兴阳先生是著名英语教育专家，曾任教于多所知名大学，从事英语教学工作多年，具有丰富的教学经验和深厚的学术造诣。他致力于英语教育研究，特别是在英语发音和听力理解方面有着独到的见解。他的研究成果广泛应用于英语教学中，为提高学生的英语水平做出了重要贡献。

叶兴阳先生是著名英语教育专家，曾任教于多所知名大学，从事英语教学工作多年，具有丰富的教学经验和深厚的学术造诣。他致力于英语教育研究，特别是在英语发音和听力理解方面有着独到的见解。他的研究成果广泛应用于英语教学中，为提高学生的英语水平做出了重要贡献。

叶兴阳先生是著名英语教育专家，曾任教于多所知名大学，从事英语教学工作多年，具有丰富的教学经验和深厚的学术造诣。他致力于英语教育研究，特别是在英语发音和听力理解方面有着独到的见解。他的研究成果广泛应用于英语教学中，为提高学生的英语水平做出了重要贡献。

叶兴阳先生是著名英语教育专家，曾任教于多所知名大学，从事英语教学工作多年，具有丰富的教学经验和深厚的学术造诣。他致力于英语教育研究，特别是在英语发音和听力理解方面有着独到的见解。他的研究成果广泛应用于英语教学中，为提高学生的英语水平做出了重要贡献。

注音阅读英语教育之父

叶兴阳双语音标有声读物

双语对照 · 音标注音 · 有声同步

编者：叶兴阳

内容来源：公共领域英文原著

适用对象：英语学习者、教师、研究者

版本日期：2025 年

目录

共 3 个章节

1. 河外星云(extra-galactic Nebulae) 000001

2. 河外星云(extra-galactic Nebulae) 000002

3. 河外星云(extra-galactic Nebulae) 000003

使用说明

- 本目录为大字打印优化版本，正文字号 18pt，适合纸质阅读
- 电子版请访问对应 HTML 文件，支持语音播放功能
- 建议双面打印，左侧留白已优化，便于装订
- 章节标题已按字母顺序排列，便于快速查找

河外星云(Extra-galactic nebulae)

第1/3页

[ˈɛkstrə] - [gəˈlæktɪk] NEBULAE1
EXTRA - GALACTIC NEBULAE1
额外的 - 银河系 NEBULAE1

银河系外星云1

[baɪ] [ˈedwɪn] [ˈhʌbl]
By EDWIN HUBBLE
经过 埃德温 哈勃

作者：埃德温·哈勃

[-] [nəʊt] : [ðɪs] [ˈiːtekst][wɒz; wəz] [prəˈdjuːst] [frəm; frəm]
[Transcriber's Note : This etext was produced from
[转录员的 笔记 : 这 电子文本 曾是 生产 从

[转录者注：本电子文本由.....生成

[ðə; ði] [ˌæstrəʊˈfɪzɪkl] [ˈdʒɜːn(ə)l] , [vɒl] . [ɛlˈɛksˈaɪviː] , [piːˈpiː] . - - - , - .]
The Astrophysical Journal , Vol . LXIV , pp . 321 - 369 , 1926 .]
这 天体物理学 杂志 , 沃尔 : lxiv , pp . - - - , - .]

《天体物理学杂志》，第64卷，第321-369页，1926年。

[ˈæbstrækt]
ABSTRACT
抽象的

抽象的

[ðɪs] [ˌkɒntrɪˈbjʊːʃ(ə)n] [ɡɪvz] [ðə; ði] [rɪˈzʌlts] [ɒv; əv][ə; eɪ][stəˈtɪstɪk(ə)l][ɪnˌvestɪˈɡeɪʃ(ə)n][ɒv; əv] - [ˈɛkstrə] -
This contribution gives the results of a statistical investigation of 400 extra -
这 贡献 给予 这 结果 的 一个 统计 调查 的 - 额外的 -
[gəˈlæktɪk] [ˈnebjʊˌliː] [fɔː(r); fə(r)] [wɪt] - [hæz; həz] [dɪˈtɜːmɪnd] [ˈtəʊt(ə)l][ˈvɪʒʊəl] [ˈmæɡnɪtjuːd] .
galactic nebulae for which Holetschek has determined total visual magnitudes .
银河系 星云 为了 哪个 - 有 决定 全部的 视觉的 震级 .

本文给出了对 400 个河外星云进行统计调查的结果，Holetschek 已经确定了这些星云的总视星等。

[ðə; ði][lɪst][ɪz] [kəmˈpliːt] [fɔː(r); fə(r)][ðə; ði] [braɪtə] [ˈnebjʊˌliː] [ɪn][ðə; ði] [ˈnɔːðən] [skaɪ][ænd; ənd][ɪz]
The list is complete for the brighter nebulae in the northern sky and is
这 列表 是 完全的 为了 这 更亮 星云 在 这 北方 天空 和 是
[ˌreprɪˈzentətɪv] [tuː; tə] - . [faɪv][mæg] . [ɔː(r)][ˈfeɪntə(r)] .
representative to 12 . 5 mag . or fainter .
代表 到 - : 5 杂志 : 或者 较暗 :

该列表涵盖了北半球天空中较亮的星云，亮度可达 12.5 等或更暗。

[ðə; ði][ˌklæsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n] [ɪmˈplɔɪd] [ɪz] [beɪst] [ɒn][ðə; ði] [fɔːmz] [ɒv; əv][ðə; ði] [ˌfəʊtəˈɡræfɪk] [ˈɪmɪdʒɪz] .
The classification employed is based on the forms of the photographic images .
这 分类 受雇 是 基于 在 这 表格 的 这 摄影 图片 .

所采用的分类方法是基于照片图像的形状。

[əˈbaʊt] [θɪriː][pə(r)] [sent] [ɑː(r); ə(r)][ɪˈregjələ(r)] ,
About 3 per cent are irregular ,
关于 3 每 中心 是 不规则的 ,

约有3%是不规则的，

[bʌt; bət][ðə; ði] [rɪ'meɪnɪŋ] ['nebjʊ.li:] [fɔ:l][ɪntu:][ə; eɪ] ['si:kwəns] [ɒv; əv] [taɪp] [fɔ:mz] ['kærəktəraɪzd] [baɪ]
but the remaining nebulae fall into a sequence of type forms characterized by
但 这 其余的 星云 落下 进入 一个 顺序 的 类型 表格 特征化的 经过
[rəʊ'teɪʃən(ə)] ['sɪmətri] [ə'baʊt] ['dɑ:mɪnɪtɪŋ] ['nju:kliə] .
rotational symmetry about dominating nuclei .
旋转 对称 关于 占据主导地位 细胞核 .
但其余的星云则属于一系列类型，这些类型以围绕主导核的旋转对称性为特征。

[ðə; ði] ['si:kwəns] [ɪz] [kəm'pəʊzd] [ɒv; əv] [tu:] ['sekʃnz] , [ðə; ði][ɪ'lɪptɪk(ə)] ['nebjʊ.li:] [ænd; ənd][ðə; ði]
The sequence is composed of two sections , the elliptical nebulae and the
这 顺序 是 由 的 二 部分 , 这 椭圆形 星云 和 这
['spaɪrəlz] ,
spirals ,
螺旋 ,
该序列由两部分组成：椭圆星云和旋涡星系。

[wɪtʃ] [mɜ:dʒ] [ɪntu:] [i:tʃ] [ʌðə(r)] .
which merge into each other .
哪个 合并 进入 每个 其他 .
它们彼此融合。

[,lu:mɪ'nɒsəti] [rɪ'leɪ(ə)nz] . — [ðə; ði] [,dɪstrɪ'bju:ʃn] [ɒv; əv]['mægnɪtju:d] [ə'prɪəz] [tu;; tə][bi:; bi][ˈju:nɪfɔ:m]
Luminosity relations . — The distribution of magnitudes appears to be uniform
亮度 关系 . — 这 分配 的 震级 出现 到 是 制服
[θru:'aʊt] [ðə; ði] ['si:kwəns] .
throughout the sequence .
自始至终 这 顺序 .
光度关系——整个序列中星等的分布似乎是均匀的。

[fɔ:(r); fə(r)] [i:tʃ] [taɪp] [ɔ:(r)][steɪdʒ][ɪn][ðə; ði] ['si:kwəns] ,
For each type or stage in the sequence ,
为了 每个 类型 或者 阶段 在 这 顺序 ,
对于序列中的每种类型或阶段，

[ðə; ði][təʊt(ə)]['mægnɪtju:d] [ɑ:(r); ə(r)] [rɪ'leɪtɪd] [tu;; tə][ðə; ði] ['lɒɡəriθmz] [ɒv; əv][ðə; ði]['mæksɪməm]
the total magnitudes are related to the logarithms of the maximum
这 全部的 震级 是 有关的 到 这 对数 的 这 最大限度
[da'ɪæmɪtəz][baɪ][ðə; ði] ['fɔ:mjələ] ,
diameters by the formula ,
直径 经过 这 公式 ,
总星等与最大直径的对数之间的关系可以用以下公式表示：

[weə(r)] [si:] ['veərɪz] [prə'ɡresɪvli] [frɒm; frəm] [taɪp] [tu;; tə] [taɪp] ,
where C varies progressively from type to type ,
在哪里 C 变化 逐步 从 类型 到 类型 ,
其中 C 值会随着类型的不同而逐渐变化，

[ɪndɪkeɪtɪŋ] [ə; eɪ][,veəri'eɪ(ə)n][ɪn][daɪ'æmɪtə(r)][fɔ:(r); fə(r)][ə; eɪ][ˈɡɪv(ə)n]['mægnɪtju:d][ɔ:(r)][vaɪs] ['vɜ:sə] .
indicating a variation in diameter for a given magnitude or vice versa .
表明 一个 变化 在 直径 为了 一个 给定 震级 或者 副 反之亦然 .
表示在给定幅值下直径的变化，反之亦然。

[baɪ] [ə'plaɪɪŋ] [kə'rekʃnz] [tu;; tə][si:] ,
By applying corrections to C ,
经过 申请 更正 到 C ,
通过对 C 进行修正，

[ðə; ði] ['nebʊli:] [kæn; kən][bi:; bi] [rɪ'dju:st] [tu:; tə][ə; eɪ] ['stændəd] [taɪp] [ænd; ənd] [ðen] [ə; eɪ]['sɪŋg(ə)l]
the nebulae can be reduced to a standard type and then a single
这 星云 能 是 减少 到 一个 标准 类型 和 然后 一个 单身的
['fɔ:mjələ] [ɪk'spresɪz] [ðə; ði][rɪ'leɪ](ə)n][fɔ:(r); fə(r)][ɔ:l] ['nebʊli:] [frəm; frəm][ðə; ði][mægə'lænik] [klaʊdz] [tu:; tə]
formula expresses the relation for all nebulae from the Magellanic Clouds to
公式 表达 这 关系 为了 全部 星云 从 这 麦哲伦 云 到
[ðə; ði] ['ferntɪst] [ðæt] [kæn; kən][bi:; bi] ['klæsɪfaɪd] .
the faintest that can be classified .
这 最微弱 那 能 是 分类 .

星云可以简化为一种标准类型， 然后一个公式可以表达从麦哲伦星云到可分类的最暗星云的所有星云之间的关系。
[wen] [ðə; ði]['maɪnə(r)][daɪ'æmɪtə(r)][ɪz] [ju:st] , [ðə; ði]['vælju:][pɒv; əv][si:][ɪz] [ə'prɒksɪmətli] ['kɒnstənt]
When the minor diameter is used , the value of C is approximately constant
什么时候 这 次要的 直径 是 用过的 , 这 价值 的 C 是 大约 持续的
[θru:'aʊt] [ðə; ði][ɪn'taɪə(r)] ['si:kwəns] .
throughout the entire sequence .
自始至终 这 全部的 顺序 .

当使用短轴时， C 值在整个序列中近似恒定。
[ðə; ði][,kəʊ'fɪ](ə)nt][pɒv; əv][lɒg][di:] [,kɔ:ri'spɒnd] [wɪð] [ðə; ði] [ɪn'vɜ:s] - [skweə(r)] [lɔ:] ,
The coefficient of log d corresponds with the inverse - square law ,
这 系数 的 日志 d 对应 和 这 逆 - 正方形 法律 ,
log d 的系数符合平方反比定律，

[wɪtʃ] [sə'dʒests] [ðæt] [ðə; ði] ['nebʊli:] [ɑ:(r); ə(r)][ɔ:l][pɒv; əv][ðə; ði] [seɪm] ['ɔ:də(r)][pɒv; əv] ['æbsəlu:t]
which suggests that the nebulae are all of the same order of absolute
哪个 建议 那 这 星云 是 全部 的 这 相同的 命令 的 绝对
[,lu:mɪ'nɒsəti][ænd; ənd][ðæt] [ə'pærənt] ['mægnɪtju:d] [ɑ:(r); ə(r)] ['meɪʒəz] [pɒv; əv] ['dɪstəns] .
luminosity and that apparent magnitudes are measures of distance .
亮度 和 那 明显 震级 是 措施 的 距离 .
这表明这些星云的绝对光度都属于同一数量级， 视星等是距离的度量。

[ðɪs] [haɪ'pɒθəsɪs] [ɪz] [sə'pɔ:rtɪd] [baɪ]['sɪmələ(r)] [rɪ'zʌlts] [fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði]['nju:kliə(r)]['mægnɪtju:d] [ænd; ənd]
This hypothesis is supported by similar results for the nuclear magnitudes and
这 假设 是 有 经过 相似的 结果 为了 这 核 震级 和
[ðə; ði]['mægnɪtju:d] [pɒv; əv][ðə; ði] [bɪ'aɪtəst] [stɑ:z] [ɪn'vɒlvd] ,
the magnitudes of the brightest stars involved ,
这 震级 的 这 最亮的 明星 涉及 ,
这一假设得到了核星等和相关最亮恒星星等的类似结果的支持。

[ænd; ənd][baɪ][ðə; ði] [smɔ:l] [reɪndʒ][ɪn] [,lu:mɪ'nɒsəti] [ə'mʌŋ] ['nebʊli:] [hu:z] ['dɪstənsɪz] [ɑ:(r); ə(r)]
and by the small range in luminosities among nebulae whose distances are
和 经过 这 小的 范围 在 亮度 之中 星云 谁 距离 是
[ɔ:l'reɪdɪ] [nəʊn] .
already known .
已经 已知 .
并且， 已知距离的星云之间的亮度差异很小。

['dɪstənsɪz] [ænd; ənd] ['æbsəlu:t] [daɪ'men](ə)nɪz] . — [ðə; ði] [mi:n] ['æbsəlu:t] ['vɪʒuəl] ['mægnɪtju:d] , [æz; əz]
Distances and absolute dimensions . — The mean absolute visual magnitude , as
距离 和 绝对 方面 . — 这 意思是 绝对 视觉的 震级 , 作为
[dɪ'raɪvd] [frəm; frəm][ðə; ði] ['nebʊli:] [hu:z] ['dɪstənsɪz] [ɑ:(r); ə(r)] [nəʊn] ,
derived from the nebulae whose distances are known ,
衍生的 从 这 星云 谁 距离 是 已知 ,
距离和绝对尺寸——平均绝对视星等， 由距离已知的星云推导得出。

[ɪz] - - . [tu:'tu:] .
is - 15 . 2 .
是 - - . 2 .
是 -15.2。

[ðə; ði][stə'tɪstɪk(ə)l] [ɪk'spreʃ(ə)n] [fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði] ['dɪstəns] [ɪn] ['pɑ:sek] [ɪz] [ðen]
The statistical expression for the distance in parsecs is then
这 统计 表达 为了 这 距离 在 秒差距 是 然后
距离（以秒差距为单位）的统计表达式为

[weə(r)] [ɛm'ti:][ɪz][ðə; ði]['təʊt(ə)l] [ə'pærənt] ['mæɡnɪtju:d] .
where mT is the total apparent magnitude .
在哪里 公吨 是 这 全部的 明显 震级 .
其中 mT 为总视星等。

[ðɪs] [li:dz] [tu:; tə] [mi:n] ['vælju:z][fɔ:(r); fə(r)] ['æbsəlu:t] [daɪ'menʃ(ə)nz][æt; ət] ['veəriəs] [steɪdʒɪz][ɪn][ðə; ði]
This leads to mean values for absolute dimensions at various stages in the
这 线索 到 意思是 值 为了 绝对 方面 在 各种各样的 阶段 在 这
[ˈsi:kwəns] [pɒ; əv] [taɪps] .
sequence of types .
顺序 的 类型 .
这就得到了类型序列中各个阶段绝对尺寸的平均值。

['mæsɪz] [ə'prɪə(r)] [tu:; tə][bi:; bi][pɒ; əv][ðə; ði]['ɔ:də(r)][pɒ; əv][tu:'tu:] . 6×108 ⊙ .
Masses appear to be of the order of 2 . 6×108 ⊙ .
群众 出现 到 是 的 这 命令 的 2 . 6×108 ⊙ .
质量似乎在 2.6×108 ⊙ 量级。

[ˌdɪstrɪ'bju:ʃn] [ænd; ənd][ˈdensəti][pɒ; əv] [speɪs] . — [tu:; tə] [ə'pærənt] ['mæɡnɪtju:d] [ə'baʊt] - . ['sevən] ,
Distribution and density of space . — To apparent magnitude about 16 . 7 ,
分配 和 密度 的 空间 . — 到 明显 震级 关于 - . 7 ,
空间分布和密度——视星等约为16.7，

[ˌkɒrə'spɒndɪŋ] [tu:; tə][æn; ən][ɪk'spəʊʒə(r)][pɒ; əv][wʌn]['aʊə(r)][pɒn][fɑ:st] [plɛɪts] [wɪð] [ðə; ði] - - [ɪnt]
corresponding to an exposure of one hour on fast plates with the 60 - inch
相应的 到 一个 接触 的 一 小时 在 快速地 盘子 和 这 - - 英寸
[rɪ'flektə(r)] ,
reflector ,
反射器 ,
相当于使用60英寸反射镜在快速感光板上曝光一小时。

[ðə; ði] ['nʌmbəz] [pɒ; əv] ['nebʊli:] [tu:; tə] ['veəriəs] ['lɪmɪts][pɒ; əv][ˈtəʊt(ə)l]['mæɡnɪtju:d] ['veəri] [də'rektli] [wɪð]
the numbers of nebulae to various limits of total magnitude vary directly with
这 数字 的 星云 到 各种各样的 限制 的 全部的 震级 各不相同 直接地 和
[ðə; ði] ['vɒlju:mz] [pɒ; əv] [speɪs] [reprɪ'zentɪd] [baɪ][ðə; ði]['lɪmɪts] .
the volumes of space represented by the limits .
这 卷 的 空间 代表 经过 这 限制 .
不同总星等极限下的星云数量与这些极限所代表的空间体积成正比。

[ðɪs] ['ɪndɪkeɪts] [æn; ən] [ə'prɒksɪmətli] ['ju:nɪfɔ:m][ˈdensəti][pɒ; əv] [speɪs] ,
This indicates an approximately uniform density of space ,
这 表示 一个 大约 制服 密度 的 空间 ,
这表明空间密度大致均匀。

[pɒ; əv][ðə; ði]['ɔ:də(r)][pɒ; əv][wʌn]['nebʊlə][pə(r)] - ['kju:bɪk] ['pɑ:sek] [ɔ:(r)][wʌn] . 5×10 - - [ɪn][si:] . [dʒi:]
of the order of one nebula per 1017 cubic parsecs or 1 . 5×10 - 31 in C . G
的 这 命令 的 一 星云 每 - 立方体 秒差距 或者 1 . 5×10 - - 在 C . G
. [es] . ['ju:nɪts] .
. **S . units .**
. S . 单位 .
大约每 1017 立方秒差距有一个星云，或者用 CGS 单位制表示为 1.5×10–31。

[ðə; ði] [ˌkɒrəˈspɒndɪŋ] [ˈreɪdiəs][pʊ; əv] [ˈkɜːvətʃə(r)] [pʊ; əv][ðə; ði][ˈfaɪnaɪt] [ˈjuːnɪvɜːs] [pʊ; əv][ˈdʒen(ə)rəl]
The corresponding radius of curvature of the finite universe of general
这 相应的 半径 的 曲率 的 这 有限 宇宙 的 一般的
[ˌreləˈtɪvətɪ] [ɪz][pʊ; əv][ðə; ði][ˈɔːdə(r)][pʊ; əv][ˌtuːˈtuː] . 7×10¹⁰ [ˈpɑːsek] ,
relativity is of the order of 2 . 7×10¹⁰ parsecs ,
相对论 是 的 这 命令 的 2 . 7×10¹⁰ 秒差距 ,
广义相对论中有限宇宙的相应曲率半径约为 2.7×10¹⁰ 秒差距。

[ɔː(r)] [əˈbaʊt] - [taɪmz][ðə; ði] [ˈdɪstəns] [æ; ət] [wɪtʃ] [ˈnɔːm(ə)] [ˈnebʊˌliː] [kæn; kən][biː; bi] [dɪˈtektɪd] [wɪð]
or about 600 times the distance at which normal nebulae can be detected with
或者 关于 - 时代 这 距离 在 哪个 普通的 星云 能 是 检测到 和
[ðə; ði] - - [ɪntʃ] [rɪˈflektə(r)] .
the 100 - inch reflector .
这 - - 英寸 反射器 .
或者说，大约是使用 100 英寸反射望远镜探测正常星云距离的 600 倍。

[ˈriːs(ə)nt] [ˈstʌdɪz] [hæ; həv] [ˈemfəsaɪzd] [ðə; ði][ˌfʌndəˈment(ə)] [ˈneɪtʃə(r)][pʊ; əv][ðə; ði][dɪˈvɪz(ə)n] [brɪˈtwiːn]
Recent studies have emphasized the fundamental nature of the division between
最近的 研究 有 强调 这 基本的 自然 的 这 分配 之间
[gəˈlæktɪk][ænd; ənd][ˈekstrə] - [gəˈlæktɪk] [ˈnebʊˌliː] .
galactic and extra - galactic nebulae .
银河系 和 额外的 - 银河系 星云 .
近期研究强调了银河系内星云和银河系外星云之间划分的根本性质。

[ðə; ði] [rɪˈleɪ(ə)nʃɪp] [ɪz][nɒt][dʒəˈnerɪk] ; [aɪ ˈtiː][ɪz][ˈrɑːðə(r)] [ðæt] [pʊ; əv][ðə; ði] [pɑːt] [tuː; tə][ðə; ði] [həʊl] .
The relationship is not generic ; it is rather that of the part to the whole .
这 关系 是 不是 通用的 ; 它 是 相当 那 的 这 部分 到 这 所有的 .
这种关系并非普遍意义上的关系，而是部分与整体之间的关系。

[gəˈlæktɪk] { [ˌtuːˈtuː] }
Galactic { 2 }
银河 { 2 }

银河系{2}

[ˈnebʊˌliː] [ɑː(r); ə(r)] [klaʊdz] [pʊ; əv] [dʌst] [ænd; ənd][gæs] [ˈmɪŋɡld] [wɪð] [ðə; ði] [staːz] [pʊ; əv][ə; eɪ][pəˈtɪkjələ(r)]
nebulae are clouds of dust and gas mingled with the stars of a particular
星云 是 云 的 灰尘 和 气体 混合 和 这 明星 的 一个 特别的
[ˈstelə(r)] [ˈsɪstəm] ;
stellar system ;
恒星 系统 ;
星云是由尘埃和气体与特定恒星系统中的恒星混合而成的云；

[ˈekstrə] - [gəˈlæktɪk] [ˈnebʊˌliː] , [æt; ət] [liːst] [ðə; ði][mæʊst] [kənˈspɪkjʊəs] [pʊ; əv][ðəm; ðəm] , [ɑː(r); ə(r)] [naʊ]
extra - galactic nebulae , at least the most conspicuous of them , are now
额外的 - 银河系 星云 , 在 至少 这 最多 显眼的 的 他们 , 是 现在
[ˈrekəɡˈnaɪzd] [æ; əz] [ˈsɪstəmz] [kəmˈpliːt] [ɪn] [ðəmˈselvz] ,
recognized as systems complete in themselves ,
认可 作为 系统 完全的 在 他们自己 ,
现在人们已经认识到，至少最引人注目的河外星云是完整的星系系统。

[ænd; ənd][ˈɒf(ə)n] [ɪnˈkɔːpəreɪt] [klaʊdz] [pʊ; əv][gəˈlæktɪk][ˌnebʊˈlɒsəti][æ; əz][kəmˈpəʊnənt] [pɑːts] [pʊ; əv]
and often incorporate clouds of galactic nebulousity as component parts of
和 经常 包含 云 的 银河系 星云 作为 成分 部分 的
[ðəə(r)] [ɔːɡənəɪˈzeɪʃn] .
their organization .
他们的 组织 .
它们通常将银河星云作为其组织结构的组成部分。

[ˈdefɪnət] [ˈeɪvɪdəns] [æz; əz][tu:; tə] [ˈdɪstənsɪz] [ænd; ənd][daɪˈmenʃ(ə)nz][ɪz] [rɪˈstrɪktɪd] [tu:; tə][sɪks] [ˈsɪstəmz] ,
Definite evidence as to distances and dimensions is restricted to six systems ,
定 证据 作为 到 距离 和 方面 是 受限制的 到 六 系统 ,
[ɪnˈkluːdɪŋ] [ðə; ði][mæɡəˈlænɪk] [klaʊdz] .
including the Magellanic Clouds .
包括 这 麦哲伦 云 .

关于距离和尺寸的确凿证据仅限于六个星系，其中包括麦哲伦星云。

[ðə; ði][ˈsɪmələ(r)][ˈneɪtʃə(r)][əv; əv][ðə; ði] [ˈkaʊntləs] [ˈfeɪntə(r)] [ˈnebʊˌli:] [hæz; həz] [bi:n] [ɪnˈfɜːd] [frəm; frəm]
The similar nature of the countless fainter nebulae has been inferred from
这 相似的 自然 的 这 无数 较暗 星云 有 到过 推断 从
[ðə; ði][ˈdʒen(ə)rəl][ˈprɪnsəp(ə)][əv; əv][ðə; ði][juːnɪˈfɔːməti][əv; əv][ˈneɪtʃə(r)] .
the general principle of the uniformity of nature .
这 一般的 原则 的 这 均匀性 的 自然 .

无数较暗星云的相似性质可以从自然界的普遍统一性原理中推断出来。

[ðə; ði][ˈekstrə] - [gəˈlæktɪk] [ˈnebʊˌli:] [fɔːm] [ə; eɪ] [həməˈdʒiːniəs] [ɡruːp] [ɪn] [wɪtʃ] [ˈnʌmbəz] [ɪnˈkriːs]
The extra - galactic nebulae form a homogeneous group in which numbers increase
这 额外的 - 银河系 星云 形式 一个 均质 团体 在 哪个 数字 增加
[ˈræpɪdli] [wɪð] [dɪˈmɪnɪʃɪŋ] [əˈpærənt] [saɪz][ænd; ənd][ˌluːmɪˈnəsəti] .
rapidly with diminishing apparent size and luminosity .
快速 和 减少 明显 尺寸 和 亮度 .

河外星云构成了一个同质群体，其数量随着视大小和亮度的减小而迅速增加。

[fɔː(r)][ɑː(r); ə(r)][ˈvɪzəb(ə)][tu:; tə][ðə; ði][ˈneɪkɪd] [aɪ] ; [tuːˈtu:] - [ɑː(r); ə(r)] [faʊnd] [ɒn][ðə; ði] [ˈhɑːvəd] “ [skaɪ]
Four are visible to the naked eye ; 2 41 are found on the Harvard “ Sky
四 是 可见的 到 这 裸 眼睛 ; 2 - 是 成立 在 这 哈佛大学 “ 天空
[mæp] ” ;
Map ” ;
地图 ” ;

其中四颗肉眼可见；2颗41颗在哈佛“星图”上可以找到；

[θri:] - [ɑː(r); ə(r)][ɒn][ðə; ði][ˈfræŋklɪn] - [ˈædəmz] [pleɪts] ; [fɔːr] - ,
3 700 are on the Franklin - Adams plates ; 4 300 ,
3 - 是 在 这 富兰克林 - 亚当斯 盘子 ; 4 - ,
3700个在富兰克林-亚当斯车牌上；4300个，
- [ɑː(r); ə(r)] [ˈestɪmeɪtɪd] [tu:; tə][biː; bi] [wɪˈðɪn] [ðə; ði][ˈlɪmɪts][əv; əv][æn; ən] [ˈaʊərz] [ɪkˈspəʊʒə(r)] [wɪð] [ðə; ði]
000 are estimated to be within the limits of an hour's exposure with the
- 是 估计的 到 是 之内 这 限制 的 一个 小时 接触 和 这
- - [ɪntʃ] [rɪˈflektə(r)] . [faɪv] [ðɪːz] [ˈdeɪtə] [ˈɪndɪkeɪt] [ə; eɪ][waɪd][reɪndʒ][ɪn] [ˈdɪstəns] [ɔː(r)][ɪn] [ˈæbsəluːt]
60 - inch reflector . 5 These data indicate a wide range in distance or in absolute
- - 英寸 反射器 . 5 这些 数据 表明 一个 宽的 范围 在 距离 或者 在 绝对

[daɪˈmenʃ(ə)nz] .
dimensions .
方面 .

000 估计在 60 英寸反射器一小时曝光的限制范围内。5 这些数据表明距离或绝对尺寸存在很大范围。

[ðə; ði][ˈprez(ə)nt][ˈpeɪpə(r)] , [tu:; tə] [wɪtʃ] [ɪz] [ˈprefəst] [ə; eɪ][ˈdʒen(ə)rəl][ˌklæsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n][əv; əv] [ˈnebʊˌli:] ,
The present paper , to which is prefaced a general classification of nebulae ,
这 展示 纸 , 到 哪个 是 序言 一个 一般的 分类 的 星云 ,
本文首先对星云进行了一般分类，

[dɪsˈkʌs] [sʌtʃ] [ˌɒbzəˈveɪʃənəl] [məˈtɪəriəl][æz; əz][wiː; wi] [naʊ] [pəˈzes] [ɪn][æn; ən] [əˈtempt] [tu:; tə]
discusses such observational material as we now possess in an attempt to
讨论 这样的 观察 材料 作为 我们 现在 具有 在 一个 试图 到
[dɪˈtɜːmɪn] [ðə; ði] [ˈrelatɪv] [ɪmˈpɔːt(ə)nɪs] [əv; əv] [ðɪːz] [tuː] [ˈfæktəz] ,
determine the relative importance of these two factors ,
决定 这 相对的 重要性 的 这些 二 因素 ,

本文探讨了我們目前所掌握的观测资料，试图确定这两个因素的相对重要性。

[ˈdɪstəns] [ænd; ənd] [ˈæbsəlu:t] [daɪ'menʃ(ə)nz] , [ɪn][ðəə(r)] [ˈbeəriŋ] [ɒn][ðə; ði] [əˈpiərəns] [ɒv; əv][ˈekstrə] -
distance and absolute dimensions , in their bearing on the appearance of extra -
距离 和 绝对 方面 , 在 他们的 轴承 在 这 外貌 的 额外的 -
[gəˈlæktɪk] [ˈnebjʊ,li:] .
galactic nebulae .
银河系 星云 .

距离和绝对尺寸，以及它们对河外星云外观的影响。

[ðə; ði][ˌklæsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n][ɒv; əv] [ði:z] [ˈnebjʊ,li:] [ɪz] [beɪst] [ɒn][ˈstrʌktʃə(r)] ,
The classification of these nebulae is based on structure ,
这 分类 的 这些 星云 是 基于 在 结构 ,
这些星云的分类是基于其结构。

[ðə; ði][ˌɪndɪˈvɪdʒuəl] [ˈmembəz] [ɒv; əv][ə; eɪ] [klɑ:s] [ˈdɪfə] [ˈəʊnli][ɪn] [əˈpærənt] [saɪz][ænd; ənd][ˌlu:mɪˈnɒsəti]
the individual members of a class differing only in apparent size and luminosity
这 个人 成员 的 一个 班级 不同 仅有的 在 明显 尺寸 和 亮度
.
:
.

同一类别中的各个成员仅在表观大小和亮度上有所不同。

[aɪ ˈti:][ɪz] [faʊnd] [ðæt] [fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði] [ˈnebjʊ,li:] [ɪn] [i:tʃ] [klɑ:s] [ði:z] [ˌkærəktəˈrɪstɪks] [ɑ:(r); ə(r)] [rɪˈleɪtɪd]
It is found that for the nebulae in each class these characteristics are related
它 是 成立 那 为了 这 星云 在 每个 班级 这些 特征 是 有关的
[ɪn][ə; eɪ][ˈmæənə(r)] [wɪtʃ] [ˈkləʊsli] [əˈprɒksɪmɪts] [ðə; ði][ˌɒpəˈreɪʃ(ə)n][ɒv; əv][ðə; ði] [ɪnˈvɜ:s] - [skweə(r)] [ɔ:]
in a manner which closely approximates the operation of the inverse - square law
在 一个 方式 哪个 密切 近似值 这 手术 的 这 逆 - 正方形 法律
[ɒn][ˈkɒmpərəb(ə)l][ˈɒbdʒɪkts] .
on comparable objects .
在 可比 对象 .

研究发现，每一类星云的这些特征之间的关系，与类似物体的平方反比定律的运作方式非常接近。

[ðə; ði] [prɪˈzʌmpʃ(ə)n] [ɪz][ðæt] [dɪˈspɜ:ʃn] [ɪn][ˈæbsəlu:t] [daɪ'menʃ(ə)nz][ɪz] [ˈrelətɪvli] [ˌʌnɪmˈpɔ:t(ə)nt] ,
The presumption is that dispersion in absolute dimensions is relatively unimportant ,
这 假定 是 那 分散 在 绝对 方面 是 相对地 不重要 ,
假设绝对尺寸上的离散程度相对不重要，

[ænd; ənd] [hens] [ðæt] [ɪn][ə; eɪ][stəˈtɪstɪk(ə)l] [sens] [ðə; ði] [əˈpærənt] [daɪ'menʃ(ə)nz] [ˌreprɪˈzent] [ˈrelətɪv]
and hence that in a statistical sense the apparent dimensions represent relative
和 因此 那 在 一个 统计 感觉 这 明显 方面 代表 相对的
[ˈdɪstənsɪz] .
distances .
距离 .

因此，从统计学意义上讲，表观尺寸代表相对距离。

[ðə; ði] [ˈrelətɪv] [ˈdɪstənsɪz] [kæn; kən][bi:; bi] [rɪˈdʒu:st] [tu:; tə] [ˈæbsəlu:t] [ˈvælju:z] [wɪð] [ðə; ði][eɪd][ɒv; əv]
The relative distances can be reduced to absolute values with the aid of
这 相对的 距离 能 是 减少 到 绝对 值 和 这 援助 的
[ðə; ði] [ˈnebjʊ,li:] [hu:z] [ˈdɪstənsɪz] [ɑ:(r); ə(r)] [ɔ:ˈredi] [nəʊn] .
the nebulae whose distances are already known .
这 星云 谁 距离 是 已经 已知 .

借助距离已知的星云，可以将相对距离简化为绝对值。

[pɑ:t] [aɪ] . [ˌklæsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n] [ɒv; əv] [ˈnebjʊ,li:]
PART I . CLASSIFICATION OF NEBULAE
部分 我 . 分类 的 星云
第一部分 星云的分类

[ˈdʒen(ə)rəl] [ˌklæsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n]
GENERAL CLASSIFICATION
一般的 分类
一般分类

[ðə; ði][ˌklæsɪfɪˈkeɪ(ə)n] [juːst] [ɪn][ðə; ði]ˈprez(ə)nt[ɪnˌvestɪˈgeɪ(ə)n][ɪz] [ɪˈsenʃəli] [ðə; ði] ˈdiːteɪld]
The classification used in the present investigation is essentially the detailed
这 分类 用过的 在 这 展示 调查 是 本质上 这 详细的
[ˌfɔːmjuˈleɪ(ə)n][pʊ; əv][ə; eɪ] [prɪˈlɪmɪnəri] [ˌklæsɪfɪˈkeɪ(ə)n] [ˈpʌblɪʃt] [ɪn] { [θriː] }
formulation of a preliminary classification published in { 3 }
配方 的 一个 初步的 分类 已发布 在 { 3 }

本研究中使用的分类本质上是{3}中发表的初步分类的详细表述。

[ə; eɪ] [ˈpriːviəs] [ˈpeɪpə(r)] . [sɪks][ˌaɪ ˈtiː][wɒz; wəz] [drɪˈveləpt] [ɪn] - , [frɒm; frəm][ə; eɪ] [ˈstʌdi] [pʊ; əv]
a previous paper . 6 It was developed in 1923 , from a study of
一个 以前的 纸 . 6 它 曾是 发达 在 - , 从 一个 学习 的
[ˈfəʊtəgræfs] [pʊ; əv] [ˈsevrəl] [ˈθaʊz(ə)nd] [ˈnebjʊˌliː] ,
photographs of several thousand nebulae ,
照片 的 一些 千 星云 ,

前文6 该理论于1923年发展而来，基于对数千张星云照片的研究，

[ɪnˈkluːdɪŋ] [ˈpræktɪkli] [ɔːl][ðə; ði] [braɪtə] [ˈɒbdʒɪkts][ænd; ənd][ə; eɪ] [ˈθʌrəli] [reprɪˈzentətɪv]
including practically all the brighter objects and a thoroughly representative
包括 几乎 全部 这 更亮 对象 和 一个 彻底 代表
[kəˈlek(ə)n] [pʊ; əv][ðə; ði][ˈfeɪntə(r)][wʌnz] . [ˈsevrən][ˌaɪ ˈtiː][ɪz] [beɪst] [praɪˈmerəli][pʌn][ðə; ði] [ˈstrʌktʃərəl] [ˌfɔːmz]
collection of the fainter ones . 7 It is based primarily on the structural forms
收藏 的 这 较暗 一个 . 7 它 是 基于 主要 在 这 结构 表格
[pʊ; əv] [ˌfəʊtəˈgræfɪk] [ˈɪmɪdʒɪz] ,
of photographic images ,
的 摄影 图片 ,

它几乎囊括了所有较亮的天体，以及一系列具有代表性的较暗天体。7 它主要基于摄影图像的结构形式，

[ɔːlˈðəʊ] [ðə; ði] [ˌfɔːmz] [drɪˈvaɪd] [ðəmˈselvz] [ˈnæt(ə)rəli][ˈɪntuː] [tuː] [gruːps] :
although the forms divide themselves naturally into two groups :
虽然 这 表格 划分 他们自己 自然 进入 二 团体 :
虽然这些形式自然而然地分为两类：

[ðəʊz] [faʊnd] [ɪn][ɔː(r)][nɪə(r)][ðə; ði] [ˈmɪlki] [wei] [ænd; ənd] [ðəʊz] [ɪn] [ˈmɒdərət] [ɔː(r)] [haɪ] [gəˈlæktɪk]
those found in or near the Milky Way and those in moderate or high galactic
那些 成立 在 或者 靠近 这 乳白色 方式 和 那些 在 缓和 或者 高的 银河系
[ˈætrɪtʃuːdz] .
latitudes .
纬度 .

位于银河系内或附近的星系，以及位于中高银纬地区的星系。

[ɪn][səʊ][faː(r)][æz; əz][ˈpɒsəb(ə)l] , [ðə; ði] [ˈsɪstəm] [ɪz] [ˌɪndɪˈpendənt] [pʊ; əv][ðə; ði][ˌɔːrɪənˈteɪ(ə)n][pʊ; əv][ðə; ði]
In so far as possible , the system is independent of the orientation of the
在 所以 远的 作为 可能的 , 这 系统 是 独立的 的 这 方向 的 这
[ˈɒbdʒɪkts][ɪn] [speɪs] .
objects in space .
对象 在 空间 .

该系统尽可能地与空间中物体的方向无关。

[wɪð] [ˈmaɪnə(r)][ˈtʃeɪndʒɪz][ɪn][ðə; ði][əˈrɪdʒən(ə)l] [nəʊˈteɪʃn] , [ðə; ði] [kəmˈpliːt] [ˌklæsɪfɪˈkeɪ(ə)n][ɪz][æz; əz]
With minor changes in the original notation , the complete classification is as
和 次要的 变化 在 这 原来的 符号 , 这 完全的 分类 是 作为
[ˈfɒləʊz] ,
follows ,
跟随 ,

在对原有符号进行少量修改后，完整的分类如下：

[ɔːlˈðəʊ] [ˈəʊnli][ðə; ði]ˈekstrə - [gəˈlæktɪk][drɪˈvɪʒ(ə)n][ɪz][hɪə(r)] [drɪˈskʌst] [ɪn]ˈdiːteɪl] :
although only the extra - galactic division is here discussed in detail :
虽然 仅有的 这 额外的 - 银河系 分配 是 这里 讨论 在 细节 :

虽然这里只详细讨论了银河系外星系的划分：

[ˌklæsɪfɪˈkeɪ](ə)n] [ɒv; əv] ['neɪbjʊ.li:]
CLASSIFICATION OF NEBULAE
分类 的 星云

星云的分类

[ˈsɪmb(ə)l][ɪgˈzɑ:mp(ə)l]
Symbol Example
象征 例子

符号示例

[aɪ] . [gəˈlæktɪk] ['neɪbjʊ.li:] :
I . Galactic nebulae :
我 . 银河 星云 :

一、银河系星云：

[ə; eɪ] . ['plænətri] [pi:] [en] . [dʒi:] . [si:] . -
A . Planetaries P N . G . C . 7662
一个 . 行星 P N . G . C . -

A. 行星 P NGC 7662

[bi:] . [dɪˈfju:s] [di:]
B . Diffuse D
B . 扩散 D

B. 弥散 D

[wʌn] . [prɪˈdɒmɪnəntli] ['lu:mɪnəs] [ˈdiːəl][en] . [dʒi:] . [si:] . -
1 . Predominantly luminous DL N . G . C . 6618
1 . 主要 发光的 DL N . G . C . -

1. 主要为发光暗层星系 NGC 6618

[tuːˈtu:] . [prɪˈdɒmɪnəntli] [əbˈskjʊə(r)][duː; də] [ˈbɑːnɑːd] - .
2 . Predominantly obscure DO Barnard 923 .
2 . 主要 朦胧 做 巴纳德 - .

2. 主要为不知名的 DO Barnard 923。

[kənˈspɪkjʊəsli] [mɪkst] [ˌdiː,əlˈoʊ][en] . [dʒi:] . [si:] . -
Conspicuously mixed DLO N . G . C . 7023
显眼地 混合 DLO N . G . C . -

明显混合的DLO NGC 7023

[aɪ ˈaɪ] .
II :
二 :

二、

[ˈekstrə] - [gəˈlæktɪk] ['neɪbjʊ.li:] :
Extra - galactic nebulae :
额外的 - 银河系 星云 :

河外星云：

[ə; eɪ] . [ˈregjələ(r)] : [wʌn] .
A . Regular : 1 .
一个 . 常规的 : 1 .

A. 常规： 1.

[ɪˈlɪptɪk(ə)l]
Elliptical
椭圆形

椭圆形

(n=1 , [tuːˈtu:] , . . . , [ˈsevən] ['ɪndɪkerts] [ðə; ði] [ɪlɪpˈtɪsəti]
(n=1 , 2 , : : : , 7 indicates the ellipticity
(n=1 , 2 , . . . , 7 表示 这 椭圆率

(n=1, 2, ..., 7 表示椭圆率)

[ɒv; əv][ðə; ði] ['ɪmɪdʒ]
of the image
的 这 图像

图像

[wɪ'ðaʊt] [ðə; ði]['desɪm(ə)] [pɔɪnt])
without the decimal point)
没有 这 小数 观点)

(不含小数点)

[ɪn][en] . [dʒi:] . [si:] . - E0
En N . G . C . 3379 E0
恩 N . G . C . - E0

En NGC 3379 E0

[en] . [dʒi:] . [si:] . - E2
N . G . C . 221 E2
N . G . C . - E2

NGC 221 E2

[en] . [dʒi:] . [si:] . - E5
N . G . C . 4621 E5
N . G . C . - E5

NGC 4621 E5

[en] . [dʒi:] . [si:] . - E7 { [fɔːr] } [tuː'tuː] .
N . G . C . 2117 E7 { 4 } 2 .
N . G . C . - E7 { 4 } 2 .

NGC 2117 E7{4}2。

[ˈspairəlz] :
Spirals :
螺旋 :
 :

螺旋:

[ə; eɪ]) ['nɔ:m(ə)] ['spairəlz][es]
a) Normal spirals S
一个) 普通的 螺旋 S

a) 正常螺旋 S

([wʌn]) ['ɜ:li] ['ɛs.eɪ][en] . [dʒi:] . [si:] . -
(1) Early Sa N . G . C . 4594
(1) 早期的 萨 N . G . C . -

(1) 早期 Sa NGC 4594

([tuː'tuː]) [ɪntə'mi:diət] ['sʌmbədi][en] . [dʒi:] . [si:] . -
(2) Intermediate Sb N . G . C . 2841
(2) 中间的 某人 N . G . C . -

(2) 中型锶NGC 2841

([θri:]) [lert] [ɛs'si:] [en] . [dʒi:] . [si:] . -
(3) Late Sc N . G . C . 5457
(3) 晚的 Sc N . G . C . -

(3) 晚期Sc NGC 5457

[bi:]) [bɑ:d] ['spairəlz]['sʌmbədi]
b) Barred spirals SB
b) 禁止 螺旋 SB

b) 棒状螺旋线 SB

([wʌn]) ['ɜ:li] [ɛs,bi:'eɪ] [en] . [dʒi:] . [si:] . -
(1) Early SBa N . G . C . 2859
(1) 早期的小企业管理局 N . G . C . -

(1) 早期 SBa NGC 2859

([tu:'tu:]) [ɪntə'mi:diət] [ɛs,bi:'bi:][en] . [dʒi:] . [si:] . -
(2) **Intermediate** **SBb** **N** . **G** . **C** . **3351**
(2) 中间的 sbb N . G . C . -

(2) 中间型 SBb NGC 3351

([θri:]) [lert] [ɛs,bi:'si:][en] . [dʒi:] . [si:] . -
(3) **Late** **SBc** **N** . **G** . **C** . **7479**
(3) 晚的 sbc N . G . C . -

(3) 晚期 SBc NGC 7479

[bi:] . [ɪ'regjələ(r)][ɪ(r)][en] . [dʒi:] . [si:] . -
B . **Irregular** **Irr** **N** . **G** . **C** . **4449**
B . 不规则的 不 N . G . C . -

B. 不规则星系 Irr NGC 4449

[ˈekstrə] - [gə'læktɪk] ['nebʊ,li:] [tu:] [fernt] [tu:, tə][bi:, bi] ['klæsɪfaɪd] [ɑ:(r); ə(r)] ['deziɡneɪtɪd] [baɪ][ðə; ði][ˈsɪmb(ə)l]
Extra - **galactic** **nebulae** **too faint** **to** **be** **classified** **are** **designated by the symbol**
额外的 - 银河系 星云 也 头晕的 到 是 分类 是 指定的 经过 这 象征
“ [kju:] .
“ **Q** .
” 问 .

暗到无法分类的河外星云用符号“Q”表示。

” [ˈregjələ(r)] ['nebʊ,li:]
” **REGULAR** **NEBULAE**
” 常规的 星云

规则星云

[ðə; ði] [kærəktə'rɪstɪk] ['fi:tʃə(r)] [ɒv; əv][ˈekstrə] - [gə'læktɪk] ['nebʊ,li:] [ɪz][rəʊ'teɪʃən(ə)l] ['sɪmətri] [ə'baʊt]
The characteristic feature of extra - galactic nebulae is rotational symmetry about
这 特征 特征 的 额外的 - 银河系 星云 是 旋转 对称 关于
[ˈdɑːmɪneɪtɪŋ] [nɒn] - ['stelə(r)][ˈnjuːkliəɪ] .
dominating non - stellar nuclei .
占据主导地位 非 - 恒星 细胞核 .

河外星云的特征是围绕主导的非恒星核旋转对称。

[ə'baʊt] - [pə(r)] [sent] [ɒv; əv] [ðiːz] ['nebʊ,li:] [ɑ:(r); ə(r)][ˈregjələ(r)][ɪn][ðə; ði] [sens] [ðæt] [ðeɪ] [jəʊ] [ðɪs]
About 97 per cent of these nebulae are regular in the sense that they show this
关于 - 每 中心 的 这些 星云 是 常规的 在 这 感觉 那 他们 展示 这
['fi:tʃə(r)] [kən'spɪkjʊəsli] .
feature conspicuously .
特征 显眼地 .

这些星云中约有 97% 是规则的，因为它们明显具有这种特征。

[ðə; ði][ˈregjələ(r)] ['nebʊ,li:] [fɔːl][ɪn'tuː][ə; eɪ] [prə'ɡresɪv] ['siːkwəns] ['reɪndʒɪŋ][frəm; frəm][ˈɡləbjələ(r)] ['mæsɪz]
The regular nebulae fall into a progressive sequence ranging from globular masses
这 常规的 星云 落下 进入 一个 进步 顺序 范围 从 球形 群众
[ɒv; əv] [ˌʌnrɪ'zɒlvd] [ˌnebʊ'ləsəti][tu:, tə] ['waɪdli] ['əʊpən][ˈspaɪrəlz] [huːz] [ɑːmz][ɑ:(r); ə(r)] ['swɔːmɪŋ] [wɪð]
of unresolved nebulousity to widely open spirals whose arms are swarming with
的 未解决 星云 到 广泛 打开 螺旋 谁 武器 是 蜂拥而至 和
[staːz] .
stars .
明星 .

规则星云呈现出一个渐进的序列，从无法分辨的球状星云到旋臂上布满恒星的广阔开放的旋涡星云。

[ðə; ði] ['siːkwəns] [kəm'praɪz] [tu:] ['sekʃənz] , [ɪ'liptɪk(ə)l] ['nebʊ,li:] [ænd; ənd][ˈspaɪrəlz] , [wɪtʃ] [mɜːdʒ]
The sequence comprises two sections , elliptical nebulae and spirals , which merge
这 顺序 包括 二 部分 , 椭圆形 星云 和 螺旋 , 哪个 合并
[ɪn'tuː] [iːtʃ] [ˌʌðə(r)] .
into each other .
进入 每个 其他 .

该序列由两个部分组成：椭圆星云和旋涡星云，它们相互融合。

[ɔ:ɫ'ðəʊ] [drɪlɪbəɾət] [ˈefət] [wɒz; wəz] [meɪd] [tu:; tə][faɪnd][ə; eɪ] [dɪ'skrɪptɪv] [ˌklæsɪfɪˈkeɪ](ə)n] [wɪt]]
Although deliberate effort was made to find a descriptive classification which
虽然 商榷 努力 曾是 制成 到 寻找 一个 描述性的 分类 哪个
[ʃʊd; ʃəd][bi:; bi] [ɪn'taɪəli] [ɪndɪ'pendənt] [ɒv; əv] [θɪə'retɪk(ə)l] [kən,sɪdə'reɪjnz] ,
should be entirely independent of theoretical considerations ;
应该 是 完全 独立的 的 理论 考虑因素 ;
尽管我们曾刻意努力寻找一种完全独立于理论考量的描述性分类,

[ðə; ði] [rɪ'zʌlts] [ɑ:(r); ə(r)][ˈɔ:lməʊst][aɪ'dentɪk(ə)l] [wɪð] [ðə; ði][pɑ:θ] [ɒv; əv] [dɪ'veləpmənt] [dɪ'raɪvd] [baɪ] Jeans8
the results are almost identical with the path of development derived by Jeans8
这 结果 是 几乎 完全相同的 和 这 小路 的 发展 衍生的 经过 Jeans8
[frɒm; frəm] [ˈpjʊəli] [θɪə'retɪk(ə)l] [ɪnˌvestə'geɪən] .
from purely theoretical investigations .
从 纯粹 理论 调查 .
结果与 Jeans8 通过纯粹的理论研究得出的发展路径几乎完全一致。

[ðə; ði] [ə'gri:mənt] [ɪz] [ˈveri] [sə'dʒestɪv] [ɪn] [vju:; ɒv; əv][ðə; ði][wɑ:d] [fi:ld] [ˈkʌvəd] [baɪ][ðə; ði][ˈdeɪtə] ,
The agreement is very suggestive in view of the wide field covered by the data ,
这 协议 是 非常 暗示性的 在 看法 的 这 宽的 场地 涵盖 经过 这 数据 ,
考虑到数据涵盖范围之广, 该协议具有很强的启发意义。

[ænd; ənd] - [ˈθɪəri] [maɪt] [hæv; həv] [bi:n] [ju:st] [bəʊθ][tu:; tə] [ɪn'tɜ:prət] [ðə; ði] [ɑ:bzər'veɪʃənz]
and Jeans's theory might have been used both to interpret the observations
和 - 理论 可能 有 到过 用过的 两个都 到 解释 这 观察
[ænd; ənd][tu:; tə] [gaɪd] [rɪ'sɜ:tɪ] .
and to guide research .
和 到 指导 研究 .
Jeans 的理论既可以用来解释观察结果, 也可以用来指导研究。

[aɪ ˈti:][ʃʊd; ʃəd][bi:; bi] [bɔ:n] [ɪn][maɪnd] , [haʊ'evə(r)] ,
It should be borne in mind , however ,
它 应该 是 出生 在 头脑 , 然而 ,
然而, 应该记住的是:

[ðæt] [ðə; ði][ˈbeɪsɪs][ɒv; əv][ðə; ði][ˌklæsɪfɪˈkeɪ](ə)n][ɪz] [dɪ'skrɪptɪv] [ænd; ənd] [ɪn'taɪəli] [ɪndɪ'pendənt] [ɒv; əv]
that the basis of the classification is descriptive and entirely independent of
那 这 基础 的 这 分类 是 描述性的 和 完全 独立的 的
[ˈeni] [ˈθɪəri] .
any theory .
任何 理论 .
该分类的基础是描述性的, 并且完全独立于任何理论。

[ɪˈlɪptɪk(ə)l] [ˈnebʊlɪ:] . — [ðɪ:z] [ɡɪv] [ˈɪmɪdʒɪz][ˈreɪndʒɪŋ][frɒm; frəm][ˈsɜ:kjələ(r)] [θru:] [ˈflætənɪŋ]
Elliptical nebulae . — These give images ranging from circular through flattening
椭圆形 星云 . — 这些 给 图片 范围 从 圆 通过 扁平化
[ɪˈlɪpsɪz] [tu:; tə][ə; eɪ] [ˈlɪmɪtɪŋ] [lenˈtɪkjʊlə(r)][ˈfɪɡə(r)][ɪn] [wɪt]] [ðə; ði][ˈreɪʃjəʊ][ɒv; əv][ðə; ði][ˈæksɪ:z][ɪz][əˈbaʊt]
ellipses to a limiting lenticular figure in which the ratio of the axes is about
省略号 到 一个 限制 透镜状的 数字 在 哪个 这 比率 的 这 轴 是 关于
[wʌn][tu:; tə][θɪri:][ɔ:(r)][fɔ:r] .
1 to 3 or 4 .
1 到 3 或者 4 .
椭圆星云——这些星云呈现出从圆形到扁平椭圆, 再到极限透镜状图形的图像, 其中轴比约为 1:3 或 4。

[ðeɪ] [ʃəʊ] [nəʊ] [ˈeɪdɪəns] [ɒv; əv][ˌrezəˈlu:ʃ(ə)n] , [naɪn][ænd; ənd][ðə; ði][ˈəʊnli][ˌkleɪm][tu:; tə][ˈstrʌkt(ə(r))][ɪz]
They show no evidence of resolution , 9 and the only claim to structure is
他们 展示 不 证据 的 解决 , 9 和 这 仅有的 宣称 到 结构 是
[ðæt] [ðə; ði][ˌlu:mɪnɒsəti] { [faɪv] }
that the luminosity { 5 }
那 这 亮度 { 5 }
它们没有显示出任何分辨率的证据, 9 并且唯一声称具有结构的是亮度{5}

[fɛɪdʒ] [ˈsmuːðli] [frɒm; frəm] [braɪt] [ˈnjuːkliə] [tuː; tə] [ɪnˈdeɪnət] [ˈedʒɪʒ] .
fades smoothly from bright nuclei to indefinite edges .
淡出 顺利 从 明亮的 细胞核 到 不定 边缘 .

从明亮的核部平滑过渡到模糊的边缘。

[daˈɪæmɪtəz] [ɑː(r); ə(r)] [ˈfʌŋk(ə)nz] [ɒv; əv] [ðə; ði] [ˈnjuːkliə(r)] [ˈbraɪtnəs] [ænd; ənd] [ðə; ði] [ɪkˈspəʊʒə(r)] [taɪmz] .
Diameters are functions of the nuclear brightness and the exposure times .
直径 是 函数 的 这 核 亮度 和 这 接触 时代 .
直径是核亮度和曝光时间的函数。

[plɛɪt] [ˌɛks,ɑɪˈaɪ]
PLATE XII
盘子 十二

图版十二

E0 [ˌɛnˈdʒiːˈsiː] -
E0 NGC 3379
E0 国家气管镜 -

E0 NGC 3379

E2 [ˌɛnˈdʒiːˈsiː] - ([em] -)
E2 NGC 221 (M 32)
E2 国家气管镜 - (M -)

E2 NGC 221 (M 32)

E5 [ˌɛnˈdʒiːˈsiː] - ([em] -)
E5 NGC 4621 (M 59)
E5 国家气管镜 - (M -)

E5 NGC 4621 (M 59)

E7 [ˌɛnˈdʒiːˈsiː] -
E7 NGC 3115
E7 国家气管镜 -

E7 NGC 3115

[ˌɛnˈdʒiːˈsiː] - ([em] -) ,
NGC 3034 (M 82) ,
国家气管镜 - (M -) ,

NGC 3034 (M 82)

[ˌɛnˈdʒiːˈsiː] -
NGC 4449
国家气管镜 -

NGC 4449

[ɪˈlɪptɪk(ə)] [ænd; ənd] [ɪˈregjələ(r)] [ˈneɪbjʊ.liː]
Elliptical and Irregular Nebulae
椭圆形 和 不规则的 星云

椭圆星云和不规则星云

[ðə; ði] [ˈəʊnli] [kraɪˈtɪəriən] [əˈveɪləb(ə)] [fɔː(r); fə(r)] [ˈfɜːðə(r)] [ˌklæsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n] [əˈprɪəz] [tuː; tə] [biː; bi] [ðə; ði] [dɪˈɡriː]
The only criterion available for further classification appears to be the degree
这 仅有的 标准 可用的 为了 更远 分类 出现 到 是 这 程度
[ɒv; əv] [ˌiːlɒŋˈɡeɪʃn] .
of elongation .
的 伸长 .
唯一可用于进一步分类的标准似乎是伸长程度。

[ˈlɪptɪk(ə)l] [ˈneɪbʊ.li:] [hæv; həv] [əˈkɔːdn̩li] [biːn] [ˈdeɪzɪneɪtɪd] [baɪ][ðə; ði][ˈsɪmb(ə)l] “ [iː] , ” [ˈfɒləʊd] [baɪ]
Elliptical nebulae have accordingly been designated by the symbol “ E , ” followed by
椭圆形 星云 有 因此 到过 指定的 经过 这 象征 “ E , ” 随后 经过
[ə; eɪ][ˈsɪŋg(ə)l][ˈfɪgə(r)] ,
a single figure ,
一个 单身的 数字 ,

因此，椭圆星云被标记为“E”，后面跟一个数字。

[ˌnjuːˈmerɪkli] [ˈiːkwəl][tuː; tə][ðə; ði] [ɪlɪpˈtɪsəti] ([ə; eɪ] - [biː]) / [ə; eɪ] [wɪð] [ðə; ði][ˈdesɪm(ə)l] [pɔɪnt] [əʊˈmɪtɪd] .
numerically equal to the ellipticity (a - b) / a with the decimal point omitted .
数值上 平等的 到 这 椭圆率 (一个 - b) / 一个 和 这 小数 观点 省略 .
数值上等于椭圆率 (a - b)/a，省略小数点。

[ðə; ði] [kəmˈpliːt] [ˈsɪəriːz][ɪz] E0 , E1 , . . . , E7 ,
The complete series is E0 , E1 , . . . , E7 ,
这 完全的 系列 是 E0 , E1 , . . . , E7 ,

完整的序列是 E0、E1、...、E7、

[ðə; ði][lɑːst] [ˌreprɪˈzentɪŋ] [ə; eɪ] [ˈdefɪnət] [ˈlɪmɪtɪŋ] [ˈfɪgə(r)] [wɪt] [mɑːrks][ðə; ði][ˈdʒʌŋk(ə)n] [wɪð] [ðə; ði]
the last representing a definite limiting figure which marks the junction with the
这 最后的 代表 一个 定 限制 数字 哪个 标记 这 交汇处 和 这
[ˈspaɪrəlz] .
spirals .
螺旋 .

最后一个图形代表一个明确的极限图形，标志着与螺旋线的连接点。

[ðə; ði] [ˈfriːkwənsi] [ˌdɪstrɪˈbjʊːʃn] [ɒv; əv] [əʊz] [mɔː(r)] [raʊnd] [ɔː(r)] [ˈniəli] [raʊnd] [ˈɪmɪdʒɪz]
The frequency distribution of ellipticities shows more round or nearly round images
这 频率 分配 的 椭圆率 演出 更多的 圆形的 或者 几乎 圆形的 图片
[ðæn; ðən][kæn; kən][biː; bi] [əˈkaʊntɪd] [fɔː(r); fə(r)][baɪ][ðə; ði][ˈrændəm][ˌɔːrɪənˈteɪ(ə)n][ɒv; əv][dɪsk] - [ˈʃeɪpt]
than can be accounted for by the random orientation of disk - shaped
比 能 是 已记录 为了 经过 这 随机的 方向 的 磁盘 - 形状
[ˈɒbdʒɪkts][əˈləʊŋ] .
objects alone .
对象 独自的 .

椭圆率的频率分布显示，圆形或近似圆形的图像比仅由圆盘状物体的随机方向所能解释的要多得多。

[aɪ ˈtiː][ɪz] [prɪˈzjuːmd] , [ˈðeəfɔː(r)] , [ðæt] [ðə; ði][ˈɪmɪdʒɪz] [ˌreprɪˈzent] [ˈneɪbʊ.liː] [ˈreɪndʒɪŋ][frɒm; frəm]
It is presumed , therefore , that the images represent nebulae ranging from
它 是 假定 , 所以 , 那 这 图片 代表 星云 范围 从
[ˈɡləʊbjələ(r)][tuː; tə][lenˈtɪkʊlə(r)] , [ˈɔːrɪentɪd] [æt; ət][ˈrændəm] .
globular to lenticular , oriented at random .
球形 到 透镜状的 , 定向 在 随机的 .

因此，可以推测这些图像代表了从球状到透镜状的各种星云，方向随机。

[nəʊ][ˈsɪmp(ə)l] [ˈmeθəd] [hæz; həz] [jet] [biːn] [ɪˈstæblɪʃt] [fɔː(r); fə(r)] [ˌdɪfəˈrenʃɪeɪtɪŋ] [ðə; ði][ˈæktʃuəl]
No simple method has yet been established for differentiating the actual
不 简单的 方法 有 然而 到过 已确立的 为了 区分 这 实际的
[frɒm; frəm][ðə; ði][prəˈdʒektɪd][ˈfɪgə(r)][ɒv; əv][æŋ; ən][ˌɪndɪˈvɪdʒuəl][ˈɒbdʒɪkt; əbˈdʒekt] ,
from the projected figure of an individual object ,
从 这 预计 数字 的 一个 个人 目的 ,

目前还没有建立起区分单个物体实际形状和投影形状的简便方法。

[ɔːlˈðəʊ] [rɪˈfaɪnd] [ɪnˌvestrɪˈgeɪ(ə)n] [ˈfəːnɪʃ] [ə; eɪ][kraɪˈtɪəriən][ɪn][ðə; ði][rɪˈleɪ(ə)n] [brɪˈtwiːn] [ˈnjuː.kliə(r)]
although refined investigation furnishes a criterion in the relation between nuclear
虽然 精制 调查 提供 一个 标准 在 这 关系 之间 核
[ˈbraɪtnəs] [ænd; ænd][ˈmæksɪməm][daɪˈæmɪtəz] .
brightness and maximum diameters .
亮度 和 最大限度 直径 .

尽管精细的研究提供了核亮度与最大直径之间关系的一个标准。

[fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði][ˈprez(ə)nt] , [haʊˈevə(r)] ,
For the present , however ,
为了 这 展示 , 然而 ,

但就目前而言，

[aɪˈti:] [mʌst; məst] [bi:: bi] [ˈri:əlaɪzd] [ðæt] [ˈeni] [lɪst] [ɒv; əv] [ˈnebʊli:] [ˈhævɪŋ] [ə; eɪ] [ˈgɪv(ə)n] [əˈpærənt]
it must be realized that any list of nebulae having a given apparent
它 必须 是 已实现 那 任何 列表 的 星云 拥有 一个 给定 明显
[ɪlɪpˈtɪsəti] [wɪl] [ɪnˈklu:d] [ə; eɪ] [ˈnʌmbə(r)] [ɒv; əv] [ˈtɪltɪd] [ˈɒbdʒɪkts] [ˈhævɪŋ] [ˈgreɪtə(r)] [ˈæktʃuəl]
ellipticity will include a number of tilted objects having greater actual ellipticities .
椭圆率 将要 包括 一个 数字 的 斜 对象 拥有 更大的 实际的 椭圆率 .

必须认识到，任何具有给定视椭圆率的星云列表都将包含一些倾斜天体，这些天体的实际椭圆率更大。

[ðə; ði][stəˈtɪstɪk(ə)l] [ˈævərɪdʒ] [wɪl] [bi:: bi] [tu:] [ləʊ] , [ɪkˈsept] [fɔ:(r); fə(r)] E7 ,
The statistical average will be too low , except for E7 ,
这 统计 平均的 将要 是 也 低的 , 除了 为了 E7 ,

除了E7之外，其他项目的统计平均值都会偏低。

[ænd; ænd][ðə; ði][ˈerə(r)] [wɪl] [ɪnˈkri:s] [wɪð] [dɪˈkri:sɪŋ] [ɪlɪpˈtɪsəti] .
and the error will increase with decreasing ellipticity .
和 这 错误 将要 增加 和 递减 椭圆率 .

椭圆率越小，误差越大。

[ˈnɔ:m(ə)l] [ˈspɑɪrəlz] . — [ɔ:l] [ˈregjələ(r)] [ˈnebʊli:] [wɪð] [ˈgreɪtə(r)] [ðæn; ðən] [əˈbaʊt] E7 [ɑ:(r); ə(r)]
Normal spirals . — All regular nebulae with ellipticities greater than about E7 are
普通的 螺旋 : — 全部 常规的 星云 和 椭圆率 更大的 比 关于 E7 是
[ˈspɑɪrəlz] ,
spirals ,
螺旋 ,

正常旋涡星云——所有椭率大于约E7的规则星云都是旋涡星云。

[ænd; ænd][nəʊ] [ˈspɑɪrəlz] [ɑ:(r); ə(r)] [nəʊn] [wɪð] [les] [ðæn; ðən] [ðɪs] [ˈlɪmɪt] .
and no spirals are known with ellipticities less than this limit .
和 不 螺旋 是 已知 和 椭圆率 较少的 比 这 限制 .

目前尚未发现椭圆率小于此极限的旋涡星系。

[æt; ət] [ðɪs] [pɔɪnt] [ɪn][ðə; ði] [ˈsi:kwəns] , [haʊˈevə(r)] ,
At this point in the sequence , however ,
在 这 观点 在 这 顺序 , 然而 ,

然而，在序列的这一步，

[ɪlɪpˈtɪsəti] [brɪˈkʌmz] [ɪnˈsensətɪv] [æz; əz] [ə; eɪ] [kraɪˈtɪəriən] [ænd; ænd] [ɪz] [rɪˈpleɪsd] [baɪ] [kənˈspɪkjʊəs]
ellipticity becomes insensitive as a criterion and is replaced by conspicuous
椭圆率 变成 冷漠无情 作为 一个 标准 和 是 替换 经过 显眼的
[ˈstrʌktʃərəl] [ˈfi:tʃəz] [wɪtʃ] [naʊ] [brɪˈkʌm] [əˈveɪləb(ə)l] [fɔ:(r); fə(r)] [ˌklæsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n] .
structural features which now become available for classification .
结构 特征 哪个 现在 变得 可用的 为了 分类 .

椭圆性不再是判断标准，取而代之的是显著的结构特征，这些特征现在可以用于分类。

[ɒv; əv] [ði:z] , [ˈpræktɪkli] [ˈspi:kɪŋ] ,
Of these , practically speaking ,
的 这些 , 几乎 请讲 ,

实际上，其中

[ðeə(r)] [ɑ:(r); ə(r)] [θri:] [wɪtʃ] [fɪks] [ðə; ði] [pəˈzɪʃ(ə)n] [ɒv; əv] [æŋ; ən] [ˈɒbdʒɪkt; əbˈdʒekt] [ɪn][ðə; ði] [ˈsi:kwəns]
there are three which fix the position of an object in the sequence
那里 是 三 哪个 使固定 这 位置 的 一个 目的 在 这 顺序
[ɒv; əv] [fɔ:mz] :
of forms :
的 表格 :

有三种方法可以确定对象在表单序列中的位置：

([wʌn]) [ˈrelətɪv] [saɪz][ɒv; əv][ðə; ði] [ˌʌnrɪˈzɒlvd] [ˈnjuːkliə(r)][ˈriːdʒən] ; ([tuːˈtuː]) [ɪkˈstent][tuː; tə] [wɪt]
(1) relative size of the unresolved nuclear region ; (2) extent to which
(1) 相对的 尺寸 的 这 未解决 核 地区 ; (2) 程度 到 哪个
[ðə; ði][ɑːmz][ɑː(r); ə(r)] [ˌʌnˈwaʊnd] ;
the arms are unwound ;
这 武器 是 解开 ;

(1) 未解析核区的相对大小；(2) 臂解旋的程度；

([θriː]) [dɪˈɡriː] [ɒv; əv][ˌrezəˈluːʃ(ə)n][ɪn][ðə; ði][ɑːmz] .
(3) degree of resolution in the arms .
(3) 程度 的 解决 在 这 武器 .

(3) 手臂的分辨率程度。

[ðə; ði] [fɔːm] [məʊst] [ˈniəli] [rɪˈleɪtɪd] [tuː; tə][ðə; ði] [rɪˈlɪptɪk(ə)l] [ˈnebʃʊliː] [hæz; həz][ə; eɪ] [lɑːdʒ] [ˈnjuːkliə(r)]
The form most nearly related to the elliptical nebulae has a large nuclear
这 形式 最多 几乎 有关的 到 这 椭圆形 星云 有 一个 大的 核
[ˈriːdʒən][ˈsɪmələ(r)][tuː; tə] E7 ,
region similar to E7 ,
地区 相似的 到 E7 ,

与椭圆星云最接近的星云具有类似于E7的大型核区。

[əˈraʊnd] [wɪt] [ɑː(r); ə(r)] [ˈkləʊsli] [kɔɪld] [ɑːmz][ɒv; əv] [ˌʌnrɪˈzɒlvd] [ˌnebʃʊˈlɒsəti] .
around which are closely coiled arms of unresolved nebulosity .
大约 哪个 是 密切 卷曲 武器 的 未解决 星云 .

周围环绕着紧密盘绕的未解析星云。

[ðen] [ˈfɒləʊ] [ˈɒbdʒɪkts][ɪn] [wɪt] [ðə; ði][ɑːmz] [əˈpɪə(r)] [tuː; tə] [bɪld] [ʌp][æt; ət][ðə; ði] [ɪkˈspens] [ɒv; əv]
Then follow objects in which the arms appear to build up at the expense of
然后 跟随 对象 在 哪个 这 武器 出现 到 建造 向上 在 这 费用 的
[ðə; ði][ˈnjuːkliə(r)][ˈriːdʒənz][ænd; ænd][ˌʌnˈwaɪnd][æz; əz] [ðeɪ] [grəʊ] ;
the nuclear regions and unwind as they grow ;
这 核 地区 和 放松 作为 他们 生长 ;

然后观察那些武器似乎以牺牲核区域为代价而不断积累，并随着其增长而逐渐瓦解的物体；

[ɪn][ðə; ði][end] , [ðə; ði][ɑːmz][ɑː(r); ə(r)][waɪd][ˈəʊpən][ænd; ænd][ðə; ði][ˈnjuːkliə] [ɪnkənˈspɪkjʊəs] .
in the end , the arms are wide open and the nuclei inconspicuous .
在 这 结尾 , 这 武器 是 宽的 打开 和 这 细胞核 不显眼 .

最后，细胞臂完全张开，细胞核变得不明显。

[ˈɜːli] [ɪn][ðə; ði][ˈsɪəriːz][ðə; ði][ɑːmz] [bɪˈɡɪn] [tuː; tə] [breɪk] [ʌp][ˈɪntuː] [ˌkɑːndənˈseɪʃənz] , [ðə; ði][ˌrezəˈluːʃ(ə)n] {
Early in the series the arms begin to break up into condensations , the resolution {
早期的 在 这 系列 这 武器 开始 到 休息 向上 进入 冷凝 , 这 解决 {
[sɪks] }
6 }
6 }

系列早期，臂开始分裂成凝聚体，分辨率{6}

[kəˈmensɪŋ] [ɪn][ðə; ði][ˈaʊtə(r)][ˈriːdʒənz][ænd; ænd] [ˈwɜːkɪŋ] [ˈɪnwəd] [ʌnˈtɪl][ɪn][ðə; ði][ˈfaɪn(ə)l][ˈsteɪdʒɪz]
commencing in the outer regions and working inward until in the final stages
开始 在 这 外 地区 和 在职的 向内 直到 在 这 最终的 阶段
[ˌaɪˈtiː] [ˈriːtɪz] [ðə; ði][ˈnjuːkliəs][ɪtˈself] .
it reaches the nucleus itself .
它 到达 这 核 本身 .

从外层区域开始，逐渐向内推进，最终到达细胞核本身。

[ɪn][ðə; ði][ˈlɑːdʒə(r)][ˈspaɪrəlz] [weə(r)] [ˈkrɪtɪk(ə)l][ˌɑːbzərˈveɪʃənz] [ɑː(r); ə(r)][ˈpɒsəb(ə)l] ,
In the larger spirals where critical observations are possible ,
在 这 更大的 螺旋 在哪里 批判的 观察 是 可能的 ,

在可以进行关键观测的大型螺旋星系中，

[ði:z] [kɑ:ndən'seɪʃənz] [ɑ:(r); ə(r)] [fəʊnd] [tu:; tə][bi:; bi]'æktʃuəl] [sta:z] [ænd; ənd] [gru:ps] [ɒv; əv] [sta:z] .
these condensations are found to be actual stars and groups of stars .
这些 冷凝 是 成立 到 是 实际的 明星 和 团体 的 明星 .

研究发现，这些凝聚体实际上是恒星和恒星群。

[ðə; ði] ['strʌktʃərəl] [træn'zɪ(ə)n][ɪz][səʊ] [smu:ð] [ænd; ənd] [kən'tɪnjuəs] [ðæt] [ðə; ði] [sɪ'lekʃ(ə)n] [ɒv; əv]
The structural transition is so smooth and continuous that the selection of
这 结构 过渡 是 所以 光滑的 和 连续的 那 这 选择 的
[dɪ'vɪʒ(ə)n] [pɔɪnts] [fɔ:(r); fə(r)] ['fɜ:ðə(r)] [klæsɪfɪ'keɪ(ə)n][ɪz]['rɑ:ðə(r)] ['ɑ:bitrəri] .
division points for further classification is rather arbitrary .
分配 积分 为了 更远 分类 是 相当 随意的 .

结构过渡非常平滑和连续，因此选择划分点进行进一步分类是相当任意的。

[ðə; ði] [endz] [ɒv; əv][ðə; ði] ['siəri:z][ɑ:(r); ə(r)] [ʌnmɪ'steɪkəbl] , [haʊ'evə(r)] , [ænd; ənd] , [ɪn][ə; eɪ]['dʒen(ə)rəl]
The ends of the series are unmistakable , however , and , in a general
这 结束 的 这 系列 是 毋庸置疑 , 然而 , 和 , 在 一个 一般的
[wei] ,
way ,
方式 ,

然而，该系列的结局是毋庸置疑的，而且总的来说，

[aɪ 'ti:][ɪz]['pɒsəb(ə)][tu:; tə] [dɪfə'renʃiət] [ə; eɪ]['mɪd(ə)] [gru:p] .
it is possible to differentiate a middle group .
它 是 可能的 到 区分 一个 中间 团体 .
可以区分出一个中间群体。

[ði:z] [θri:] [gru:ps] [ɑ:(r); ə(r)] ['deɪʒɪneɪtɪd] [baɪ][ðə; ði][nɒn] - [kə'mɪtl] ['letəz] “ [ə; eɪ] , ”
These three groups are designated by the non - committal letters “ a , ”
这些 三 团体 是 指定的 经过 这 非 - 入狱 信件 “ 一个 , ”
这三组分别用含义模糊的字母“a”表示。

“ [bi:] ,
“ **b** ,
“ b ,

b,

“ [ænd; ənd] “ [si:] “ [ə'tætʃt] [tu:; tə][ðə; ði]['spairəl] ['sɪmbəlz] “ [es] , “ [ænd; ənd] ,
“ **and** “ **c** “ **attached to the spiral symbols “ S , “ and ,**
“ 和 “ c “ 随附的 到 这 螺旋 符号 “ S , “ 和 ,
“和“c”附着在螺旋符号“S”上,,

[wɪð] ['refrəns] [tu:; tə][ðeə(r)][pə'zɪ(ə)n][ɪn][ðə; ði] ['si:kwəns] , [ɑ:(r); ə(r)] [kɔ:ld] “ ['ɜ:li] , “
with reference to their position in the sequence , are called “ early , “
和 参考 到 他们的 位置 在 这 顺序 , 是 称为 “ 早期的 , “
根据它们在序列中的位置，被称为“早期的”。

“ [ɪntə'mi:diət] ,
“ **intermediate** ,
“ 中间的 ,

“中间的,

“ [ænd; ənd] “ [leɪt] “ [taɪps] . - [ə; eɪ][mɔ:(r)] [prɪ'saɪs] [sʌbdɪ'vɪʒ(ə)n] , [ɒn][ə; eɪ]['desɪm(ə)] [skeɪl] [fɔ:(r); fə(r)]
“ **and** “ **late** “ **types . 10 A more precise subdivision , on a decimal scale for**
“ 和 “ 晚的 “ 类型 : - 一个 更多的 精确的 细分 , 在 一个 小数 规模 为了
[ɪg'zɑ:mp(ə)] ,
example ,
例子 ,

“和“晚期”类型。10 更精确的细分，例如用十进制刻度，

[ɪz][nɒt]['dʒʌstɪfaɪd][ɪn][ðə; ði]['prez(ə)nt] [steɪt] [ɒv; əv]['aʊə(r)] ['nɒlɪdʒ] .
is not justified in the present state of our knowledge .
是 不是 合理的 在 这 展示 状态 的 我们的 知识 .

以我们目前的认知水平来看，这种做法并不合理。

[ɪn][ðə; ði] ['ʒ:li] [taɪps] , [ðə; ði] [ɡru:p] ['ɛs.ɛɪ] ,
In the early types , the group Sa ,
在 这 早期的 类型 , 这 团体 萨 ,

在早期类型中, Sa组,

[məʊst][ɒv; əv][ðə; ði][ˌneɪbʊlɒsəti][ɪz][ɪn][ðə; ði][ˈnju:kliə(r)][ˈri:dʒən][ænd; ənd][ðə; ði][ɑ:mz][ɑ:(r); ə(r)] ['kləʊsli]
most of the nebosity is in the nuclear region and the arms are closely
最多 的 这 星云 是 在 这 核 地区 和 这 武器 是 密切
[kɔɪld] [ænd; ənd] [ˌʌnrɪ'zɒlvd] .
coiled and unresolved .
卷曲 和 未解决 .

大部分星云集中在核区, 旋臂紧密盘绕, 难以分辨。

[en] . [dʒi:] . [si:] . - [ænd; ənd] - [ɑ:(r); ə(r)] [ə'mʌŋ] [ðə; ði][ˈleɪtɪst][ɒv; əv] [ðɪs] [ɡru:p] .
N . G . C . 3368 and 4274 are among the latest of this group .
N . G . C . - 和 - 是 之中 这 最新的 的 这 团体 .

NGC 3368 和 4274 是该星系群中最新发现的星系之一。

[ðə; ði] [ˌɪntə'mi:diət] [ɡru:p] , [ˈsʌmbədi] , [ɪnk'lu:dʒ] [ˈɒbdʒɪkts] [ˈhævɪŋ] [ˈrelatɪvli] [lɑ:dʒ] [ˈnju:kliə(r)][ˈri:dʒənz]
The intermediate group , Sb , includes objects having relatively large nuclear regions
这 中间的 团体 , 某人 , 包括 对象 拥有 相对地 大的 核 地区
[ænd; ənd] [θɪn] [ˈrɑ:ðə(r)][ˈəʊpən][ɑ:mz] ,
and thin rather open arms ,
和 薄的 相当 打开 武器 ,

中间族 (Sb) 包括具有相对较大核区和较细开放臂的天体。

[æz; əz][ɪn][em] - , [ɔ:(r)][ə; ɛɪ][smɔ:lə(r)][ˈnju:kliə(r)][ˈri:dʒən] [wɪð] ['kləʊsli] [kɔɪld] [ɑ:mz] , [æz; əz][ɪn][em] - .
as in M 81 , or a smaller nuclear region with closely coiled arms , as in M 94 .
作为 在 M - , 或者 一个 较小的 核 地区 和 密切 卷曲 武器 , 作为 在 M - .

如 M 81 那样, 或者如 M 94 那样, 具有紧密卷曲臂的较小核区。

[ði:z] [tu:] [ˈneɪbʊli:] [ˌreprɪ'zent] [ðə; ði][ˈlætərəl][ɪk'stenʃ(ə)n][ɒv; əv][ðə; ði] ['si:kwəns] [ɪn][ðə; ði]
These two nebulae represent the lateral extension of the sequence in the
这些 二 星云 代表 这 侧 扩大 的 这 顺序 在 这
[ˌɪntə'mi:diət] ['sekʃ(ə)n] .
intermediate section .
中间的 部分 .

这两个星云代表了中间部分序列的横向延伸。

[ðə; ði][ɪk'stenʃ(ə)n] [ə'lɒŋ] [ðə; ði] ['si:kwəns] [ɪz] [ə'prɒksɪmətli] [ˌreprɪ'zentɪd] [baɪ][en] . [dʒi:] . [si:] . - ,
The extension along the sequence is approximately represented by N . G . C . 4826 ,
这 扩大 沿着 这 顺序 是 大约 代表 经过 N . G . C . - ,
[ə'mʌŋ] [ðə; ði] [ˈɜ:lɪst] [ɒv; əv][ðə; ði][ˈsʌmbədi] ,
among the earliest of the Sb ,
之中 这 最早 的 这 某人 ,

沿该序列的延伸大致由 NGC 4826 代表, 它是 Sb 星团中最古老的星团之一。

[ænd; ənd][en] . [dʒi:] . [si:] . - [ænd; ənd] - , [wɪt] [ɑ:(r); ə(r)] [ə'mʌŋ] [ðə; ði][ˈleɪtɪst] .
and N . G . C . 3556 and 7331 , which are among the latest .
和 N . G . C . - 和 - , 哪个 是 之中 这 最新的 .

还有 NGC 3556 和 7331, 它们是最新发现的星系之一。

[ðə; ði][ˌrezə'lʊ:ʃ(ə)n][ɪn][ðə; ði][ɑ:mz][ɪz][ˈseldəm] [kən'spɪkjʊəs] , [ɔ:'ðəʊ] [ɪn][em] - , [ə; ɛɪ][ˈtɪpɪk(ə)l]
The resolution in the arms is seldom conspicuous , although in M 31 , a typical
这 解决 在 这 武器 是 很少 显眼的 , 虽然 在 M - , 一个 典型的
[ˈsʌmbədi] ,
Sb ,
某人 ,

臂部的分辨率很少很突出, 尽管在 M 31 中, 一个典型的 Sb,

[aɪˈtiː][ɪz][ˈveri] [prəˈnaʊnst] [ɪn][ðə; ði][ˈaʊtə(r)] [ˈpɔːʃənz] .
it is very pronounced in the outer portions .
它 是 非常 发音 在 这 外 部分 .

在外侧部分尤为明显。

[plɛt] [ˌɛks,ɑɪˈɑɪˈɑɪ]
PLATE XIII
盘子 十三

图版十三

[ˈɛs.eɪ][ˌɛnˈdʒiːˈsiː] -
Sa NGC 4594
萨 国家气管镜 -

Sa NGC 4594

[ˌɛs,biːˈeɪ] [ˌɛnˈdʒiːˈsiː] -
SBa NGC 2859
小企业管理局 国家气管镜 -

SBa NGC 2859

[ˈsʌmbədi][ˌɛnˈdʒiːˈsiː] -
Sb NGC 2841
某人 国家气管镜 -

Sb NGC 2841

[ˌɛs,biːˈbiː][ˌɛnˈdʒiːˈsiː] -
SBb NGC 5850
sbb 国家气管镜 -

SBb NGC 5850

[ˌɛsˈsiː][ˌɛnˈdʒiːˈsiː] - ([em] -) ,
Sc NGC 5457 (M 101) ,
Sc 国家气管镜 - (M -) ,

Sc NGC 5457 (M 101),

[ˌɛs,biːˈsiː][ˌɛnˈdʒiːˈsiː] -
SBc NGC 7479
sbc 国家气管镜 -

SBc NGC 7479

[ˈnɔːm(ə)][ænd; ənd] [baːd] [ˈspaɪrəlz] { [ˈsevən] }
Normal and Barred Spirals { 7 }
普通的 和 禁止 螺旋 { 7 }

正旋涡和棒旋涡{7}

[ðə; ði] [ˌkærəktəˈrɪstɪks] [ɒv; əv][ðə; ði] [lɛrt] [taɪps] , [ðə; ði] [ɡruːp] [ɛsˈsiː] ,
The characteristics of the late types , the group Sc ,
这 特征 的 这 晚的 类型 , 这 团体 Sc ,

晚期类型（Sc组）的特征

[ɑː(r); ə(r)][mɔː(r)] [ˈdefɪnət] — [æn; ən] [ɪnkənˈspɪkjʊəs] [ˈnjuːkliəs][ænd; ənd] [ˈhaɪli] [rɪˈzɒlvd] [ɑːmz] .
are more definite — an inconspicuous nucleus and highly resolved arms .
是 更多的 定 — 一个 不显眼 核 和 高度 已解决 武器 .

更明确——一个不显眼的核和高度分辨的臂。

[ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl][stɑːz] [ˈkænɒt] [biː; bi] [siːn] [ɪn][ðə; ði][smɔːlə(r)] [ˈnebʊˌliː][ɒv; əv] [ðɪs] [ɡruːp] , [bʌt; bət] [nɒts]
Individual stars cannot be seen in the smaller nebulae of this group , but knots
个人 明星 不能 是 已见 在 这 较小的 星云 的 这 团体 , 但 绳结

[ɑː(r); ə(r)] [kənˈspɪkjʊəs] ,
are conspicuous ,
是 显眼的 ,

在这个星群中较小的星云中，无法看到单个恒星，但星云结却很显眼。

[wɪtʃ] , [ɪn][ˈlɑːdʒə(r)][ˈɒbdʒɪkts] , [ɑː(r); ə(r)] [nəʊn] [tuː; tə][biː; bi] [ɡruːps] [ænd; ənd] [ˈklʌstəz] [ɒv; əv] [stɑːz] .
which , in larger objects , are known to be groups and clusters of stars .
哪个 , 在 更大的 对象 , 是 已知 到 是 团体 和 集群 的 明星 .

在较大的天体中，它们被称为恒星群和星团。

[ðə; ði][ɪkˈstent][tuː; tə] [wɪtʃ] [ðə; ði][ɑːmz][ɑː(r); ə(r)][ˈəʊpənd] [ˈveərɪz][frɒm; frəm][em] - [tuː; tə][em] - ,
The extent to which the arms are opened varies from M 33 to M 101 ,
这 程度 到 哪个 这 武器 是 打开 变化 从 M - 33 到 M - 101 ,
手臂的张开程度从 M 33 到 M 101 不等。

[bəʊθ][ˈtɪpɪk(ə)][ˌɛsˈsiː] [ˈnebʊˌliː] .
both typical Sc nebulae .
两个都 典型的 Sc 星云 .
都是典型的Sc星云。

[bɑːd] [ˈspaɪrəlz] . — [ɪn][ðə; ði][ˈnɔːm(ə)l][ˈspaɪrəl][ðə; ði][ɑːmz] [rɪˈmɜːdʒ] [frɒm; frəm] [tuː] [ˈɒpəzɪt] [pɔɪnts]
Barred spirals . — In the normal spiral the arms emerge from two opposite points
禁止 螺旋 . — 在 这 普通的 螺旋 这 武器 出现 从 二 对面的 积分
[ɒn][ðə; ði] [pəˈrɪfəri] [ɒv; əv][ðə; ði][ˈnjuːkliə(r)][ˈriːdʒən] .
on the periphery of the nuclear region .
在 这 周边 的 这 核 地区 .

棒旋——在正常的螺旋结构中，旋臂从核区外围的两个相对点伸出。

[ðeə(r)][ɪz] , [haʊˈevə(r)] , [ə; eɪ][smɔːlə(r)] [ɡruːp] , [kənˈteɪnɪŋ] [əˈbaʊt] - [pə(r)][sent][ɒv; əv][ɔːl][ˈspaɪrəlz] ,
There is , however , a smaller group , containing about 20 per cent of all spirals ,
那里 是 , 然而 , 一个 较小的 团体 , 包含 关于 - 每 中心 的 全部 螺旋 ,
然而，还有一小群螺旋结构，约占所有螺旋结构的20%。

[ɪn] [wɪtʃ] [ə; eɪ][bɑː(r)][ɒv; əv][ˌnebʊˈləsəti][ɪkˈstendz; ek-] [ˌdaɪəˈmetrɪkli] [əˈkrɒs] [ðə; ði][ˈnjuːkliəs] .
in which a bar of nebulosity extends diametrically across the nucleus .
在 哪个 一个 酒吧 的 星云 扩展 径直地 穿过 这 核 .
其中，一束星云状的柱状物横跨星核。

[ɪn] [ðiːz] [ˈspaɪrəlz] , [ðə; ði][ɑːmz] [sprɪŋ] [əˈbrʌptli] [frɒm; frəm][ðə; ði][endz][ɒv; əv] [ðɪs] [bɑː(r)] .
In these spirals , the arms spring abruptly from the ends of this bar .
在 这些 螺旋 , 这 武器 春天 突然 从 这 结束 的 这 酒吧 .
在这些螺旋线中，臂从杆的两端突然弹起。

[ðiːz] [ˈnebʊˌliː] [ˈɔːlsəʊ] [fɔːm] [ə; eɪ] [ˈsiːkwəns] , [wɪtʃ] [ˈpærələls] [ðæt] [ɒv; əv][ðə; ði][ˈnɔːm(ə)l][ˈspaɪrəlz] ,
These nebulae also form a sequence , which parallels that of the normal spirals ,
这些 星云 还 形式 一个 顺序 , 哪个 平行线 那 的 这 普通的 螺旋 ,
这些星云也形成了一个序列，与普通旋涡星系的序列平行。

[ðə; ði][ɑːmz] [əˈpærəntli] [ˌʌnˈwaɪnd] , [ðə; ði][ˈnjuːkliəɪ][ˈdwaɪnd(ə)l] , [ðə; ði] [ˌkɔːndənˈseɪʃənz] [fɔːm] [ænd; ənd]
the arms apparently unwind , the nuclei dwindle , the condensations form and
这 武器 显然 放松 , 这 细胞核 减少 , 这 冷凝 形式 和
[wɜːk] [ˈɪnwəd] .
work inward .
工作 向内 .

臂状结构似乎展开，原子核缩小，凝聚体形成并向内运动。

[eɪtʃ] . [diː] . Curtis11 [fɜːst] [kɔːld] [əˈtenʃ(ə)n] [tuː; tə] [ðiːz] [ˈnebʊˌliː] [wen] [hiː; hi] [dɪˈskraɪbd] [ˈsevrəl] [ɪn]
H . D . Curtis11 first called attention to these nebulae when he described several in
H . D . Curtis11 第一的 称为 注意力 到 这些 星云 什么时候 他 描述 一些 在
[ðə; ði] [ɪntəˈmiːdiət] [stɛrdʒɪz][ɒv; əv][ðə; ði][ˈsɪəriːz][ænd; ənd] [kɔːld] [ðem; ðəm] - - [taɪp] [ˈspaɪrəlz] .
the intermediate stages of the series and called them φ - type spirals .
这 中间的 阶段 的 这 系列 和 称为 他们 - - 类型 螺旋 .
HD Curtis11 首次注意到这些星云，他描述了该系列中几个处于中间阶段的星云，并称它们为 φ 型旋涡星云。

[ðə; ði][bɑ:(r)] , [haʊ'evə(r)] , ['nevə(r)][ɪk'stendz; ek-] [brɪ'pɒnd] [ðə; ði]['ɪnə(r)][ˈspairəl] [ɑ:mz] , [ænd; ənd][ðə; ði]
The bar , however , never extends beyond the inner spiral arms , and the
这 酒吧 , 然而 , 绝不 扩展 超过 这 内 螺旋 武器 , 和 这
[ˈstrʌktə(r)] ,
structure ,
结构 ,

然而，横梁从未超出内部螺旋臂的范围，并且该结构，

[ɪˈspeʃəli] [ɪn][ðə; ði] [ˈɜ:li] [ˈpɔ:](ə)n] [ɒv; əv][ðə; ði] [ˈsi:kwəns] , [ɪz][mɔ:(r)] [ˈækjərətli] [ˌreprɪˈzentɪd] [baɪ]
especially in the early portion of the sequence , is more accurately represented by
尤其 在 这 早期的 部分 的 这 顺序 , 是 更多的 准确 代表 经过
[ðə; ði] [gri:k] [ˈletə(r)] - .
the Greek letter θ .
这 希腊语 信 - .

尤其是在序列的早期部分，用希腊字母θ更准确地表示。

[frɒm; frəm][ə; eɪ][daɪˈnæmɪk(ə)l] [pɔɪnt] [ɒv; əv] [vju:] , [ðə; ði] [dɪˈstɪŋkʃn] [hæz; hæz][kənˈsɪdərəb(ə)l]
From a dynamical point of view , the distinction has considerable
从 一个 动态 观点 的 看法 , 这 区别 有 大量
[sɪɡˈnɪfɪkəns] .
significance .
意义 .

从动力学的角度来看，这种区别具有相当大的意义。

[sɪns] [gri:k] [ˈletəz] [ɑ:(r); ə(r)] [ɪnkənˈvi:niənt] [fɔ:(r); fə(r)] [ˈkætələɡɪŋ] [pɜːpəsɪz] , [ðə; ði] [ˈɪŋɡlɪʃ] [tɜ:m] ,
Since Greek letters are inconvenient for cataloguing purposes , the English term ,
自从 希腊语 信件 是 不方便 为了 编目 目的 , 这 英语 学期 ,
" [bɑ:d] [ˈspairəl] ,
" barred spiral ,
" 禁止 螺旋 ,

由于希腊字母不便于编目，因此使用了英文术语“barred spiral”。

[ɪz] [prəˈpəʊzd] , [wɪt]] [kæn; kən][bi:; bi] [kənˈtræktɪd] [tu:; tə][ðə; ði][ˈsɪmb(ə)l] " [ˈsʌmbədi] .
" is proposed , which can be contracted to the symbol " SB .
" 是 建议的 , 哪个 能 是 合同 到 这 象征 " SB .

建议采用“SB”符号，可缩写为“SB”。

" [ðə; ði][ˈsʌmbədi][ˈsɪəri:z] , [laɪk] [ðæt] [ɒv; əv][ðə; ði][ˈnɔ:m(ə)l][ˈspairəlz] , [ɪz][dɪˈvaɪdɪd][ˈɪntu:] [θri:] [ˈrʌfli]
" The SB series , like that of the normal spirals , is divided into three roughly
" 这 SB 系列 , 喜欢 那 的 这 普通的 螺旋 , 是 分割 进入 三 大致
[ˈi:kwəl] [ˈsekʃənz] ,
equal sections ,
平等的 部分 ,

“SB系列，就像普通螺旋线一样，被分为三个大致相等的部分，

[dɪˈstɪŋɡwɪʃt] [baɪ][ðə; ði] [əˈpendɪd] [ˈletəz] " [ə; eɪ] , "
distinguished by the appended letters " a , "
杰出的 经过 这 附加 信件 " 一个 , "
以附加字母“a”来区分，

" [bi:] ,
" b ,
" b ,
b,

" [ænd; ənd] " [si:] . " [ðə; ði][kraɪˈtɪəriə][ɒn] [wɪt]] [ðə; ði][dɪˈvɪʒ(ə)n][ɪz] [beɪst] [ɑ:(r); ə(r)][ˈsɪmələ(r)][ɪn]
" and " c . " The criteria on which the division is based are similar in
" 和 " c . " 这 标准 在 哪个 这 分配 是 基于 是 相似的 在
[ˈdʒen(ə)rəl][tu:; tə] [ðəʊz] [ju:st] [ɪn][ðə; ði][ˌklæsɪfɪˈkeɪ](ə)n] [ɒv; əv][ðə; ði][ˈnɔ:m(ə)l][ˈspairəlz] .
general to those used in the classification of the normal spirals .
一般的 到 那些 用过的 在 这 分类 的 这 普通的 螺旋 .

"和“c”。该划分所依据的标准与正常螺旋线的分类所依据的标准大致相似。

[ɪn][ðə; ði] ['ɜ:li:st] [fɔ:mz] , [ˌɛs.bi:'ei] , [ðə; ði][ɑ:mz][ɑ:(r); ə(r)][nɒt] [ˌdɪfə'renʃiəti:d] ,
In the earliest forms , SBa , the arms are not differentiated ,
在这 最早 表格 , 小企业管理局 , 这 武器 是 不是 差异化的 ,
在最早的形态中, SBa, 臂没有分化,

[ænd; ənd][ðə; ði]['pæt(ə)n][ɪz] [ðæt] [ɒv; əv][ə; ei]['sɜ:k(ə)l] [krɒst] [bɑ:][ə; ei][bɑ:(r)] , [ɔ:(r)] ,
and the pattern is that of a circle crossed by a bar , or ,
和 这 图案 是 那 的 一个 圆圈 交叉 经过 一个 酒吧 , 或者 ,
图案是一个圆圈被一根横线穿过, 或者说,

[æz; əz][hæz; hæz] [bi:n] ['menʃ(ə)nd] , [ðæt] [ɒv; əv][ðə; ði] [gri:k] ['letə(r)] - .
as has been mentioned , that of the Greek letter θ .
作为 有 到过 提及 , 那 的 这 希腊语 信 - .
正如前面提到的, 希腊字母θ。

[wen] [ðə; ði][bɑ:(r)][ɪz] ['ɔ:rientɪd] ['ni:əli] [ɪn][ðə; ði][laɪn][ɒv; əv] [saɪt] ,
When the bar is oriented nearly in the line of sight ,
什么时候 这 酒吧 是 定向 几乎 在 这 线 的 视线 ,
当酒吧几乎位于视线范围内时,

[aɪ'ti:] [ə'priəz] [fɔ: 'ɔ:t(ə)nd] [æz; əz][ə; ei] [braɪt] [ænd; ənd] ['defɪnət] ['maɪnə(r)]['æksɪs][ɒv; əv][ðə; ði]
it appears foreshortened as a bright and definite minor axis of the
它 出现 缩短 作为 一个 明亮的 和 定 次要的 轴 的 这
[i:'lɒŋgertɪd] ['nebjʊlə(r)] ['ɪmɪdʒ] .
elongated nebular image .
细长的 星云 图像 .
它看起来像是拉长星云图像中明亮而清晰的短轴, 呈现出透视缩短的效果。

[sʌt] ['kjuəriəs] [fɔ:mz] [æz; əz][ðə; ði]['ɪmɪdʒɪz][ɒv; əv][en] . [dʒi:] . [si:] . - [ænd; ənd] - [ɑ:(r); ə(r)]
Such curious forms as the images of N . G . C . 1023 and 3384 are
这样的 好奇的 表格 作为 这 图片 的 N . G . C . - 和 - 是
[ɪk'spleɪnd] [ɪn] [ðɪs] ['mænə(r)] .
explained in this manner .
解释 在 这 方式 .
NGC 1023 和 3384 等奇特的星系图像就是用这种方法解释的。

[ðə; ði]['leɪtɪst] [gru:p] , [ˌɛs.bi:'si:] , [ɪz] [ˌreprɪ'zentɪd] [bɑ:][ðə; ði][es] - [ˌfeɪpt] ['spaɪrəlz] [sʌt] [æz; əz][en] . [dʒi:]
The latest group , SBc , is represented by the S - shaped spirals such as N . G
这 最新的 团体 , sbc , 是 代表 经过 这 S - 形状 螺旋 这样的 作为 N . G
. [si:] . - . { [eit] }
. C . 7479 . { 8 }
. C . - . { 8 }
最新出现的星系群 SBc 以 S 形旋涡星系为代表, 例如 NGC 7479。 {8}

[ɪ'regjələ(r)] ['nebjʊ.li:]
IRREGULAR NEBULAE
不规律的 星云
不规则星云

[ə'baʊt] [θɪri:][pə(r)][sent] [ɒv; əv][ðə; ði]['ekstrə] - [gə'læktɪk] ['nebjʊ.li:] [læk] [bəʊθ] ['dɑ:mi'nɛɪtɪŋ] ['nju:kliə]
About 3 per cent of the extra - galactic nebulae lack both dominating nuclei
关于 3 每 中心 的 这 额外的 - 银河系 星云 缺少 两个都 占据主导地位 细胞核
[ænd; ənd][rəʊ'teɪʃən(ə)] ['sɪmətri] .
and rotational symmetry .
和 旋转 对称 .
约有 3% 的河外星云既没有主导星核, 也没有旋转对称性。

[ði:z] [fɔ:m] [ə; ei][drɪ'stɪŋkt] [klɑ:s] [wɪt] [kæn; kən][bi:; bi] [tɜ:rmd] “ [ɪ'regjələ(r)] .
These form a distinct class which can be termed “ irregular .
这些 形式 一个 清楚的 班级 哪个 能 是 称为 “ 不规律的 .
这些构成了一个独特的类别, 可以称之为“不规则”。

” [ðə; ði][mæɡə'lənɪk] [klaʊdz] [ɑ:(r); ə(r)][ðə; ði][məʊst] [kən'spɪkjʊəs] [ɪɡ'zæmpl] , [ænd; ənd] , [ɪn'di:d] ,
” **The Magellanic Clouds are the most conspicuous examples , and , indeed ,**
” 这 麦哲伦 云 是 这 最多 显眼的 示例 , 和 , 的确 ,
“麦哲伦星云是最显著的例子, 而且, 的确,

[ɑ:(r); ə(r)][ðə; ði] ['nɪərɪst] [ɒv; əv][ɔ:l][ðə; ði]['ekstrə] - [gə'læktɪk] ['nebʊ.li:] .
are the nearest of all the extra - galactic nebulae .
是 这 最近的 的 全部 这 额外的 - 银河系 星云 .
是距离我们最近的河外星云。

[en] . [dʒi:] . [si:] . - , [ə; eɪ] ['kjʊəriəsli] ['feɪθf(ə)l] ['mɪnɪtʃə(r)] [ɒv; əv][ðə; ði] [klaʊdz] ,
N . G . C . 6822 , a curiously faithful miniature of the Clouds ,
N . G . C . - , 一个 奇怪的是 忠实 微型 的 这 云 ,
NGC 6822, 一个奇特地忠实描绘了云团的微缩模型,

[sɜ:rvz] [tu:; tə] [brɪdʒ] [ðə; ði][gæp] [brɪ'twi:n] [ðem; ðəm][ænd; ənd][ðə; ði][smɔ:lə(r)]['ɒbdʒɪkts] , [sʌtʃ] [æz; əz]
serves to bridge the gap between them and the smaller objects , such as
服务 到 桥 这 差距 之间 他们 和 这 较小的 对象 , 这样的 作为
[en] . [dʒi:] . [si:] . - [ænd; ənd] - .
N . G . C . 4214 and 4449 .
N . G . C . - 和 - .
有助于弥合它们与较小的天体（如 NGC 4214 和 4449）之间的差距。

[ɪn] [ðɪ:z] ['lætə(r)] , [ə; eɪ] [fju:] [ˌɪndɪ'vɪdʒʊəl] [stɑ:z] [ɪ'mɜ:dʒ] [frəm; frəm][æn; ən] [ˌʌnrɪ'zɒlvd] ['bækgraʊnd] ,
In these latter , a few individual stars emerge from an unresolved background ,
在 这些 后者 , 一个 很少 个人 明星 出现 从 一个 未解决 背景 ,
在后一种情况下, 少数几颗恒星从未分辨的背景中凸显出来。

[ænd; ənd][ə'keɪzən(ə)l] ['aɪsəleɪtɪd] [spɒts] [ɡɪv] [ðə; ði] [ɪ'mɪ(ə)n] ['spektrəm] [ˌkærəktə'rɪstɪk] [ɒv; əv] [drɪ'fju:s]
and occasional isolated spots give the emission spectrum characteristic of diffuse
和 偶然 孤立 地点 给 这 排放 光谱 特征 的 扩散
[ˌnebʊ'ləsəti][ɪn][ðə; ði][gə'læktɪk] ['sɪstəm] ,
nebulosity in the galactic system ,
星云 在 这 银河系 系统 ,
偶尔出现的孤立斑点呈现出银河系弥漫星云特有的发射光谱。

[ɪn][ðə; ði] [klaʊdz] , [ænd; ənd][ɪn][en] . [dʒi:] . [si:] . -
in the Clouds , and in N . G . C . 682212
在 这 云 , 和 在 N . G . C . -
在云层中, 以及 NGC 682212 中

[ðɪ:z] ['fi:tʃəz] [ɑ:(r); ə(r)] [faʊnd] [ɪn]['ʌðə(r)][ɪ'regjələ(r)] ['nebʊ.li:] [æz; əz] [wel] , ['nəʊtəbli][ɪn][en] . [dʒi:] . [si:]
These features are found in other irregular nebulae as well , notably in N . G . C
这些 特征 是 成立 在 其他 不规则的 星云 作为 出色地 , 尤其 在 N . G . C
. - [ænd; ənd] - ,
. 1156 and 4656 ,
. - 和 - ,
这些特征在其他不规则星云中也有发现, 尤其是在 NGC 1156 和 4656 中。

[ænd; ənd][ɑ:(r); ə(r)][dʒʌst] [ðəʊz] [tu:; tə][bi:; bi] [ɪk'spektɪd] [ɪn] ['sɪstəmz] ['sɪmələ(r)][tu:; tə][ðə; ði] [klaʊdz]
and are just those to be expected in systems similar to the Clouds
和 是 只是 那些 到 是 预期的 在 系统 相似的 到 这 云
[bʌt; bət]['sɪtʃueɪtɪd][æt; ət] [ɪn'kri:sɪŋli] ['greɪtə(r)] ['dɪstənsɪz] .
but situated at increasingly greater distances .
但 位于 在 日益 更大的 距离 .
这些现象与云团类似, 但距离越来越远, 因此都是意料之中的。

[ðə; ði] ['sɪstəm] ['aʊtlaɪnd] [ə'bʌv] [ɪz][praɪ'merəli][fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði]['fɔ:m(ə)l][ˈklæsɪfɪ'keɪ](ə)n][ɒv; əv]
The system outlined above is primarily for the formal classification of
这 系统 概述 多于 是 主要 为了 这 正式的 分类 的
[ˈfəʊtə'græfɪk] ['ɪmɪdʒɪz] [əb'teɪnd] [wɪð] [lɑ:dʒ] [rɪf'lektəz] [ænd; ənd] ['pɔ:treɪt] ['lensɪz] .
photographic images obtained with large reflectors and portrait lenses .
摄影 图片 获得 和 大的 反射器 和 肖像 镜头 .

上述系统主要用于对使用大型反射器和人像镜头拍摄的照片进行正式分类。

[fɔ:(r); fə(r)] [i:tʃ] ['ɪnstrəmənt] , [haʊ'evə(r)] ,
For each instrument , however ,
为了 每个 乐器 , 然而 ,

然而，对于每种乐器而言，

[ðeə(r)][ɪz][ə; eɪ] ['lɪmɪtɪŋ] [saɪz][ænd; ənd][ˌlu:mrɪ'nɒsəti] [brɪ'ləʊ] [wɪtʃ] [ˌaɪ 'ti:][ɪz][ɪm'pɒsəb(ə)l][tu:; tə]['klæsɪfaɪ]
there is a limiting size and luminosity below which it is impossible to classify
那里 是 一个 限制 尺寸 和 亮度 以下 哪个 它 是 不可能的 到 分类
[wɪð] ['eni] ['kɒnfɪdəns] .
with any confidence .
和 任何 信心 .

存在一个尺寸和亮度的极限值，低于该值就无法进行任何有把握的分类。

[ɪk'sept] [ɪn][reə(r)] ['ɪnstənsɪz] , [ði:z] [smɔ:l] ['nebjʊ.li:] [ɑ:(r); ə(r)]['ekstrə] - [gə'læktɪk] , [ænd; ənd][ðeə(r)]
Except in rare instances , these small nebulae are extra - galactic , and their
除了 在 稀有的 实例 , 这些 小的 星云 是 额外的 - 银河系 , 和 他们的
['nʌmbəz] , ['braɪtnəs] ,
numbers , brightness ,
数字 , 亮度 ,

除了极少数例外情况外，这些小型星云都位于银河系外，它们的数量、亮度、

[dar'men](ə)nɪz] , [ænd; ənd] [ˌdɪstrɪ'bju:ʃn] [ɑ:(r); ə(r)][ə'mi:nəb(ə)l][tu:; tə][stə'tɪstɪk(ə)l][ɪn'vestrɪ'geɪ](ə)n] .
dimensions , and distribution are amenable to statistical investigation .
方面 , 和 分配 是 易于相处 到 统计 调查 .

尺寸和分布适合进行统计研究。

[fɔ:(r); fə(r)] ['kætələɡɪŋ] [p'ɜ:pəsɪz] , [ðeɪ] [rɪ'kwəɪə(r)][ə; eɪ] ['deɪzɪɡneɪtɪŋ] ['sɪmb(ə)l] ,
For cataloguing purposes , they require a designating symbol ,
为了 编目 目的 , 他们 要求 一个 指定 象征 ,

为了便于编目，它们需要一个指定符号。

[ænd; ənd][ðə; ði]['letə(r)] “ [kju:] ” [ɪz] [sə'dʒestɪd] [æz; əz] [kən'vi:niənt] [ænd; ənd][nɒt] [tu:] ['waɪdli] [ju:st] [wɪð]
and the letter “ Q ” is suggested as convenient and not too widely used with
和 这 信 “ 问 ” 是 建议 作为 方便的 和 不是 也 广泛 用过的 和
[ˈʌðə(r)] [,signɪfɪ'keɪʃən] .
other significations .
其他 意义 .

建议使用字母“Q”，因为它方便且没有太多其他含义。

[pleɪt] [ˌɛks,ɑr'vi:]
PLATE XIV
盘子 十四

图版十四

[də'rekt] ['fəʊtəɡrɑ:f] [wɪð] - - [ɪntʃ] [rɪ'flektə(r)] [mɑ:tʃ] - , - .
Direct photograph with 100 - inch reflector March 18 , 1925 .
直接的 照片 和 - - 英寸 反射器 行进 - , - .

1925年3月18日，使用100英寸反射镜进行直接拍摄。

[skeɪl] [wʌn][əm əm] = [θri:] - . [θri:]
Scale 1 mm = 3 ' . 3
规模 1 毫米 = 3 - . 3

比例尺：1毫米 = 3.3英寸

[ˈslɪtləs] [ˈspektrəʊgræm][æ̯t; ə̯t][ˈpraɪməri][ˈfəʊkəs][pʊ; əv] - - [ɪntʃ] [rɪˈflektə(r)] , [mɑːtʃ] - , -
Slitless spectrogram at primary focus of 100 - inch reflector , March 19 , 1925
无缝 光谱图 在 基本的 重点 的 - - 英寸 反射器 , 行进 - , -
1925年3月19日, 100英寸反射望远镜主焦点处的无缝光谱图

[ɪˈregjələ(r)][ˈnebjələ][en] . [dʒiː] . [siː] . -
Irregular Nebula N . G . C . 4214
不规则的 星云 N . G . C . -
不规则星云 NGC 4214

[pɑːt] [ˌaɪ ˈaɪ] .
PART II .
部分 二 .

第二部分。

[stətɪstɪk(ə)l] [ˈstʌdi] [pʊ; əv][ˈekstrə] - [gəˈlæktɪk] [ˈnebjʊ.liː]
STATISTICAL STUDY OF EXTRA - GALACTIC NEBULAE
统计 学习 的 额外的 - 银河系 星云
银河系外星云的统计研究

[ðə; ði][ˈdɜːtə]
THE DATA
这 数据

数据

[ðə; ði][məʊst] [ˌhɒməˈdʒiːniəs] [lɪst][pʊ; əv] [ˈnebjʊ.liː] [fɔː(r); fə(r)][stətɪstɪk(ə)l] [ˈstʌdi] [ɪz] [ðæt] [kəmˈpaɪld] [baɪ]
The most homogeneous list of nebulae for statistical study is that compiled by
这 最多 均质 列表 的 星云 为了 统计 学习 是 那 编译 经过
Hardcastle13 [kənˈteɪnɪŋ] [ɔːl] [ˈnebjʊ.liː] [faʊnd] [pʌn][ðə; ði][ˈfræŋklɪn] - [ˈædəmz] [tʃɑːts] .
Hardcastle13 containing all nebulae found on the Franklin - Adams charts .
Hardcastle13 包含 全部 星云 成立 在 这 富兰克林 - 亚当斯 图表 .

对于统计研究而言, 最同质化的星云列表是由 Hardcastle13 编制的, 其中包含了 Franklin-Adams 星图上发现的所有星云。

[ðiːz] [ɑː(r); ə(r)][ˈjuːnɪfɔːm] [ɪksˈpəʊʒəz] [pʊ; əv] [tuː] [ˈaʊəz] [pʌn][fɑːst] [pleɪts] [meɪd] [wɪð] [ə; eɪ] [kʊk]
These are uniform exposures of two hours on fast plates made with a Cooke
这些 是 制服 暴露 的 二 小时 在 快速地 盘子 制成 和 一个 库克
[ˌæstrəˈgræfɪk] [lenz][pʊ; əv] - - [ɪntʃ] [ˈæpətə(r)][ænd; ænd] - - [ɪntʃ] [ˈfəʊk(ə)l][lenkθ; leŋθ] .
astrographic lens of 10 - inch aperture and 45 - inch focal length .
星象学 镜片 的 - - 英寸 光圈 和 - - 英寸 焦点 长度 .
这些是用库克天文摄影镜头（10英寸口径, 45英寸焦距）在快速底片上进行两小时均匀曝光拍摄的照片。

[ðə; ði] [skeɪl] [ɪz][wʌn][əm əm] = [θriː] ´ .
The scale is 1 mm = 3 ´ .
这 规模 是 1 毫米 = 3 ´ .

比例尺为 1 毫米 = 3 英尺。

[ðə; ði][ɪnˈtaɪə(r)][skaɪ][ɪz] [ˈkʌvəd] , { [naɪn] }
The entire sky is covered , { 9 }
这 全部的 天空 是 涵盖 , { 9 }

整个天空都被覆盖了, {9}

[bʌt; bət] [sɪns] [ðə; ði] [pleɪts] [ɑː(r); ə(r)] [ˈsentəd] [əˈbaʊt] 15° [əˈpɑːt][ænd; ænd][ðə; ði][ˌdeɪfɪˈnɪ(ə)n] [dɪˈkriːsɪz]
but since the plates are centered about 15° apart and the definition decreases
但 自从 这 盘子 是 居中 关于 15° 除 和 这 定义 减少
[ˈveri] [əˈpriːjəbli] [wɪð] [ˈdɪstəns] [frɒm; frəm][ðə; ði][ˈɒptɪk(ə)l][ˈæksɪs] ,
very appreciably with distance from the optical axis ,
非常 明显地 和 距离 从 这 光学的 轴 ,
但由于这些板的中心相距约 15°, 并且清晰度随着与光轴距离的增加而显著降低,

[ðə; ði][mə'tɪəriəl][ɪz][nɒt] ['striktli] [hɒmə'dʒiːniəs] .
the material is not strictly homogeneous .
这 材料 是 不是 严格 均质 .

该材料并非完全均质。

[mɔːr'əʊvə(r)] , [ðə; ði] ['pʌblɪʃt] [lɪst] ['sʌfə] [frɒm; frəm][ðə; ði]['juːʒuəl]['erə(r)z] [ə'tendənt] [ɒn] [ruː'tiːn]
Moreover , the published list suffers from the usual errors attendant on routine
而且 , 这 已发布 列表 遭受 从 这 通常 错误 服务员 在 常规
['kætələdʒɪŋ] ;
cataloguing ;
编目 ;

此外，已发布的清单也存在日常编目中常见的错误；

[fɔː(r); fə(r)] ['ɪnstəns] , [fɔː(r)] [kən'spɪkjʊəs] [m'ɛsɪə] ['nebʊˌliː] , [em] - , [em] - , [em] - , [ænd; ənd][em]
for instance , four conspicuous Messier nebulae , M 60 , M 87 , M 94 , and M
为了 实例 , 四 显眼的 梅西耶 星云 , M - , M - , M - , 和 M
- , [ɑː(r); ə(r)] ['mɪsɪŋ] .
101 , are missing .
- , 是 丢失的 .

例如，四个著名的梅西耶星云，M 60、M 87、M 94 和 M 101，都缺失了。

[ɪn]['dʒen(ə)rəl] , [haʊ'evə(r)] ,
In general , however ,
在 一般的 , 然而 ,

但总的来说，

[ðə; ði][lɪst][ɪz] ['θʌrəli] [reprɪ'zentətɪv] [daʊn] [tuː; tə][ə'baʊt][ðə; ði] [θɜː'tiːnθ] [fəʊtə'græfɪk]
the list is thoroughly representative down to about the thirteenth photographic
这 列表 是 彻底 代表 向下 到 关于 这 第十三 摄影
['mæɡnɪtjuːd][ænd; ənd][ˈveri] [fjuː] [kən'spɪkjʊəs] ['ɒbdʒɪkts][ɑː(r); ə(r)] [əʊvə'loʊkt] .
magnitude and very few conspicuous objects are overlooked .
震级 和 非常 很少 显眼的 对象 是 被忽视的 .

该列表具有充分的代表性，涵盖了大约第十三星等的天体，几乎没有遗漏任何显眼的物体。

[aɪ 'tiː] [pleɪz] [ðə; ði][rəʊl][ɒv; əv][ə; eɪ] ['stændəd] [wɪð] [wɪtʃ] [ˈʌðə(r)] ['kætələɡz] [ɒv; əv][ðə; ði] [braɪtə]
It plays the role of a standard with which other catalogues of the brighter
它 演出 这 角色 的 一个 标准 和 哪个 其他 产品目录 的 这 更亮
['nebʊˌliː] [meɪ] [biː; bi] [kəm'peəd] [fɔː(r); fə(r)] [kəm'pliːtnəs] ,
nebulae may be compared for completeness ,
星云 可能 是 比较的 为了 完整性 ,

它起到了标准的作用，其他较亮星云星表的完整性可以与之进行比较。

[ænd; ənd] ['nʌmbəz] [ɪn] ['lɪmɪtɪd] ['eəriəz] [meɪ] [biː; bi] [ɪk'stendɪd] [tuː; tə][ðə; ði][ɪn'taɪə(r)][skaɪ] .
and numbers in limited areas may be extended to the entire sky .
和 数字 在 有限的 区域 可能 是 扩展 到 这 全部的 天空 .

有限区域内的数量可能会扩展到整个天空。

[wen] [nəʊn] [gə'læktɪk] ['nebʊˌliː] , [ˈklʌstəz] , [ænd; ənd][ðə; ði]['ɒbdʒɪkts][ɪn][ðə; ði][mæɡə'lænɪk] [klaʊdz]
When known galactic nebulae , clusters , and the objects in the Magellanic Clouds
什么时候 已知 银河系 星云 , 集群 , 和 这 对象 在 这 麦哲伦 云
[ɑː(r); ə(r)] ['wiːdɪd] [aʊt] ,
are weeded out ,
是 除草 出去 ,

当排除掉已知的银河系星云、星团和麦哲伦星云中的天体后，

[ðə; ði] [rɪ'meɪnɪŋ] - ['nebʊˌliː] [meɪ] [biː; bi] ['triːtɪd] [æz; əz]['ekstrə] - [gə'læktɪk] .
the remaining 700 nebulae may be treated as extra - galactic .
这 其余的 - 星云 可能 是 治疗 作为 额外的 - 银河系 .

其余 700 个星云可视为银河系外星云。

[ˈveri] [fju:] [kæn; kən][bi:; bi] [ˈklæsɪfaɪd] [frɒm; frəm][ðə; ði][ˈfræŋklɪn] - [ˈædəmz] [pleɪts] ；
Very few can be classified from the Franklin - Adams plates ；
非常 很少 能 是 分类 从 这 富兰克林 - 亚当斯 盘子 ；

从富兰克林-亚当斯图版中可以进行分类的寥寥无几；

[fɔ:(r); fə(r)] [ðɪs] [ˈpɜ:pəs] [ˈfəʊtəgræfs] [pɒn][ə; eɪ] [mʌt] [ˈlɑ:dʒə(r)] [skeɪl] [ɑ:(r); ə(r)][rɪˈkwaɪəd] .
for this purpose photographs on a much larger scale are required .
为了 这 目的 照片 在 一个 很多 更大的 规模 是 必需的 ；

为此，我们需要更大尺寸的照片。

[ʌnˈtɪl] [ˈfɜ:ðə(r)] [ˈdeɪtə][pɒn][ðə; ði][ˌɪndɪˈvɪdʒuəl][ˈɒbdʒɪkts][ɑ:(r); ə(r)][əˈveɪləb(ə)] ,
Until further data on the individual objects are available ,
直到 更远 数据 在 这 个人 对象 是 可用的 ；

在获得关于各个物体的更多数据之前，

- [lɪst][kæn; kən][bi:; bi] [ju:st] [ˈəʊnli][fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði] [ˈstʌdi] [pɒv; əv] [ˌdɪstrɪˈbjʊ:ʃn] [ˈəʊvə(r)][ðə; ði]
Hardcastle's list can be used only for the study of distribution over the
- 列表 能 是 用过的 仅有的 为了 这 学习 的 分配 超过 这

[skaɪ] .

sky .
天空 ；

哈德卡斯尔 的列表只能用于研究天空中的分布情况。

[ðɪs] [ˈəʊz] [ðə; ði] [wel] - [nəʊn] [ˈfi:təz] — [ðə; ði][ˈgreɪtə(r)][ˈdensəti][ɪn][ðə; ði] [ˈnɔ:ðən] [gəˈlæktɪk]
This shows the well - known features — the greater density in the northern galactic
这 演出 这 出色地 - 已知 特征 — 这 更大的 密度 在 这 北方 银河系

[ˈhemɪsfɪə(r)] , [ðə; ði][ˌkɒns(ə)nˈtreɪ(ə)n][ɪn][ˈvɜ:gəʊ] ,
hemisphere , the concentration in Virgo ,
半球 , 这 专注 在 处女座 ,

这显示了众所周知的特征——北半球密度更高，室女座星系团密度更高。

[ænd; ənd][ðə; ði] [rɪˈstrɪk(ə)n] [pɒv; əv][ðə; ði] [ˈveri] [lɑ:dʒ] [ˈnebʊˌli:] [tu:; tə][ðə; ði] [ˈsʌðən] [gəˈlæktɪk]
and the restriction of the very large nebulae to the southern galactic
和 这 限制 的 这 非常 大的 星云 到 这 南部 银河系

[ˈhemɪsfɪə(r)] .
hemisphere .
半球 ；

以及大型星云仅限于银河系南半球的现象。

[ˈfɔ:tʃənətli] ,
Fortunately ,
幸运的是 ；

幸运的是，

[nju:ˈmerɪk(ə)] [ˈdeɪtə][du:; də][ɪgˈzɪst][ɪn][ðə; ði] [fɔ:m] [pɒv; əv][ˈtəʊt(ə)] [ˈvɪʒuəl] [ˈmæɡnɪtju:d] [fɔ:(r); fə(r)] [ˈmeni]
numerical data do exist in the form of total visual magnitudes for many
数值 数据 做 存在 在 这 形式 的 全部的 视觉的 震级 为了 许多

[pɒv; əv][ðə; ði] [ˈnebʊˌli:] [ɪn][ðə; ði] [ˈnɔ:ðən] [skaɪ] .

of the nebulae in the northern sky .
的 这 星云 在 这 北方 天空 ；

北半球天空中的许多星云都有总视星等的数值数据。

[ði:z] [dɪˌtəːmɪˈneɪʃənz] [wɜ:(r); wə(r)] [meɪd] [baɪ] - ,
These determinations were made by Holetschek ,
这些 决定 是 制成 经过 - ,

这些结论是由霍列切克做出的。

- [hu:] [əˈtemptɪd] [tu:; tə] [əbˈzɜ:v] [ɔ:l] [ˈnebʊˌli:] [wɪðɪn] [rɪ:tʃ] [pɒv; əv][hɪz; ɪz][sɪks] - [ɪntʃ] [rɪˈfræktə(r)] .
14 who attempted to observe all nebulae within reach of his 6 - inch refractor .
- WHO 尝试过 到 观察 全部 星云 之内 抵达 的 他的 6 - 英寸 折射器 ；

14 人试图用他的 6 英寸折射望远镜观测所有在其观测范围内的星云。

[hiː; hi][ˈleɪtə(r)] [rɪˈstriktɪd] [hɪz; ɪz][ˈprəʊgræm] ;
He later restricted his program ;
他 之后 受限制的 他的 程序 ;

他后来限制了自己的节目；

[bʌt; bət][ðə; ði][ˈfaɪn(ə)][lɪst][ɪz] [ˈriːz(ə)nəbli] [kəmˈpliːt] [fɔː(r); fə(r)][ðə; ði][mɔː(r)] [kənˈspɪkjʊəs] [ˈnebjʊ.liː]
but the final list is reasonably complete for the more conspicuous nebulae
但 这 最终的 列表 是 合理 完全的 为了 这 更多的 显眼的 星云
[nɔːθ] [pʊ; əv] [ˌdeklɪˈneɪʃən] - 10° ,
north of declination - 10° ,
北 的 下降 - 10° ,

但对于赤纬-10°以北较为显眼的星云而言，最终的列表已经相当完整了。

[ænd; ænd][ɪz] [ˌreprɪˈzentətɪv] [daʊn] [tuː; tə][ˈvɪʒʊəl] [ˈmæɡnɪtjuːd] [əˈbaʊt] - . [faɪv] .
and is representative down to visual magnitude about 12 . 5 .
和 是 代表 向下 到 视觉的 震级 关于 - . 5 .

并且在视觉星等约为 12.5 时仍具有代表性。

[aʊt] [pʊ; əv] - [ˈekstrə] - [gəˈlæktɪk] [ˈnebjʊ.liː] [ɪn] - [lɪst] , - [ɑː(r); ə(r)] [nɔːθ] [pʊ; əv] - 10° ,
Out of 417 extra - galactic nebulae in Holetschek's list , 408 are north of - 10° ,
出去 的 - 额外的 - 银河系 星云 在 - 列表 , - 是 北 的 - 10° ,

在霍列切克列出的 417 个河外星云中，有 408 个位于 -10° 以北。

[æz; əz] [kəmˈpeəd] [wɪð] - [ɪn] - .
as compared with 400 in Hardcastle's .
作为 比较的 和 - 在 - .

相比之下，哈德卡斯尔的《400》一书中有400首。

[ðə; ði] [tuː] [ˈlɪsts] [əˈɡriː] [ˈveri] [wel] [fɔː(r); fə(r)][ðə; ði] [braɪtə] [ˈbɒdʒɪkts] ,
The two lists agree very well for the brighter objects ,
这 二 列表 同意 非常 出色地 为了 这 更亮 对象 ,

对于较亮的天体，这两个列表吻合得非常好。

[bʌt; bət][daɪˈvɜːdʒ][mɔː(r)][ænd; ænd][mɔː(r)] [wɪð] [dɪˈkriːsɪŋ] [ˌluːmɪˈnɒsəti] .
but diverge more and more with decreasing luminosity .
但 分歧 更多的 和 更多的 和 递减 亮度 .

但随着亮度降低，差异越来越大。

[æt; ət][ðə; ði] [twelfθ] [ˈmæɡnɪtjuːd] [əˈbaʊt] [haːf][pʊ; əv] - [ˈnebjʊ.liː] [ɑː(r); ə(r)][ɪnˈkluːdɪd][baɪ
At the twelfth magnitude about half of Holetschek's nebulae are included by
在 这 第十二 震级 关于 一半 的 - 星云 是 包括 经过
[ˈhɑːrd,kæseɪ] .
Hardcastle .
哈德卡斯尔 .

哈德卡斯尔认为，霍列切克星云中大约有一半的星等为 12 等。

[sɪns] [ðə; ði] [tuː] [ˈlɪsts][kəmˈpeə(r)] [ˈfeɪvərəbli] [ɪn] [kəmˈpliːtnəs] [ˈəʊvə(r)][səʊ] [lɑːdʒ] [ə; eɪ][ˈriːdʒən][pʊ; əv]
Since the two lists compare favorably in completeness over so large a region of
自从 这 二 列表 比较 有利 在 完整性 超过 所以 大的 一个 地区 的
[ðə; ði][skaɪ] ,
the sky ,
这 天空 ,

由于这两个列表在如此广阔的天空区域内的完整性方面都相差无几，

- [meɪ] [biː; bi] [ˈtʃəʊzn] [æz; əz][ðə; ði][ˈbeɪsɪs][fɔː(r); fə(r)][ə; eɪ][stəˈtɪstɪk(ə)] [ˈstɒdi] [ænd; ænd]
Holetschek's may be chosen as the basis for a statistical study and
- 可能 是 选定 作为 这 基础 为了 一个 统计 学习 和
[ədˈvɑːntrɪdʒ] [ˈteɪkən][pʊ; əv][ðə; ði][ˈvæljuəb(ə)][ˌnjuːˈmerɪk(ə)][ˈdeɪtə][pʌn][ˈtəʊt(ə)] [ˌluːmɪˈnɒsəti] . { - }
advantage taken of the valuable numerical data on total luminosities . { 10 }
优势 已采取 的 这 有价值的 数值 数据 在 全部的 亮度 . { - }

可以选择Holetschek的公式作为统计研究的基础，并利用其中关于总光度的宝贵数值数据。{10}

Hopmann15 [hæz; həz] [rɪ'vaɪzd] [ðə; ði] [skeɪl] [ɒv; əv] ['mægnɪtju:d] [baɪ] [fəʊtə'metrɪk] ['meɜəz] [ɒv; əv]
Hopmann15 has revised the scale of magnitudes by photometric measures of
Hopmann15 有 修改 这 规模 的 震级 经过 光度学 措施 的
[ðə; ði][kəm'pærɪs(ə)n] [stɑ:z] [ju:st] [baɪ] - .
the comparison stars used by Holetschek .
这 比较 明星 用过的 经过 - .

Hopmann15 通过对 Holetschek 使用的比较星进行光度测量，修订了星等标度。

[nju:] ['mægnɪtju:d] [wɜ:(r); wə(r)] [ðʌs] [əb'teɪnd] [fɔ:(r); fə(r)] - [ɪndɪ'vɪdʒuəl] ['nebʊ.li:] [ænd; ənd][frɒm; frəm]
New magnitudes were thus obtained for 85 individual nebulae and from
新的 震级 是 因此 获得 为了 - 个人 星云 和 从
[ði:z] [wɜ:(r); wə(r)] [dɪ'raɪvd] [mi:n] [kə'rekʃn] ['teɪblz] [ə'plɪkəb(ə)l] [tu:; tə][ðə; ði][ɪn'taɪə(r)][lɪst] .
these were derived mean correction tables applicable to the entire list .
这些 是 衍生的 意思是 更正 表格 适用的 到 这 全部的 列表 .

因此获得了 85 个独立星云的新星等，并由此推导出适用于整个列表的平均校正表。

[ðə; ði] [rɪ'vaɪzd] ['mægnɪtju:d] [ɑ:(r); ə(r)] [ju:st] [θru:'aʊt] [ðə; ði] ['fɒləʊɪŋ] [dɪ'skʌʃ(ə)n] .
The revised magnitudes are used throughout the following discussion .
这 修改 震级 是 用过的 自始至终 这 下列的 讨论 .

以下讨论均采用修正后的量级。

- [kə'rekʃnz] [ɪk'stend][tu:; tə][ə'baʊt] - . - [mæg] . ,
Hopmann's corrections extend to about 12 . 0 mag . ,
- 更正 延长 到 关于 - . - 杂志 . ,

霍普曼修正范围大约为12.0星等。

[ænd; ənd][hæv; həv] [bi:n] [ɪk'stræpələɪtɪd] [ɒn][ðə; ði] [ə'sʌmpʃn] [ðæt] [ðeɪ] [ɑ:(r); ə(r)] ['kɒnstənt] [fɔ:(r); fə(r)]
and have been extrapolated on the assumption that they are constant for
和 有 到过 推断 在 这 假设 那 他们 是 持续的 为了

[ðə; ði]['feɪntə(r)]['mægnɪtju:d] .
the fainter magnitudes .
这 较暗 震级 .

并且假设对于较暗的星等，它们是恒定的，并以此为前提进行推断。

[ðə; ði]['erə(r)z] [ɪn'vɒlvd] [ɑ:(r); ə(r)][ʌnɪm'pɔ:t(ə)nt] [ɪn] [vju:] [ɒv; əv] [sɪ'lektɪv] [ɪ'fekts] [wɪtʃ] [mʌst; məst]
The errors involved are unimportant in view of selective effects which must
这 错误 涉及 是 不重要 在 看法 的 选择性 效果 哪个 必须
[bi:; bi]['prez(ə)nt] [ə'mʌŋ] [ðə; ði] [əb'zɜ:vd] ['ɒbdʒɪkts][nɪə(r)][ðə; ði]['lɪmɪt][ɒv; əv][vɪzə'bɪləti] .
be present among the observed objects near the limit of visibility .
是 展示 之中 这 观察到 对象 靠近 这 限制 的 能见度 .

考虑到在可见度极限附近观测到的物体必然存在选择性效应，所涉及的误差并不重要。

[ðə; ði] ['nebʊ.li:] [wɜ:(r); wə(r)] ['klæsɪfaɪd] [ænd; ənd][ðeə(r)][daɪ'æmɪtəz] ['meɜəd] [frɒm; frəm] ['fəʊtəgræfs]
The nebulae were classified and their diameters measured from photographs
这 星云 是 分类 和 他们的 直径 测量 从 照片
[ɒv; əv][ə'baʊt] - [ɒv; əv][ðem; ðəm]['teɪkən] [wɪð] [ðə; ði] - - [ɪntʃ] [ænd; ənd] - - [ɪntʃ] [rɪf'lektəz] [æt; ət]
of about 300 of them taken with the 60 - inch and 100 - inch reflectors at
的 关于 - 的 他们 已采取 和 这 - - 英寸 和 - - 英寸 反射器 在
[maʊnt] ['wɪlsn] .
Mount Wilson .
山 威尔逊 .

研究人员利用威尔逊山天文台的 60 英寸和 100 英寸反射望远镜拍摄了约 300 张星云照片，并根据这些照片对星云进行了分类，测量了它们的直径。

[məʊst][ɒv; əv][ðə; ði]['ʌðə(r)z][ɑ:(r); ə(r)][ɪn'klu:dɪd] [ɪn][ðə; ði] [greɪt] [kə'lekʃ(ə)n] [ɒv; əv]['nebʊlə(r)]
Most of the others are included in the great collection of nebular
最多的 的 这 其他的 是 包括 在 这 伟大的 收藏 的 星云
['fəʊtəgræfs] [æt; ət] [maʊnt] ['hæmɪltən] ,
photographs at Mount Hamilton ,
照片 在 山 汉密尔顿 ,

其余大部分都收藏在汉密尔顿山天文台的大型星云照片集中。

[wɪtʃ] [hæv; həv] [bi:n] [dɪ'skraɪbd] [baɪ] ['kɜ:tɪs] ； - [ænd; ənd] ,
which have been described by Curtis ; 16 and ,
哪个 有 到过 描述 经过 柯蒂斯 ； - 和 ；

柯蒂斯曾描述过这些；16 和，

[θru:] [ðə; ði] ['kɜ:təsi] [ɒv; əv][ðə; ði][də'rektə(r); daɪ'rektə(r)][ɒv; əv][ðə; ði] [lɪk] [əb'zɜ:vətɹi] ,
through the courtesy of the Director of the Lick Observatory ,
通过 这 礼貌 的 这 导演 的 这 舔 天文台 ；

承蒙利克天文台台长惠允，

[aɪ'ti:][hæz; həz] [bi:n] ['pɒsəb(ə)l][tu:; tə][kən'fɜ:m][ðə; ði][klæsɪfɪ'keɪ(ə)n] [ɪn'fɜ:d] [frɒm; frəm][ðə; ði]
it has been possible to confirm the classification inferred from the
它 有 到过 可能的 到 确认 这 分类 推断 从 这
[ˈpʌblɪʃt] [dɪ'skrɪpʃn] [baɪ]['æktʃuəl][ɪn'spekʃ(ə)n][ɒv; əv][ðə; ði][ə'ɹɪdʒən(ə)l] ['negətɪvz] .
published description by actual inspection of the original negatives .
已发布 描述 经过 实际的 检查 的 这 原来的 负面 ；

通过对原始底片的实际检查，可以确认根据已发表的描述推断出的分类。

[taɪps] , [da'ɪæmɪtəz] ,
Types , diameters ,
类型 ； 直径 ；

类型、直径、

[ænd; ənd][ˈtəʊt(ə)l][ˈvɪʒuəl] ['mægnɪtju:d] [ɑ:(r); ə(r)] [ðʌs] [ə'veɪləb(ə)l][fɔ:(r); fə(r)][sʌm; səm] - [ɒv; əv][ðə; ði]
and total visual magnitudes are thus available for some 400 of the
和 全部的 视觉的 震级 是 因此 可用的 为了 一些 - 的 这
[ˈnebjʊ,li:] [ɪn] - [lɪst] .
nebulae in Holetschek's list .
星云 在 - 列表 ；

因此，霍列切克列表中约有 400 个星云的总视星等是可用的。

[ðə; ði] [fju:] [ʌn'klæsɪfaɪd] [ˈɒbdʒɪkts][ɑ:(r); ə(r)][ɔ:l][ˈfeɪntə(r)][ðæən; ðən] - . [faɪv][mæg] .
The few unclassified objects are all fainter than 12 . 5 mag .
这 很少 未分类 对象 是 全部 较暗 比 - . 5 杂志 ；

少数未分类的天体亮度均低于 12.5 等。

[ðə; ði][ˈdeɪtə][ɑ:(r); ə(r)] ['lɪstɪd] [ɪn] [ˈteɪblz] [aɪ] - [aɪ 'vi:] , [ɪn] [wɪtʃ] [ðə; ði][en] . [dʒɪ:] . [si:] . ['nʌmbəz] , [ðə; ði]
The data are listed in Tables I - IV , in which the N . G . C . numbers , the
这 数据 是 列出 在 表格 我 - 第四 ， 在 哪个 这 N . G . C . 数字 ； 这
[ˈtəʊt(ə)l]['mægnɪtju:d] ,
total magnitudes ,
全部的 震级 ；

数据列于表 I 至表 IV 中，其中包括 NGC 编号、总星等、

[ænd; ənd][ðə; ði] ['lɒɡərɪθmz] [ɒv; əv][ðə; ði]['mæksɪməm][da'ɪæmɪtəz][ɪn] ['mɪnɪts] [ɒv; əv][ɑ:k][ɑ:(r); ə(r)]
and the logarithms of the maximum diameters in minutes of arc are
和 这 对数 的 这 最大限度 直径 在 分钟 的 弧 是
[ˈɡɪv(ə)n][fɔ:(r); fə(r)] [i:tʃ] [taɪp] ['seprətli] .
given for each type separately .
给定 为了 每个 类型 分别地 ；

并分别给出了每种类型最大直径（以弧分表示）的对数。

[ə; eɪ] ['sʌməri] [ɪz][ˈɡɪv(ə)n][ɪn][ˈteɪb(ə)l][vi:] ,
A summary is given in Table V ,
一个 概括 是 给定 在 桌子 V ；

表五给出了总结结果，

[ɪn] [wɪtʃ] [ðə; ði] ['relatɪv] ['frikwənsɪz] [ænd; ənd][ðə; ði] [mi:n] ['mægnɪtju:d][ɒv; əv][ðə; ði] ['veəriəs] [taɪps]
in which the relative frequencies and the mean magnitudes of the various types
在 哪个 这 相对的 频率 和 这 意思是 震级 的 这 各种各样的 类型
[wɪl] [bi:; bi] [faʊnd] .
will be found .
将要 是 成立 .

其中将找出各种类型的相对频率和平均幅度。

['relatɪv] [lu:mi'nɒsəti] [ɒv; əv][ðə; ði] ['veəriəs] [taɪps]
RELATIVE LUMINOSITIES OF THE VARIOUS TYPES
相对的 亮度 的 这 各种各样的 类型

各种类型的相对亮度

[ðə; ði] ['fri:kwənsi] [dɪstrɪ'bju:ʃn] [ɒv; əv]['mægnɪtju:d][fɔ:(r); fə(r)][ɔ:l] [taɪps] [tə'geðə(r)][ænd; ənd][fɔ:(r); fə(r)]
The frequency distribution of magnitudes for all types together and for
这 频率 分配 的 震级 为了 全部 类型 一起 和 为了
[ðə; ði][ɪ'lɪptɪk(ə)] ['nebʊ,li:] [ænd; ənd][ðə; ði]['spairəlz] ['seprətli] [ɪz] [əʊn] [ɪn]['teɪb(ə)]['sɪksθ][ænd; ənd]
the elliptical nebulae and the spirals separately is shown in Table VI and
这 椭圆形 星云 和 这 螺旋 分别地 是 所示 在 桌子 六年级 和
['fɪgə(r)] [wʌn] .
Figure 1 .
数字 1 .

表 VI 和图 1 分别显示了所有类型星云的星等频率分布以及椭圆星云和旋涡星云的星等频率分布。

[wɪð] [ðə; ði] [ɪk'sepʃ(ə)n] [ɒv; əv][ðə; ði] [tu:] [aʊt'stændɪŋ] ['spairəlz] , [em] - [ænd; ənd][em] - ,
With the exception of the two outstanding spirals , M 31 and M 33 ,
和 这 例外 的 这 二 杰出的 螺旋 , M - 和 M - ,

除了两个杰出的螺旋星系 M 31 和 M 33 之外，

[ðə; ði] [ə'pærənt] [lu:mi'nɒsəti] [ɑ:(r); ə(r)][ə'baʊt] ['ju:nɪfɔ:mlɪ] [dɪ'strɪbjʊ:tɪd; 'dɪstrɪbjʊ:tɪd] [ə'mʌŋ] [ðə; ði]
the apparent luminosities are about uniformly distributed among the
这 明显 亮度 是 关于 均匀地 分布式 之中 这
['dɪfrənt] [taɪps] .
different types .
不同的 类型 .

不同类型恒星的视亮度分布大致均匀。

[ðə; ði] ['relatɪv] ['nʌmbəz] [ɒv; əv][ðə; ði][ɪ'lɪptɪk(ə)] ['nebʊ,li:] [æz; əz] [kəm'peəd] [wɪð] [ðə; ði]['spairəlz]
The relative numbers of the elliptical nebulae as compared with the spirals
这 相对的 数字 的 这 椭圆形 星云 作为 比较的 和 这 螺旋
[dɪ'kri:s] ['sʌmwɒt] [wɪð] [dɪ'kri:sɪŋ] [lu:mi'nɒsəti] ,
decrease somewhat with decreasing luminosity ,
减少 有些 和 递减 亮度 ,
随着亮度降低，椭圆星云相对于旋涡星云的数量也略有减少。

[bʌt; bət] [ðɪs] [ɪz] ['veri] ['prɒbəbli] [æn; ən] [ɪ'fekt] { - }
but this is very probably an effect { 11 }
但 这 是 非常 大概 一个 影响 { - }

但这很可能是一种效应{11}

[ɒv; əv] [sɪ'lekʃ(ə)n] .
of selection .
的 选择 .

甄选。

[ðə; ði][ɪ'lɪptɪk(ə)] ['nebʊ,li:] [ɑ:(r); ə(r)][mɔ:(r)][kəm'pækt][ðæn; ðən][ðə; ði]['spairəlz][ænd; ənd] [bɪ'klʌm] [mɔ:(r)]
The elliptical nebulae are more compact than the spirals and become more
这 椭圆形 星云 是 更多的 袖珍的 比 这 螺旋 和 变得 更多的
['stelə(r)] [wɪð] [dɪ'kri:sɪŋ] [lu:mi'nɒsəti] .
stellar with decreasing luminosity .
恒星 和 递减 亮度 .

椭圆星云比旋涡星云更紧凑，并且随着亮度降低，恒星密度会越来越高。

$$\begin{array}{l}
 E0 \text{ (-) - - . [w\lambda n] +0 . - - . [s\text{r}ks] - . - - . [n\text{a}in] . - - . [eit] - . - * \\
 \underline{E0 \text{ (17) 404 11 . 1 +0 . 11474 12 . 6 - . 401407 10 . 9 . 153348 11 . 8 - . 153379 *}} \\
 \underline{E0 \text{ (-) - - . 1 +0 . - - . 6 - . - - . 9 . - - . 8 - . - *}} \\
 [n\text{a}in] . [f\text{ɔ}:r] + . - - . [t\text{u}:'t\text{u}:] - . - * [n\text{a}in] . ['s\v{e}v\text{ə}n] + . - * - . [w\lambda n] - . - * \\
 \underline{9 . 4 + . 304283 12 . 2 - . 524486 * 9 . 7 + . 304494 * 10 . 1 - . 154552 *}} \\
 \underline{9 . 4 + . - - . 2 - . - * 9 . 7 + . - * - . 1 - . - *}} \\
 [n\text{a}in] . [n\text{a}in] + . - - . [f\text{ɔ}:r] - . - - . [\text{θ}ri:] . - - . [eit] . - - . [\text{θ}ri:] . - \\
 \underline{9 . 9 + . 234589 11 . 4 - . 304648 12 . 3 . 525044 11 . 8 . 305216 13 . 3 . 705273}} \\
 \underline{9 . 9 + . - - . 4 - . - - . 3 . - - . 8 . - - . 3 . -}} \\
 - . [w\lambda n] . - - . [\text{θ}ri:] . - - - - . - - . [n\text{a}in] - . - \\
 \underline{12 . 1 . 525557 12 . 3 . 405812 12 . 0 - . 405846 10 . 9 0 . 0}} \\
 \underline{- . 1 . - - . 3 . - - . - - . - . 9 - . -}}
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 &E0(17)404\ 11.1+0.11474\ 12.6-.401407\ 10.9.153348\ 11.8-.153379*9.4+.304283\ 12.2-.524486*9.7+ \\
 &.304494*10.1-.154552*9.9+.234589\ 11.4-.304648\ 12.3.525044\ 11.8.305216\ 13.3.705273\ 12.1.525557\ 12.1 \\
 &.405812\ 12.0-.405846\ 10.9\ 0.0
 \end{aligned}$$

[mi:n] - . - - - . -
Mean 11 . 40 - 0 . 204
意思是 - . - - - . -

平均值 11.40 -0.204

E1 (-) - - . - - - . - - . [eit] . - - . [wʌn] . - - . - . - . - . - .
E1 (13) 467 13 . 0 - 0 . 70596 11 . 8 . 221400 11 . 1 . 222880 12 . 0 . 523226 12 . 0 .
E1 (-) - - . - - - . - - . 8 . - - . 1 . - - . - . - . - . - .
- - . [eit] - - . * - . [eit] . - * [nain] . [nain] + . - [eit] . [eit] + . - - .
103962 11 . 8 - . 304278 * 10 . 8 . 04374 * 9 . 9 + . 084472 8 . 8 + . 304478 11 .
- - . 8 - . * - . 8 . - * 9 . 9 + . - 8 . 8 + . - - .
[faɪv] - . - - . [nain] + . - - . [sɪks] - . - - . [θri:] - - . -
5 - . 104636 10 . 9 + . 085813 12 . 6 - . 307626 12 . 3 - 0 . 30
5 - . - - . 9 + . - - . 6 - . - - . 3 - - . -

E1 (13)467 13.0 -0.70596 11.8 .221400 11.1 .222880 12.0 .523226 12.0 .103962 11.8 - .304278* 10.8 .04374* 9.9 +
.084472 8.8 + .304478 11.5 - .104636 10.9 + .085813 12.6 - .307626 12.3 -0.30

[mi:n] - . - - - . -
Mean 11 . 43 - 0 . 177
意思是 - . - - - . -

平均值 11.43 -0.177

E2 (-) - * [eit] . [eit] +0 . - - . [nain] - . - - . [eit] - . - - . [wʌn] - . -
E2 (14) 221 * 8 . 8 +0 . 421453 11 . 9 - . 102672 12 . 8 - . 403193 12 . 1 0 . 03599
E2 (-) - * 8 . 8 +0 . - - . 9 - . - - . 8 - . - - . 1 - . -
- - - - . - - . [sɪks] . - - . [wʌn] - . - - . [wʌn] + . - - . [θri:] - .
12 . 0 - 0 . 303608 11 . 6 . 223640 11 . 1 - . 054261 11 . 1 + . 204291 12 . 3 - .
- - - - . - - . 6 . - - . 1 - . - - . 1 + . - - . 3 - .
- - . [nain] - . - * - - + . - - . [eit] - . - * [nain] . [faɪv] + . - - .
524377 11 . 9 - . 054406 * 10 . 0 + . 304476 12 . 8 - . 304649 * 9 . 5 + . 305127 13 .
- - . 9 - . * - - + . - - . 8 - . - * 9 . 5 + . - - .
[θri:] - - . -
3 - 0 . 52
3 - - . -

E2 (14)221* 8.8 +0.421453 11.9 - .102672 12.8 - .403193 12.1 0.03599 12.0 -0.303608 11.6 .223640 11.1 - .054261
11.1 + .204291 12.3 - .524377 11.9 - .054406* 10.0 + .304476 12.8 - .304649* 9.5 + .305127 13.3 -0.52

[mi:n] - . - - - . -
Mean 11 . 52 - 0 . 088
意思是 - . - - - . -

平均值 11.52 -0.088

E3 (-) - - . [eit] - - . - - . ['sevən] + . - - . [θri:] - . - - . [eit] - .
E3 (10) 1052 11 . 8 - 0 . 151600 12 . 7 + . 173222 13 . 3 - . 154319 12 . 8 - .
E3 (-) - - . 8 - - . - - . 7 + . - - . 3 - . - - . 8 - .
- - . [fɔ:r] + . - - . [θri:] - . - * [nain] . [sɪks] + . - - . [fɔ:r] . - - . [eit]
524365 11 . 4 + . 044386 12 . 3 - . 525322 * 9 . 6 + . 155982 11 . 4 . 07562 12 . 8
- - . 4 + . - - . 3 - . - * 9 . 6 + . - - . 4 . - - . 8
- - . - . [eit] - . -
- . 227619 11 . 8 - . 15
- - . 8 - . -

E3 (10)1052 11.8 -0.151600 12.7 + .173222 13.3 - .154319 12.8 - .524365 11.4 + .044386 12.3 - .525322* 9.6 +
.155982 11.4 .07562 12.8 - .227619 11.8 - .15

[mi:n] - . - - - . -
Mean 11 . 99 - 0 . 133
意思是 - . - - - . -

平均值 11.99 -0.133

E4 (-) - - . [naɪn] +0 . - - . [faɪv] - . - - . [eɪt] . - - . [faɪv] - . - - .
E4 (13) 584 10 . 9 +0 . 301700 12 . 5 - . 102974 11 . 8 . 153605 12 . 5 - . 523610 11
E4 (-) - - . 9 +0 . - - . 5 - . - - . 8 . - - . 5 - . - - .
. [eɪt] + . - - . [eɪt] - . - * - . [θri:] + . - - . [wʌn] - . - * - . - + .
. 8 + . 153894 12 . 8 - . 054125 * 10 . 3 + . 304378 12 . 1 - . 154382 * 10 . 0 + .
. 8 + . - - . 8 - . - - . * - . 3 + . - - . 1 - . - - . * - . - + .
- - . [eɪt] + . - - . [θri:] . - - . [θri:] - . - - . [θri:] - . -
484551 12 . 8 + . 044742 12 . 3 . 05576 12 . 3 - . 157454 13 . 3 0 . 0
- - . 8 + . - - . 3 . - - . 3 - . - - . 3 - . - - .

E4 (13)584 10.9 +0.301700 12.5 - .102974 11.8 .153605 12.5 - .523610 11.8 + .153894 12.8 - .054125* 10.3 +
.304378 12.1 - .154382* 10.0 + .484551 12.8 + .044742 12.3 .05576 12.3 - .157454 13.3 0.0

[mi:n] - . - - - . -
Mean 11 . 95 - 0 . 011
意思是 - . - - - . -

平均值 11.95 -0.011

E5 ([saɪks]) { - } - - . [naɪn] + . - - . [θri:] - . - - . [naɪn] + . - - . [θri:] .
E5 (6) { 12 } 720 10 . 9 + . 112693 12 . 3 - . 153377 10 . 9 + . 174473 10 . 3 .
E5 (6) { - } - - . 9 + . - - . 3 - . - - . 9 + . - - . 3 .
- * - . - + . - - . [fɔ:r] - . -
114621 * 10 . 0 + . 304660 11 . 4 0 . 0
- * - . - + . - - . 4 - . -

E5 (6){12}720 10.9 + .112693 12.3 - .153377 10.9 + .174473 10.3 .114621* 10.0 + .304660 11.4 0.0

[mi:n] - . - +0 . -
Mean 10 . 97 +0 . 090
意思是 - . - +0 . -

平均值 10.97 +0.090

E6 (['seɪvən]) - - . [eɪt] - . - - . ['seɪvən] + . - - . [eɪt] . - - . [eɪt] . - * -
E6 (7) 821 11 . 8 0 . 02768 10 . 7 + . 183613 11 . 8 . 254179 11 . 8 . 344435 * 10
E6 (7) - - . 8 - . - - . 7 + . - - . 8 . - - . 8 . - - . * -
. [faɪv] . - * - . [θri:] . - * [naɪn] . [saɪks] +0 . -
. 5 . 114546 * 10 . 3 . 184697 * 9 . 6 +0 . 48
. 5 . - - . * - . 3 . - - . * 9 . 6 +0 . -

E6 (7)821 11.8 0.02768 10.7 + .183613 11.8 .254179 11.8 .344435* 10.5 .114546* 10.3 .184697* 9.6 +0.48

[mi:n] - . - +0 . -
Mean 10 . 93 +0 . 220
意思是 - . - +0 . -

平均值 10.93 +0.220

E7 ([faɪv]) - * [naɪn] . [faɪv] +0 . - - . [wʌn] . - - . [wʌn] . - - . [wʌn] . -
E7 (5) 3115 * 9 . 5 +0 . 604111 10 . 1 . 544270 12 . 1 . 04570 11 . 1 . 385308
E7 (5) - * 9 . 5 +0 . - - . 1 . - - . 1 . - - . 1 . - - . 1 . -
- . [θri:] +0 . -
12 . 3 +0 . 28
- . 3 +0 . -

E7 (5)3115* 9.5 +0.604111 10.1 .544270 12.1 .04570 11.1 .385308 12.3 +0.28

[mi:n] - . - +0 . -
Mean 11 . 02 +0 . 360
意思是 - . - +0 . -

平均值 11.02 +0.360

[pɜːkjuːliə(r)] ([eit]) - - . [θriː] +0 . - * [naɪn] . [θriː] . - † - . [naɪn] . - † [naɪn] . [naɪn]
Peculiar (8) 185 12 . 3 +0 . 48205 * 9 . 3 . 90524 † 11 . 9 . 413607 † 9 . 9
奇特 (8) - - . 3 +0 . - * 9 . 3 . - † - . 9 . - † 9 . 9
 . - † - . [wʌn] + . - ‡ - . [θriː] - . - ‡ - . [θriː] . - - . [θriː] - - . -
 . **113998 † 12 . 1 + . 234459 ‡ 11 . 3 - . 225485 ‡ 12 . 3 . 055739 13 . 3 - 0 . 40**
 . - † - . 1 + . - ‡ - . 3 - . - ‡ - . 3 . - - . 3 - - . -
奇特 (8)185 12.3 +0.48205* 9.3 .90524† 11.9 .413607† 9.9 .113998† 12.1 + .234459‡ 11.3 – .225485‡ 12.3 .055739
13.3 –0.40

[ðə; ði] ['veəriəs] [taɪps] [ɑː(r); ə(r)] [ˌhɒmə'dʒɪnɪrslɪ] [dɪ'strɪbjʊːtɪd; 'dɪstrɪbjʊːtɪd][ˈəʊvə(r)][ðə; ði][skaɪ] , [ðeə(r)]
The various types are homogeneously distributed over the sky , their
这 各种各样的 类型 是 均匀地 分布式 超过 这 天空 , 他们的
[ˈspektrə][ɑː(r); ə(r)][ˈsɪmələ(r)] ,
spectra are similar ,
光谱 是 相似的 ,
各种类型的天体均匀分布在天空中, 它们的光谱相似。

[ænd; ənd][ðə; ði]['reɪdiəl] [vəˈlɑːsətɪz] [ɑː(r); ə(r)][ɒv; əv][ðə; ði] [seɪm] ['dʒen(ə)rəl][ˈɔːdə(r)] .
and the radial velocities are of the same general order .
和 这 径向 速度 是 的 这 相同的 一般的 命令 .
径向速度也大致处于同一数量级。

[ðiːz] [fæktɪs] , [təˈgeðə(r)] [wɪð] [ðə; ði] [iˈkwələtɪ] [ɒv; əv][ðə; ði] [miːn] ['mæɡnɪtjuːd] [ænd; ənd][ðə; ði]
These facts , together with the equality of the mean magnitudes and the
这些 事实 , 一起 和 这 平等 的 这 意思是 震级 和 这
[ˈjuːnɪfɔːm] [ˈfriːkwənsi] [dɪstrɪˈbjuːʃn] [ɒv; əv] ['mæɡnɪtjuːd] ,
uniform frequency distribution of magnitudes ,
制服 频率 分配 的 震级 ,
这些事实, 加上平均震级相等以及震级频率分布均匀,

[ɑː(r); ə(r)] [kən'sɪstənt] [wɪð] [ðə; ði] [haɪˈpɒθəsis] [ðæt] [ðə; ði] ['dɪstənsɪz] [ænd; ənd] ['æbsəluːt] [ˌluːmɪˈnɒsəti]
are consistent with the hypothesis that the distances and absolute luminosities
是 持续的 和 这 假设 那 这 距离 和 绝对 亮度
[æz; əz] [wel] [ɑː(r); ə(r)][ɒv; əv][ðə; ði] [seɪm] [ˈɔːdə(r)][fɔː(r); fə(r)][ðə; ði] ['dɪfrənt] [taɪps] .
as well are of the same order for the different types .
作为 出色地 是 的 这 相同的 命令 为了 这 不同的 类型 .
这与不同类型恒星的距离和绝对光度都属于同一数量级的假设相符。

[ðɪs] [ɪz][æn; ən] [əˈsʌmpʃn] [ɒv; əv][kən'sɪdərəb(ə)l] [ɪmˈpɔːt(ə)ns] ,
This is an assumption of considerable importance ,
这 是 一个 假设 的 大量 重要性 ,
这是一个非常重要的假设。

[bʌt; bət] [ʌnˈfɔːtʃənətli] [aɪˈtiː] ['kænɒt] [jet] [biː; bi][səbˈdʒektɪd][tuː; tə] ['pɒzətɪv] [ænd; ənd] ['defɪnət] [tests] .
but unfortunately it cannot yet be subjected to positive and definite tests .
但 很遗憾 它 不能 然而 是 受 到 积极的 和 定 测试 .
但遗憾的是, 目前还无法对其进行肯定性测试。

[nʌn] [ɒv; əv][ðə; ði][ɪndɪˈvɪdʒuəl][sɪməˈlærətɪz] [ˌnesəˈserəli] [ɪmˈplaɪz][ðə; ði] [əˈdɒptɪd] [ɪnˌtɜːprəˈteɪ(ə)n] ,
None of the individual similarities necessarily implies the adopted interpretation ,
没有任何 的 这 个人 相似之处 一定 暗示 这 已采用 解释 ,
[bʌt; bət][ðə; ði][təʊˈtæləti][ɒv; əv][ðem; ðəm] ,
but the totality of them ,
但 这 总和 的 他们 ,
个别相似之处本身并不一定意味着所采纳的解释, 但它们的整体起来,

[təˈgeðə(r)] [wɪð] [ðə; ði] ['ɪntɪmət] ['sɪəriːz][rɪˈleɪ(ə)nz] { - }
together with the intimate series relations { 13 }
一起 和 这 亲密的 系列 关系 { - }
以及亲密系列关系{13}

[ə'mʌŋ] [ðə; ði] [taɪps] , [wɪtʃ] [wɪl] [biː; bi] [dɪ'skʌst] ['leɪtə(r)] , [sə'dʒests] [,aɪ 'tiː][æz; əz][ðə; ði][məʊst]
among the types , which will be discussed later , suggests it as the most
之中 这 类型 , 哪个 将要 是 讨论 之后 , 建议 它 作为 这 最多
['riːznəbl] ['wɜːkɪŋ] [haɪ'pɒθəsis] ,
reasonable working hypothesis ,
合理的 在职的 假设 ,

在稍后将讨论的各种类型中, 这被认为是最为合理的假设。

[æt; ət] [liːst] [ʌn'tɪl] [,ɪnkən'sistənsɪz] [ʃʊd; ʃəd] [ə'piə(r)] .
at least until inconsistencies should appear .
在 至少 直到 不一致之处 应该 出现 .

至少在出现矛盾之处之前是这样。

[ˈteɪb(ə)l][,aɪ 'aɪ]
TABLE II
桌子 二

表二

[bɑːd] ['spɑɪrəlz]
Barred Spirals
禁止 螺旋

棒旋螺旋

[en] : [dʒiː] . [siː] . [,ɛm'tiː][lɒɡ][diː]
N . G . C . mT log d
N . G . C . 公吨 日志 d

NGC mT log d

[,ɛs,biː'eɪ] (-) - - . [wʌn] +0 . - * - . [tuː'tuː] . - - . [θriː] . - - . [θriː] .
SBa (26) 936 11 . 1 +0 . 481023 * 10 . 2 . 782732 12 . 3 . 112781 12 . 3 .
小企业管理局 (-) - - . 1 +0 . - * - . 2 . - - . 3 . - - . 3 .
- - . [fɔːr] . - - . [wʌn] . - - . [sɪks] . - * - . ['seɪvən] . - * - .
112787 11 . 4 . 362859 11 . 1 . 282950 11 . 6 . 153384 * 10 . 7 . 483412 * 11 .
- - . 4 . - - . 1 . - - . 6 . - - * - . 7 . - - * - .
[tuː'tuː] + . - - . [wʌn] . - - . [eit] - . - - . [faɪv] + . - - . [wʌn] . - -
2 + . 403418 13 . 1 . 03458 12 . 8 - . 223945 11 . 5 + . 204026 11 . 1 . 484203 11
2 + . - - . 1 . - - . 8 - . - - . 5 + . - - - . 1 . - - -
. [wʌn] . - - - . - - - . [eit] . - - . [naɪn] . - - . [naɪn] .
- **1 . 364346 12 . 0 . 204371 12 . 0 . 184421 12 . 8 . 174442 10 . 9 . 504477 10 . 9 .**
- 1 . - - - . - - - . - - . 8 . - - - . 9 . - - - . 9 .
- - - . - - . [wʌn] . - - . [naɪn] . - - - + . - - - . -
404596 12 . 0 . 254643 11 . 1 . 264754 10 . 9 . 485473 12 . 0 + . 085574 13 . 0 - . 055689
- - . - . 1 . - - - . 9 . - - - . - + . - - - . -
- . - + . - - . [θriː] +0 . -
12 . 0 + . 305701 12 . 3 +0 . 17
- - - + . - - . 3 +0 . -

SBa (26)936 11.1 +0.481023* 10.2 .782732 12.3 .112781 12.3 .112787 11.4 .362859 11.1 .282950 11.6 .153384*
10.7 .483412* 11.2 + .403418 13.1 .03458 12.8 – .223945 11.5 + .204026 11.1 .484203 11.1 .364346 12.0 .204371
12.0 .184421 12.8 .174442 10.9 .504477 10.9 .404596 12.0 .254643 11.1 .264754 10.9 .485473 12.0 + .085574 13.0 –
.055689 12.0 + .305701 12.3 +0.17

[miːn] - . - +0 . -
Mean 11 . 66 +0 . 267
意思是 - . - +0 . -

平均值 11.66 +0.267

[ɛs,bi:'bi:] (-) - . [eit] +0 . - . [eit] . - * - . [fɔ:r] + . - - . [faɪv] - .
SBb (16) 1022 11 . 8 +0 . 042650 12 . 8 . 03351 * 11 . 4 + . 483400 12 . 5 - .
sbb (-) - - . 8 +0 . - - . 8 . - - * - . 4 + . - - . 5 - .
- - . [faɪv] + . - - . [fɔ:r] . - - . [eit] +0 . - - . - +0 . - - . [wʌn] .
103414 11 . 5 + . 263504 11 . 4 . 303718 11 . 8 +0 . 484102 12 . 0 +0 . 364245 11 . 1 .
- - . 5 + . - - . 4 . - - . 8 +0 . - - . - +0 . - - . 1 .
- - . [faɪv] . - - . [wʌn] . - * - . - . - * [naɪn] . [tu:'tu:] . - - . [eit] .
154394 11 . 5 . 604548 11 . 1 . 604699 * 10 . 0 . 574725 * 9 . 2 . 705218 12 . 8 .
- - . 5 . - - . 1 . - - * - . - . - * 9 . 2 . - - . 8 .
- - . [wʌn] . - - . [eit] +0 . -
255566 11 . 1 . 207723 11 . 8 +0 . 18
- - . 1 . - - . 8 +0 . -
SBb (16)1022 11.8 +0.042650 12.8 .03351* 11.4 + .483400 12.5 – .103414 11.5 + .263504 11.4 .303718 11.8 +0.484102 12.0 +0.364245 11.1 .154394 11.5 .604548 11.1 .604699* 10.0 .574725* 9.2 .705218 12.8 .255566 11.1 .207723 11.8 +0.18

[mi:n] - . - +0 . -
Mean 11 . 48 +0 . 317
意思是 - . - +0 . -

平均值 11.48 +0.317

[ɛs,bi:'si:] (-) - - . [sɪks] +0 . - - . [wʌn] . - - . [θri:] . - - . [fɔ:r] . - -
SBc (15) 613 10 . 6 +0 . 60779 12 . 1 . 483206 13 . 3 . 453344 11 . 4 . 603346 12
sbc (-) - - . 6 +0 . - - . 1 . - - . 3 . - - . 4 . - - .
. [θri:] . - - . [θri:] . - - . - . [eit] . - - . [wʌn] . - - . [faɪv] .
. 3 . 403625 13 . 3 . 03686 12 . 0 . 303769 12 . 8 . 433953 11 . 1 . 743992 11 . 5 .
. 3 . - - . 3 . - - . - . - . 8 . - - . 1 . - - . 5 .
- * - . [sɪks] . - * [naɪn] . ['sevən] . - - . [sɪks] . - - . [eit] . - - . [wʌn]
854303 * 10 . 6 . 784579 * 9 . 7 . 455383 12 . 6 . 405921 12 . 8 . 707479 12 . 1
- * - . 6 . - - * 9 . 7 . - - . 6 . - - . 8 . - - . 1
+0 . -
+0 . 48
+0 . -
SBc (15)613 10.6 +0.60779 12.1 .483206 13.3 .453344 11.4 .603346 12.3 .403625 13.3 .03686 12.0 .303769 12.8 .433953 11.1 .743992 11.5 .854303* 10.6 .784579* 9.7 .455383 12.6 .405921 12.8 .707479 12.1 +0.48

[mi:n] - . - +0 . -
Mean 11 . 87 +0 . 509
意思是 - . - +0 . -

平均值 11.87 +0.509

[pɹɪ'kju:liə(r)] ([tu:'tu:]) - - . [θri:] +0 . - - . [wʌn] +0 . - { - }
Peculiar (2) 2782 12 . 3 +0 . 264314 11 . 1 +0 . 34 { 14 }
奇特 (2) - - . 3 +0 . - - . 1 +0 . - { - }

奇特的 (2)2782 12.3 +0.264314 11.1 +0.34{14}

[ˈteɪb(ə)] [θri:]
TABLE III
桌子 三、

表三

[ˈnɔ:m(ə)] [ˈspɑɪrəlz]
Normal Spirals
普通的 螺旋

正常螺旋

[en] . [dʒi:] . [si:] . [ɛm'ti:] [log] [di:]
N . G . C . mT log d
N . G . C . 公吨 日志 d

NGC mT log d

[ˈɛs.eɪ] (-) - - . [eit] +0 . - - . [θri:] . - - . [naɪn] . - - . [wʌn] . - - .
Sa (49) 488 11 . 8 +0 . 48676 13 . 3 . 301332 10 . 9 . 432655 11 . 1 . 602681 10 .
萨 (-) - - . 8 +0 . - - . 3 . - - . 9 . - - . 1 . - - .
[ˈseɪvən] . - - . [naɪn] . - - . [θri:] . - - . [eit] . - - . [θri:] . - - . [eit]
7 . 482775 10 . 9 . 322811 12 . 3 . 282855 12 . 8 . 113169 § 12 . 3 . 603245 11 . 8
7 . - - . 9 . - - . 3 . - - . 8 . - - . § - - . 3 . - - . 8
- - . [fɔːr] . - - * - - . - - . [wʌn] . - - . [θri:] . - - * - - . [θri:] .
- - . 303301 12 . 4 . 153368 * 10 . 0 . 853516 12 . 1 . 203619 12 . 3 . 03626 * 11 . 3 .
- - . - - . 4 . - - * - - . - - . 1 . - - . 3 . - - * - - . 3 .
- - . - - . - - . [wʌn] . - - . - - . [θri:] . - - . [naɪn] . - - .
283665 12 . 0 . 03682 12 . 1 . 083898 12 . 0 . 433941 10 . 3 . 304036 10 . 9 . 604138 12
- - . - - . 1 . - - . - - . 3 . - - . 9 . - - .
- - . [wʌn] . - - . [θri:] . - - . - - . - - . [fɔːr] . - - . [eit] . - - . [wʌn] +0 .
- - . 1 . 204143 11 . 3 . 114150 12 . 0 . 114251 10 . 4 . 264268 12 . 8 . 04274 11 . 1 +0 .
- - . 1 . - - . 3 . - - . - - . - - . 4 . - - . - - . 8 . - - . 1 +0 .
- - . [faɪv] +0 . - - . [faɪv] . - - . [sɪks] . - - . [wʌn] . - - . [wʌn] .
544281 11 . 5 +0 . 184429 11 . 5 . 484452 12 . 6 . 154526 11 . 1 . 704550 12 . 1 .
- - . 5 +0 . - - . 5 . - - . 6 . - - . 1 . - - . 1 .
- - . [wʌn] . - - . [naɪn] . [wʌn] . - - . [eit] + . - - . [tuːtuː] - - .
434570 11 . 1 . 384594 9 . 1 . 854665 11 . 8 + . 084684 12 . 2 - . 224698 11 .
- - . 1 . - - . 9 . 1 . 8 + . - - . 2 - . - - .
[naɪn] + . - - . [eit] . - - . [faɪv] . - - . - - . [fɔːr] . - - . [eit] .
9 + . 434710 11 . 8 . 544762 11 . 5 . 574866 12 . 0 . 504958 11 . 4 . 605377 11 . 8 .
9 + . - - . 8 . - - . 5 . - - . - - . - - . 4 . - - . 8 .
- - . [faɪv] . - - . [wʌn] + . - - . - - . * - - . [ˈseɪvən] + . - - . [eit]
485389 12 . 5 . 255422 12 . 1 + . 405631 12 . 0 - . 055866 * 11 . 7 + . 487013 12 . 8
- - . 5 . - - . 1 + . - - . - - . * - - . 7 + . - - . 8
- - . [eit] . - - . [θri:] . - - * - - . [fɔːr] +0 . -
- - . 087457 12 . 8 . 307727 11 . 3 . 437814 * 11 . 4 +0 . 48
- - . 8 . - - . 3 . - - * - - . 4 +0 . -

萨 (49)488 11.8 +0.48676 13.3 .301332 10.9 .432655 11.1 .602681 10.7 .482775 10.9 .322811 12.3 .282855 12.8
.113169§ 12.3 .603245 11.8 .303301 12.4 .153368* 10.0 .853516 12.1 .203619 12.3 .03626* 11.3 .283665 12.0
.03682 12.1 .083898 12.0 .433941 10.3 .304036 10.9 .604138 12.1 .204143 11.3 .114150 12.0 .114251 10.4 .264268
12.8 .04274 11.1 +0.544281 11.5 +0.184429 11.5 .484452 12.6 .154526 11.1 .704550 12.1 .434570 11.1 .384594 9.1
.854665 11.8 + .084684 12.2 – .224698 11.9 + .434710 11.8 .544762 11.5 .574866 12.0 .504958 11.4 .605377 11.8
.485389 12.5 .255422 12.1 + .405631 12.0 – .055866* 11.7 + .487013 12.8 .087457 12.8 .307727 11.3 .437814* 11.4
+0.48

[mi:n] - . - +0 . -
Mean 11 . 69 +0 . 333
意思是 - . - +0 . -

平均值 11.69 +0.333

[ˈsʌmbəði] (-) - [faɪv] . - +2 . - - . [eit] - . - . [wʌn] . - - . [θri:] . - - .
Sb (70) 224 5 . 0 +2 . 25672 12 . 8 0 . 54772 11 . 1 . 70949 13 . 3 . 0955 12 .
某人 (-) - 5 . - +2 . - - . 8 - . - - . 1 . - - . 3 . - - .
[naɪn] . - [naɪn] . [wʌn] . - - . - . - . [tuːtu:] . - - . [faɪv] . - - . - .
9 . 401068 9 . 1 . 401309 12 . 0 . 152639 12 . 2 . 02715 12 . 5 . 402748 12 . 0 .
9 . - 9 . 1 . - - . - - . - - . 2 . - - . 5 . - - . - .
- * [naɪn] . [fɔːr] . - - . [fɔːr] - . - * [eit] . [θri:] +1 . - - . [naɪn] - - . -
322841 * 9 . 4 . 782985 11 . 4 0 . 483031 * 8 . 3 +1 . 203182 12 . 9 - 0 . 223190
- * 9 . 4 . - - . 4 - . - * 8 . 3 +1 . - - . 9 - - . -
- . [naɪn] + . - - . - . - . [sɪks] . - - . [fɔːr] + . - - . [wʌn] - . - *
11 . 9 + . 483227 12 . 0 . 483277 12 . 6 . 03310 10 . 4 + . 183380 12 . 1 - . 053489 *
- . 9 + . - - . - - . - - . 6 - . - - . 4 + . - - . 1 - . - *
- . [tuːtu:] +0 . - - . [wʌn] +0 . - - . [naɪn] . - * [naɪn] . [naɪn] . - * [naɪn] .
11 . 2 +0 . 403556 11 . 1 +0 . 903593 11 . 9 . 603623 * 9 . 9 . 903627 * 9 .
- . 2 +0 . - - . 1 +0 . - - . 9 . - - . * 9 . 9 . - - . * 9 .
[wʌn] - . - § - . [fɔːr] +1 . - - . [θri:] - - . - - . [fɔːr] + . - - . -
1 0 . 903628 § 11 . 4 +1 . 083632 13 . 3 - 0 . 103675 11 . 4 + . 483681 13 . 0 . 03684
1 - . - § - . 4 +1 . - - . 3 - . - - . 4 + . - - . -
- . - + . - - . [θri:] - . - - . [wʌn] + . - - . [wʌn] . - - . [θri:] . -
13 . 0 + . 083895 13 . 3 - . 053900 12 . 1 + . 253938 12 . 1 . 654020 12 . 3 . 174030
- . - + . - - . 3 - . - - . 1 + . - - . 1 . - - . 3 . -
- . [wʌn] . - * - . [naɪn] . - - . [faɪv] . - - . - . [naɪn] . - *
11 . 1 . 304051 * 11 . 9 . 604085 12 . 5 . 364151 12 . 0 . 404192 10 . 9 . 904216 *
- . 1 . - * - . 9 - . - . 5 . - - . - . 9 . - *
- . [eit] - . - § - . [θri:] +1 . - { - } - * [eit] . ['seɪvən] +1 . - - . [eit] - . - *
10 . 8 0 . 854244 § 12 . 3 +1 . 11 { 15 } 4258 * 8 . 7 +1 . 304273 11 . 8 0 . 204438 *
- . 8 - . - § - . 3 +1 . - { - } - * 8 . 7 +1 . - - . 8 - . - *
- . [θri:] . - - . [eit] . - - . [sɪks] + . - - . [eit] - . - . [eit] +0 . - *
10 . 3 . 544448 11 . 8 . 484450 10 . 6 + . 574451 12 . 8 - . 154500 12 . 8 +0 . 174565 *
- . 3 . - - . 8 - . - . 6 + . - - . 8 - . - . 8 +0 . - *
§ - . - [wʌn] . - * [eit] . [fɔːr] - . - - . [eit] . - - . [eit] . - - . ['seɪvən] .
§ 11 . 0 1 . 174736 * 8 . 4 0 . 704750 11 . 8 . 264800 11 . 8 . 044814 12 . 7 .
§ - . - 1 . - * 8 . 4 - . - - . 8 . - - . 8 . - - . 7 . -
- [naɪn] . - - . * [naɪn] . [sɪks] . - - . [eit] + . - - . [naɪn] - - . -
564826 9 . 0 . 905055 * 9 . 6 . 905376 12 . 8 + . 175379 12 . 9 - 0 . 055394 13 .
- 9 . - - . * 9 . 6 - . - - . 8 + . - - . 9 - . - - .
[θri:] +0 . - - . - - . - . [θri:] + . - - . [θri:] . - - . [fɔːr] . - - .
3 +0 . 175633 13 . 0 - . 105713 12 . 3 + . 325740 12 . 3 . 485746 10 . 4 . 875750 12 .
3 +0 . - - . - - . - - . 3 + . - - . 3 . - - . 4 . - - .
[eit] . - - . - . - . [θri:] . - - . - . [eit] . - - . [naɪn] .
8 . 155772 12 . 0 . 255806 12 . 3 . 305985 12 . 0 . 606207 11 . 8 . 306643 11 . 9 .
8 . - - . - - . - - . 3 - . - - . - . 8 . - - . 9 . -
- * - . [fɔːr] . - - . ['seɪvən] . - - . - +0 . -
487331 * 10 . 4 . 957541 12 . 7 . 417606 12 . 0 +0 . 78
- * - . 4 . - - . 7 . - - . +0 . -

Sb (70)224 5.0 +2.25672 12.8 0.54772 11.1 .70949 13.3 .0955 12.9 .401068 9.1 .401309 12.0 .152639 12.2 .02715
12.5 .402748 12.0 .322841* 9.4 .782985 11.4 0.483031* 8.3 +1.203182 12.9 -0.223190 11.9 +.483227 12.0 .483277
12.6 .03310 10.4 +.183380 12.1 - .053489* 11.2 +0.403556 11.1 +0.903593 11.9 .603623* 9.9 .903627* 9.1
0.903628§ 11.4 +1.083632 13.3 -0.103675 11.4 +.483681 13.0 .03684 13.0 +.083895 13.3 - .053900 12.1 +.253938
12.1 .654020 12.3 .174030 11.1 .304051* 11.9 .604085 12.5 .364151 12.0 .404192 10.9 .904216* 10.8 0.854244§
12.3 +1.11{15}4258* 8.7 +1.304273 11.8 0.204438* 10.3 .544448 11.8 .484450 10.6 +.574451 12.8 - .154500 12.8
+0.174565*§ 11.0 1.174736* 8.4 0.704750 11.8 .264800 11.8 .044814 12.7 .564826 9.0 .905055* 9.6 .905376 12.8 +
0.175379 12.9 -0.055394 13.3 +0.175633 13.0 - 0.105713 12.3 + 0.325740 12.3 0.485746 10.4 0.875750 12.8
0.155772 12.0 0.255806 12.3 0.305985 12.0 0.606207 11.8 0.306643 11.9 0.487331* 10.4 0.957541 12.7 0.417606
12.0 +0.78

[mi:n] - . - +0 . -
Mean 11 . 55 +0 . 471
意思是 - . - +0 . -

平均值 11.55 +0.471



[es'si:] () . [fɔ:r] +0 . [nain] . [θri:] [wɔn] . . [wɔn] . .

Sc (115) 157 11 . 4 +0 . 40253 9 . 3 1 . 34278 12 . 0 0 . 08470 13 . 1 0 . 20598

Sc () - - . 4 +0 - - 9 . 3 1 - - - - - 1 - -

['sevən] . - [wɔn] . - - . [θri:] - - * - . [sɪks] . - - . [nain] . - - . [fɔ:r] .

7 . 0 1 . 78615 12 . 3 0 . 43628 * 10 . 6 . 90908 11 . 9 . 601084 11 . 4 .

7 - - 1 - - - 3 - - - * - - 6 - - - 9 - - - 4 - -

- - . [wɔn] . - - . [sɪks] . - - . [wɔn] - - - * [eit] . ['sevən][wɔn] . - - .

341087 12 . 1 . 361637 12 . 6 . 482339 13 . 1 0 . 282403 * 8 . 7 1 . 202532 13 .

- - . 1 - - 6 - - - 1 - - - * 8 . 7 1 - - -

[θri:] - - [nain] . [nain][wɔn] . - - . [θri:] - - . [eit] . - - . [θri:] - -

3 0 . 172683 9 . 9 1 . 002712 12 . 3 0 . 202742 11 . 8 . 402776 12 . 3 0 .

3 - - - 9 9 1 - - - 3 - - - 8 - - - 3 - - -

- * [nain] . [wɔn][wɔn] . - - . [sɪks] . - - - - - § - . [θri:] . - - -

342903 * 9 . 1 1 . 042964 11 . 6 . 402976 12 . 0 . 503003 § 13 . 3 . 783021 12 .

- * 9 - 1 1 - - 6 - - - - - - - § 13 . 3 - - -

[θri:] . - § - - - . [fɔ:r] . - - - - - . ['sevən] . - - -

3 . 113079 § 12 . 0 . 903147 11 . 4 . 303166 12 . 0 . 03184 12 . 7 . 783198 13 . 0 .

3 - - § - - - - 4 - - - - - 7 - - - - -

- - . [eit] . - - - - - . [wɔn] +0 . - - . [sɪks] +0 . - - . [θri:] - -

953254 12 . 8 . 603294 12 . 0 . 483389 13 . 1 +0 . 303395 12 . 6 +0 . 113396 13 . 3 - .

- - . 8 - - - - - 1 +0 - - - 6 +0 - - - 3 - - -

- - . [sɪks] + . - - - - - . [fɔ:r] . - - . [wɔn] . - - . [θri:] .

103430 12 . 6 + . 493432 12 . 0 . 793437 12 . 4 . 283445 13 . 1 . 083448 12 . 3 .

- - . 6 + . - - - - - 4 - - - 1 - - - 3 - - -

- - . [eit] . - - - . [eit] . - - . [θri:] . - * - . [wɔn] . - - . [θri:] .

263486 11 . 8 . 583488 12 . 8 . 253512 12 . 3 . 03521 * 10 . 1 . 653549 13 . 3 .

- - . 8 - - - 8 - - - 3 - - - * - - 1 - - - 3 - - -

- - . [θri:] . - - - . [eit] . - - - . [nain] . - - . [eit] . -

433596 13 . 3 . 603631 11 . 8 . 663642 12 . 0 . 733655 11 . 9 . 043666 11 . 8 . 543672

- - . 3 - - - 8 - - - - - - 9 - - - 8 - - -

- - - . [θri:] . - - - . [θri:] . - - - . [eit] .

13 . 0 . 543683 12 . 0 . 153780 13 . 0 . 403810 11 . 3 . 623813 12 . 3 . 323877 11 . 8 .

- - - 3 - - - 3 - - - - - 3 - - - 8 - - -

- - . [θri:] . - - - . [eit] . - - - . [eit] . - - . [wɔn] . - - . [θri:] . -

643887 12 . 3 . 403893 11 . 8 . 613949 11 . 8 . 343982 12 . 1 . 364013 13 . 3 . 604041

- - 3 - - - 8 - - - 8 - - - 1 - - - 3 - - -

- . [fɔ:r] . - - . [sɪks] . - - . [faɪv] . +0 . - { - } - - . [θri:] +0 . - - . [θri:]

11 . 4 . 304062 12 . 6 . 484088 11 . 5 . +0 . 72 { 16 } 4096 12 . 3 +0 . 784100 12 . 3

- - 4 - - - 6 - - - 5 . +0 - - { - } - - - 3 +0 - - - 3

- - . [θri:] . - § - . [θri:] . - - . [θri:] . - - . [wɔn] - - - . [eit]

. 604145 12 . 3 . 704157 § 12 . 3 . 774212 12 . 3 . 304220 12 . 1 0 . 404236 12 . 8

- - - 3 - - § 3 - - 3 - - 3 - - 1 - - - 8

[wɔn] . - - . [fɔ:r] - - - * - . [faɪv] . - - . [wɔn] . - - . [eit] . - - -

1 . 044254 10 . 4 0 . 654321 * 10 . 5 . 704414 10 . 1 . 484419 11 . 8 . 364460 12 .

1 - - - 4 - - - * - - 5 - - - 1 - - - 8 - - -

[wɔn] . - * - . [tu:'tu:] . - * - . [faɪv] . - - . [wɔn] - - § - . [faɪv][wɔn] .

1 . 204490 * 10 . 2 . 604501 * 10 . 5 . 704504 12 . 1 0 . 484517 § 12 . 5 1 .

1 - - - * - - 2 - - - * - - 5 - - - 1 - - - § - - 5 1 - -

- § - . [θri:] - - - . ['sevən] . - * - . [nain] . - - . [θri:] . - [nain] .

004536 § 12 . 3 0 . 854559 10 . 7 . 904569 * 10 . 9 . 654580 12 . 3 . 154605 9 .

- § - - 3 - - - 7 - - - * - - 9 - - - 3 - - - 9 - - -

[nain] - - * [nain] . [faɪv][wɔn] . - - . [wɔn] - - - - - . [θri:] .

9 0 . 484631 * 9 . 5 1 . 084632 13 . 1 0 . 504666 12 . 0 . 604713 12 . 3 .

9 - - - * 9 - 5 1 - - - 1 - - - - - - 3 - - -

- - . [eit] . - - - . [fɔ:r] . - - . [sɪks] +0 . - - . [eit] +0 . - * - . [wɔn]

384781 11 . 8 . 484793 12 . 4 . 204808 12 . 6 +0 . 344995 11 . 8 +0 . 365005 * 11 . 1

- - - 8 - - - 4 - - - 6 +0 - - 8 +0 - - - * - - 1

- - - . [nain] . - - * - . [eit] - - - * ['sevən] . [fɔ:r][wɔn] . - - . [eit] - - -

. 705012 11 . 9 . 435033 * 11 . 8 0 . 785194 * 7 . 4 1 . 085204 12 . 8 0 . 595236

- - - 9 - - - * - - 8 - - - * 7 - 4 1 - - - 8 - - -

[illegible]

[ænd; ənd][end][ɒv; əv][ðə; ði] ['si:kwəns] [ɒv; əv] [taɪps] [ænd; ənd][ˈɔ:lsəʊ][fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði][ɪ'regjələ(r)] ['nebʊli:]
and end of the sequence of types and also for the irregular nebulae
和 结尾 的 这 顺序 的 类型 和 还 为了 这 不规律的 星云
.
:
.

以及类型序列的末尾，也适用于不规则星云。

[ɪn] ['fɪgəz] [tu:'tu:][ænd; ənd][θri:][ə'dʒɪə(s)nt] [taɪps] [hæv; həv] [bi:n] [gru:pt] [ɪn][ˈɔ:də(r)][tu;; tə] [ɪn'kri:s]
In Figures 2 and 3 adjacent types have been grouped in order to increase
在 数据 2 和 3 邻近的 类型 有 到过 分组 在 命令 到 增加
[ðə; ði][mə'tɪəriəl] ,
the material ,
这 材料 ,

在图2和图3中，相邻的类型被归为一组，以增加材料。

[ænd; ənd][ɪn] ['fɪgə(r)] [faɪv][ðə; ði][mægə'lænɪk] [klaʊdz] [hæv; həv] [bi:n] ['ædɪd] [tu;; tə] [ɪn'kri:s] [ðə; ði][reɪndʒ]
and in Figure 5 the Magellanic Clouds have been added to increase the range
和 在 数字 5 这 麦哲伦 云 有 到过 额外 到 增加 这 范围
.
:
.

在图 5 中，添加了麦哲伦星云以增加范围。

[ðə; ði] [kɔ:rə'leɪ[nz] [kæn; kən][bi;; bi] [ɪk'sprest] [ɪn][ðə; ði] [fɔ:m] ([wʌn])
The correlations can be expressed in the form (1)
这 相关性 能 是 表达 在 这 形式 (1)

相关性可以用以下形式表示 (1)

[weə(r)] [keɪ][ɪz] ['kɒnstənt] [frɒm; frəm] [taɪp] [tu;; tə] [taɪp] , [bʌt; bət][si:]['veəɪz] [prə'gresɪvli] [θru:'aʊt]
where K is constant from type to type , but C varies progressively throughout
在哪里 K 是 持续的 从 类型 到 类型 , 但 C 变化 逐步 自始至终
[ðə; ði] ['si:kwəns] .
the sequence .
这 顺序 .

其中 K 对于各种类型都是恒定的，但 C 在整个序列中逐渐变化。

[ðə; ði]['vælju:][ɒv; əv][keɪ] ['kænɒt] [bi;; bi] ['ækjərətli] [dɪ'tɜ:mɪnd] { - }
The value of K cannot be accurately determined { 17 }
这 价值 的 K 不能 是 准确 决定 { - }

K 值无法准确确定{17}

[frɒm; frəm][ðə; ði] ['skæɪtəd] ['dɜ:tə][fɔ:(r); fə(r)][ˈeni] [pəˈtɪkjələ(r)] [taɪp] , [bʌt; bət] , [wɪðɪn] [ðə; ði]['lɪmɪts]
from the scattered data for any particular type , but , within the limits
从 这 疏散 数据 为了 任何 特别的 类型 , 但 , 之内 这 限制
[ɒv; əv] [ʌn'sɜ:t(ə)ntɪ] ,
of uncertainty ,
的 不确定 ,

从任何特定类型的零散数据中，但在不确定性范围内，

[aɪ'ti:] [ə'prɒksɪmɪts] [ðə; ði][raʊnd] ['nʌmbə(r)][faɪv] . - , [ðə; ði]['vælju:] [wɪtʃ] [ɪz] [reprɪ'zentɪd] [baɪ][ðə; ði]
it approximates the round number 5 : 0 , the value which is represented by the
它 近似值 这 圆形的 数字 5 : - , 这 价值 哪个 是 代表 经过 这
[laɪnz][ɪn] ['fɪgəz] [tu:'tu:] - [faɪv] .
lines in Figures 2 - 5 :
线条 在 数据 2 - 5 :

它近似于整数 5.0，该值由图 2-5 中的线条表示。

[wen] [keɪ][ɪz] [nəʊn] ,
When K is known ,
什么时候 K 是 已知 ,

当K已知时，

[ðə; ði][ˈvæljuː][ɒv; əv][siː][kæn; kən][biː; bi][kəmˈpjuːtɪd][frəm; frəm][ðə; ði] [miːn] [ˈmæɡnɪtjuːd][ænd; ənd][ðə; ði]
the value of C can be computed from the mean magnitude and the
这 价值 的 C 能 是 计算 从 这 意思是 震级 和 这
[ˈlɒɡəɾɪðəm][ɒv; əv][ðə; ði][daɪˈæmɪtə(r)][fɔː(r); fə(r)] [iːtʃ] [taɪp] .
logarithm of the diameter for each type .
对数 的 这 直径 为了 每个 类型 :

C 值可以通过每种类型的平均幅值和直径的对数来计算。

[ðɪs] [əˈmaʊnts] [tuː; tə] [ˈriːdɪŋ] [frəm; frəm][ðə; ði] [kɜːrvz] [ðə; ði][ˈmæɡnɪtjuːd] [ˌkɒrəˈspɒndɪŋ] [tuː; tə][ə; eɪ]
This amounts to reading from the curves the magnitudes corresponding to a
这 金额 到 阅读 从 这 曲线 这 震级 相应的 到 一个
[daɪˈæmɪtə(r)][ɒv; əv][wʌn] [ˈmɪnɪt] [ɒv; əv][ɑːk] ,
diameter of one minute of arc ,
直径 的 一 分钟 的 弧 ,
这相当于从曲线中读取对应于一角分直径的量值。

[bʌt; bət] [əˈvɔɪdz] [ðə; ði] [ʌnˈsɜːt(ə)ntɪ] [ɒv; əv] [ɪˈstæblɪʃɪŋ] [ðə; ði] [kɜːrvz] [weə(r)] [ðə; ði][ˈdeɪtə][ɑː(r); ə(r)]
but avoids the uncertainty of establishing the curves where the data are
但 避免 这 不确定 的 建立 这 曲线 在哪里 这 数据 是
[ˈlɪmɪtɪd] .
limited .
有限的 :

但避免了在数据有限的情况下建立曲线的不确定性。

[ˈteɪb(ə)l][,aɪ ˈviː]
TABLE IV
桌子 第四

表四

[ɪˈregjələ(r)] [ˈnebjʊ,liː]
Irregular Nebulae
不规律的 星云

不规则星云

[en] . [dʒiː] . [siː] . [ɛmˈtiː][lɒɡ] d2968 - . [sɪks] +0 . - * [naɪn] . - . - . [fɔːr] . - - .
<u>N . G . C . mT log d2968</u> <u>12 . 6 +0 . 083034</u> <u>*</u> <u>9 . 0 . 853077</u> <u>11 . 4 . 483729</u> <u>11 .</u>
N . G . C . 公吨 日志 d2968 - . 6 +0 . - <u>*</u> 9 . - . - . 4 . - - .
[eit] . - * - . [θriː] . - * [naɪn] . [faɪv] . - - . [θriː] +0 . - § - . [faɪv] +1 .
<u>8 . 174214</u> <u>*</u> <u>11 . 3 . 904449</u> <u>*</u> <u>9 . 5 . 654618</u> <u>12 . 3 +0 . 404656</u> <u>§ 11 . 5 +1 .</u>
8 . - <u>*</u> - . 3 . - <u>*</u> 9 . 5 . - . 3 +0 . - § - . 5 +1 .
- - . [fɔːr] +0 . - - . [eit] - . - - . [wʌn] +0 . -
<u>304753</u> <u>11 . 4 +0 . 435144</u> <u>12 . 8 - . 305363</u> <u>11 . 1 +0 . 20</u>
- - . 4 +0 . - - . 8 - . - - . 1 +0 . -
NGC mT log d2968 12.6 +0.083034* 9.0 .853077 11.4 .483729 11.8 .174214* 11.3 .904449* 9.5 .654618 12.3
+0.404656§ 11.5 +1.304753 11.4 +0.435144 12.8 – .305363 11.1 +0.20

[miːn] - . - +0 . -
Mean 11 . 34 +0 . 469
意思是 - . - +0 . -

平均值 11.34 +0.469

[nəʊts] [tuː; tə] [ˈteɪblz] [aɪ] – [,aɪ ˈviː]
NOTES TO TABLES I – IV
笔记 到 表格 我 – 第四

表格 I 至 IV 的注释

* [ˈmæɡnɪtjuːd][frəm; frəm] - .
* Magnitude from Hopmann .
* 震级 从 - .

霍普曼震级。

† [en] . [dʒi:] . [si:] . - [ænd; ənd] - [ɑ:(r); ə(r)] [leit] [ɪ'liptɪk(ə)l] ['nebʊ,li:] [ɪn] [wɪtʃ] [ðə; ði][,ekwə'tɔ:riəl]
† N . G . C . 524 and 3998 are late elliptical nebulae in which the equatorial
† N . G . C . - 和 - 是 晚的 椭圆形 星云 在 哪个 这 赤道
[pleɪnz] [ɑ:(r); ə(r)][,pɜ:pən'dɪkjələ(r)][tu:; tə][ðə; ði][laɪn][ɒv; əv] [saɪt] .
planes are perpendicular to the line of sight .
飞机 是 垂直 到 这 线 的 视线 .
† NGC 524 和 3998 是晚期椭圆星云，其赤道面垂直于视线。

[ðeɪ] [maɪt] [bi:; bi][ɪn'klu:dɪd] [wɪð] [ðə; ði] E6 [ɔ:(r)] E7 ['nebʊ,li:] .
They might be included with the E6 or E7 nebulae .
他们 可能 是 包括 和 这 E6 或者 E7 星云 .
它们可能属于 E6 或 E7 星云。

§ [əb'zɔ:p(ə)n] ['veri] [kən'spɪkjʊəs] .
§ Absorption very conspicuous .
§ 吸收 非常 显眼的 .
吸收非常明显。

‡ [en] . [dʒi:] . [si:] . - , - ,
‡ N . G . C . 3607 , 4459 ,
‡ N . G . C . - , - ,
‡ NGC 3607, 4459,

[ænd; ənd] - [ə'priə(r)] [tu:; tə][bi:; bi][ɪ'liptɪk(ə)l] ['nebʊ,li:] [wɪð] ['nærəʊ] [bændz][ɒv; əv] [əb'zɔ:p(ə)n]
and 5485 appear to be elliptical nebulae with narrow bands of absorption
和 - 出现 到 是 椭圆形 星云 和 狭窄的 乐队的 吸收
[br'twi:n] [ðə; ði][ˈnju:kliəɪ][ænd; ənd][ðə; ði] [pə'rɪfəri] .
between the nuclei and the peripheries .
之间 这 细胞核 和 这 外围 .
5485 似乎是椭圆星云，其核心和边缘之间有狭窄的吸收带。

[ðə; ði] [prə'gresɪv] [tʃeɪndʒ] [ɪn][ðə; ði]['vælju:][ɒv; əv][si:] [θru:'aʊt] [ðə; ði] ['si:kwəns] [meɪ] [bi:; bi]
The progressive change in the value of C throughout the sequence may be
这 进步 改变 在 这 价值 的 C 自始至终 这 顺序 可能 是
[ɪk'sprest] [æz; əz][ə; eɪ][,veəri'eɪ(ə)n][ˈaɪðə(r)][ɪn][ðə; ði]['mæɡnɪtju:d][fɔ:(r); fə(r)][ə; eɪ]['ɡɪv(ə)n][daɪ'æmɪtə(r)]
expressed as a variation either in the magnitude for a given diameter
表达 作为 一个 变化 任何一个 在 这 震级 为了 一个 给定 直径
[ɔ:(r)][ɪn][ðə; ði][daɪ'æmɪtə(r)][fɔ:(r); fə(r)][ə; eɪ]['ɡɪv(ə)n]['mæɡnɪtju:d] .
or in the diameter for a given magnitude .
或者 在 这 直径 为了 一个 给定 震级 .
整个序列中 C 值的逐渐变化可以表示为给定直径的幅度变化，或者给定幅度的直径变化。

[bəʊθ] [ɪ'fekts] [ɑ:(r); ə(r)] ['lɪstɪd] [ɪn]['teɪb(ə)l][sevn][ænd; ənd][ɑ:(r); ə(r)] ['ɪləstreɪtɪd] [ɪn]['fɪɡə(r)] [sɪks] ,
Both effects are listed in Table VII and are illustrated in Figure 6 ,
两个都 效果 是 列出 在 桌子 七 和 是 插图 在 数字 6 ,
表 VII 列出了这两种效应，图 6 则对此进行了说明。

[ɪn] [wɪtʃ] ['mæɡnɪtju:d] [ænd; ənd][daɪ'æmɪtəz] [ðʌs] [faʊnd] [ɑ:(r); ə(r)] [plɒtɪd] [ə'ɡenst] [taɪps] .
in which magnitudes and diameters thus found are plotted against types .
在 哪个 震级 和 直径 因此 成立 是 绘制 反对 类型 .
其中，将由此得出的星等和直径与类型作图。

[wɪð] [ðə; ði] [ɪk'sep(ə)n] [ɒv; əv][ðə; ði]['leɪtə(r)] [ɪ'liptɪk(ə)l] ['nebʊ,li:] ,
With the exception of the later elliptical nebulae ,
和 这 例外 的 这 之后 椭圆形 星云 ,
除了后期形成的椭圆星云之外，

[fɔ:(r); fə(r)] [wɪt] [ðə; ði][ˈdɛɪtə][ɑ:(r); ə(r)] [ˈhəʊli] [ɪnˈædɪkwət] [fɔ:(r); fə(r)][rɪˈlaɪəb(ə)] [dɪ,tə:miˈneiʃənz] ,
for which the data are wholly inadequate for reliable determinations ,
为了 哪个 这 数据 是 完全 不足 为了 可靠的 决定 ,
[ðə; ði] [pɔɪnts] [fɔ:l][ɒn] [smu:ð] [kɜ:rvz] .
the points fall on smooth curves .
这 积分 落下 在 光滑的 曲线 .

对于数据完全不足以进行可靠判断的情况，这些点落在平滑曲线上。

[ɪn][ðə; ði][ˈri:dʒən][ɒv; əv][ðə; ði] [ˈɜ:lɪə(r)] [ɪˈlɪptɪk(ə)] [ˈnebʝʊ.li:] ,
In the region of the earlier elliptical nebulae ,
在 这 地区 的 这 早些时候 椭圆形 星云 ,
在早期椭圆星云的区域，

[ðə; ði] [kɜ:rvz] [ʃʊd; ʃəd][bi;; bi] [ˈsʌmwɒt] [ˈsti:pə] [ɪn][ˈɔ:də(r)][tu;; tə] [əˈlaʊ] [fɔ:(r); fə(r)][ˈɒbdʒɪkts][ɒv; əv]
the curves should be somewhat steeper in order to allow for objects of
这 曲线 应该 是 有些 更陡峭 在 命令 到 允许 为了 对象 的
[ˈɡreɪtə(r)] [wɪt] [ɑ:(r); ə(r)] [ˈprɒbəbli] [ɪnˈklu:dɪd] .
greater ellipticities which are probably included .
更大的 椭圆率 哪个 是 大概 包括 .

为了容纳可能包含在内椭圆度更大的物体，曲线应该更陡峭一些。

[rɪˈdʌkʃ(ə)n] [ɒv; əv] [ˈnebʝʊ.li:] [tu;; tə][ə; eɪ] [ˈstændəd] [taɪp]
REDUCTION OF NEBULAE TO A STANDARD TYPE
减少 的 星云 到 一个 标准 类型
将星云简化为标准类型

[ðə; ði] [sləʊp] , [keɪ] , [ɪn][ðə; ði] [ˈfɔ:mjələ] [rɪˈleɪtɪŋ] [ˈmæɡnɪtju:d] [wɪð] [daˈɪæmɪtəz] ,
The slope , K , in the formula relating magnitudes with diameters ,
这 坡 , K , 在 这 公式 相关 震级 和 直径 ,
在描述幅值与直径关系的公式中，斜率 K 为：

[əˈpiəz] [tu;; tə][bi;; bi] [ˈkləʊsli] [ˈsɪmələ(r)][fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði] [ˈveəriəs] [taɪps] , [bʌt; bət] [ˈækjərət]
appears to be closely similar for the various types , but accurate
出现 到 是 密切 相似的 为了 这 各种各样的 类型 , 但 准确的
[dɪ,tə:miˈneiʃənz] { - }
determinations { 18 }
决定 { - }

各种类型似乎非常相似，但精确测定{18}

[ɑ:(r); ə(r)] [rɪˈstrɪktɪd] [baɪ][ðə; ði] [ˈlɪmɪtɪd] [ænd; ənd] [ˈskætəd] [ˈneɪtə(r)][ɒv; əv][ðə; ði][ˈdɛɪtə][fɔ:(r); fə(r)] [i:t]
are restricted by the limited and scattered nature of the data for each
是 受限制的 经过 这 有限的 和 疏散 自然 的 这 数据 为了 每个
[taɪp] [ˈseprətli] .
type separately .
类型 分别地 .

受限于每种类型数据的有限性和分散性。

[wɪð] [ə; eɪ] [ˈnɒlɪdʒ] [ɒv; əv][ðə; ði][pəˈræmɪtə(r)][si:] , [haʊˈevə(r)] ,
With a knowledge of the parameter C , however ,
和 一个 知识 的 这 范围 C , 然而 ,
然而，如果知道参数C，

[aɪ ˈti:][ɪz][ˈpɒsəb(ə)][tu;; tə] [rɪˈdju:s] [ɔ:l][ðə; ði][məˈtɪəriəl][tu;; tə][ə; eɪ] [ˈstændəd] { - }
it is possible to reduce all the material to a standard { 19 }
它 是 可能的 到 减少 全部 这 材料 到 一个 标准 { - }

可以将所有材料减少到标准{19}

[taɪp] [ænd; ənd] [hens] [tuː; tə] [dɪ'tɜːmɪn] [ðə; ði][ˈvæljuː][pʊ; əv][keɪ][frɒm; frəm][ðə; ði][təʊ'tæləti][pʊ; əv]
type and hence to determine the value of K from the totality of
类型 和 因此 到 决定 这 价值 的 K 从 这 总和 的
[ðə; ði][ˈdeɪtə] .
the data .
这 数据 .

类型，从而根据所有数据确定 K 值。

[ðə; ði] [mi:n] [pʊ; əv] E7 , [ˌɛs.bi:'eɪ] , [ænd; ənd][ˌɛs.eɪ][wɒz; wəz] [t'æʊzn] [fɔː(r); fə(r)][ðə; ði] ['pɜːpəs] ,
The mean of E7 , SBa , and Sa was chosen for the purpose ,
这 意思是 的 E7 , 小企业管理局 , 和 萨 曾是 选定 为了 这 目的 ,
选取E7、SBa和Sa的平均值作为参考值。

[æz; əz] [ˌreprɪ'zentɪŋ] [ə; eɪ][ˌhaɪpə'θetɪk(ə)l][træn'zɪ(ə)n] - [pɔɪnt] [bɪ'twiːn] [ðə; ði][ɪ'lɪptɪk(ə)l] ['nebʊˌliː]
as representing a hypothetical transition - point between the elliptical nebulae
作为 代表 一个 假想 过渡 - 观点 之间 这 椭圆形 星云
[ænd; ənd][ðə; ði][ˈspaɪrəlz] ,
and the spirals ,
和 这 螺旋 ,
作为椭圆星云和旋涡星云之间假想的过渡点，

[ænd; ənd][wɒz; wəz] [ˈdeɪzɪneɪtɪd] [baɪ][ðə; ði][ˈsɪmb(ə)l] “ S0 .
and was designated by the symbol “ S0 .
和 曾是 指定的 经过 这 象征 “ S0 .
并用符号“S0”表示。

” [ðə; ði] [kɒrə'spɒndɪŋ] [ˈvæljuː][pʊ; əv][siː] , [ɪn] [raʊnd] [ˈnʌmbəz] , [ɪz] - . - .
” **The corresponding value of C , in round numbers , is 13 . 0 .**
” 这 相应的 价值 的 C , 在 圆形的 数字 , 是 13 . 0 .
“C 的对应值（取整）为 13.0。

[kə'rekʃnz] [wɜː(r); wə(r)] [ə'plaɪd] [tuː; tə][ðə; ði] ['lɒɡərɪθmz] [pʊ; əv][ðə; ði][da'ɪæmɪtəz][pʊ; əv][ðə; ði]
Corrections were applied to the logarithms of the diameters of the
更正 是 应用 到 这 对数 的 这 直径 的 这
[ˈnebʊˌliː] [pʊ; əv] [iːtʃ] [əb'zɜːvd] [klɑːs] ,
nebulae of each observed class ,
星云 的 每个 观察到 班级 ,
对每类观测到的星云直径的对数进行了修正。

[ə'maunt] [tuː; tə]
amounting to
金额 到

总计

[weə(r)] [siː][ɪz][ðə; ði] [əb'zɜːvd] [ˈvæljuː][fɔː(r); fə(r)][ə; eɪ][pə'tɪkjələ(r)] [klɑːs] . - [wen] [ðə; ði][ˈvæljuːz][pʊ; əv]
where C is the observed value for a particular class . 17 When the values of
在哪里 C 是 这 观察到 价值 为了 一个 特别的 班级 . - 什么时候 这 值 的
[siː][ɑː(r); ə(r)] [riːd] [frɒm; frəm][ðə; ði] [smuːð] [kɜːv] [ɪn] ['fɪɡə(r)] [sɪks] ,
C are read from the smooth curve in Figure 6 ,
C 是 读 从 这 光滑的 曲线 在 数字 6 ,
其中 C 是特定类别的观测值。17 当从图 6 中的平滑曲线读取 C 值时，

[ðɪːz] [kə'rekʃnz] [ɑː(r); ə(r)][æz; əz] [[əʊn] [ɪn][ˈteɪb(ə)l][eɪtθ] .
these corrections are as shown in Table VIII .
这些 更正 是 作为 所示 在 桌子 八 .
这些修正如表八所示。

[ˈteɪb(ə)l][viː]
TABLE V
桌子 V

表五

[ˈfriːkwənsi] [ˌdɪstrɪˈbjʊːʃn] [ɒv; əv] [ˈtaɪps]
Frequency Distribution of Types
频率 分配 的 类型

类型频率分布

[ˈtaɪp] [ˈnʌmbə(r)] [pəˈsentɪdʒ] [miːn] [mæg] .
Type Number Percentage Mean Mag .
类型 数字 百分比 意思是 磁力 .

类型 数量 百分比 平均值 数量

[ɪˈlɪptɪk(ə)l] [ˈnebjʊ.liː]
Elliptical Nebulae
椭圆形 星云

椭圆星云

E0 - - - . - - - - . - - - - . - - - - . - - [sɪks][sɪks] - .
E0 17 18 11 . 401 13 14 11 . 432 14 15 11 . 523 10 11 11 . 994 13 14 11 . 955 6 6 10 .
E0 - - - . - - - - . - - - - . - - - - . - - 6 6 - .
- [ˈsɛvən][eit] - . - [ˈfaɪv][ˈfaɪv] - . -
976 7 8 10 . 937 5 5 11 . 02
- 7 8 - . - 5 5 - . -

E0 17 18 11.401 13 14 11.432 14 15 11.523 10 11 11.994 13 14 11.955 6 6 10.976 7 8 10.937 5 5 11.02

[pek][eit][naɪn] - . -
Pec 8 9 11 . 55
胸肌 8 9 - . -

胸肌 8 9 11.55

[ˈtəʊt(ə)l] - - * - . -
Total 93 23 * 11 . 53
全部的 - - * - . -

总计 93 23* 11.53

[ˈnɔːm(ə)l][ˈspairəlz]
Normal Spirals
普通的 螺旋

正常螺旋

[ˈɛs.eɪ] - - - . -
Sa 49 21 11 . 69
萨 - - - . -

Sa 49 21 11.69

[biː] - - - . -
b 70 29 11 . 55
b - - - . -

b 70 29 11.55

[siː] - - - . -
c 115 49 11 . 75
c - - - . -

c 115 49 11.75

[pek][θriː][wʌn] - . -
Pec 3 1 12 . 80
胸肌 3 1 - . -

佩克 3 1 12.80

[ˈtəʊt(ə)l] - - * - . -
Total 237 59 * 11 . 68
全部的 - - * - . -

总计 237 59* 11.68

[bɑːd]	[ˈspairəlz]
Barred	Spirals
禁止	螺旋

棒旋螺旋

[,ɛs,bi:'eɪ]	-	-	-	.	-
SBa	26	44	11	.	66
小企业管理局	-	-	-	.	-

SBa 26 44 11.66

[bi:]	-	-	-	.	-
b	16	27	11	.	48
b	-	-	-	.	-

b 16 27 11.48

[si:]	-	-	-	.	-
c	15	26	11	.	87
c	-	-	-	.	-

c 15 26 11.87

[pek][tu:'tu:][θri:]	-	.	-		
Pec	2	3	11	.	70
胸肌	2	3	-	.	-

胸肌 2 3 11.70

[ˈtəʊt(ə)]	-	-	*	-	.	-
Total	59	15	*	11	.	66
全部的	-	-	*	-	.	-

总计 59 15* 11.66

[ɪ'regjələ(r)]	Nebulae11	[θri:]	*	-	.	-
Irregular	Nebulae11	3	*	11	.	34
不规则的	Nebulae11	3	*	-	.	-

不规则星云11 3* 11.34

[t'əʊtəlz]
Totals
总计

总计

[ɔ:l]	[taɪps]	-	-	-	.	-
All	types	400	100	11	.	63
全部	类型	-	-	-	.	-

所有类型 400 100 11.63

*	[pə'sentɪdʒɪz]	[ɒv; əv]	-	,	[ðə; ði][ˈtəʊt(ə)l][ˈnʌmbə(r)][ɒv; əv]	[ˈnebjʊ,li:]	[ɪn'vestɪɡertɪd]	.			
*	Percentages	of	400	,	the	total	number	of	nebulae	investigated	.
*	百分比	的	-	,	这	全部的	数字	的	星云	调查	.

* 占所调查星云总数 400 的百分比。

[ðə; ði]	[pə'sentɪdʒɪz]	[ɒv; əv]	[ðə; ði]	[ˈsʌb,taɪps]	[rɪ'fɜ:(r)]	[tu:; tə]	[ðə; ði]	[ˈnʌmbə(r)]	[ɒv; əv]	[ˈnebjʊ,li:]	[ɪn]	[ðə; ði]
The	percentages	of	the	subtypes	refer	to	the	number	of	nebulae	in	the
这	百分比	的	这	亚型	参考	到	这	数字	的	星云	在	这

[pə'tɪkjələ(r)]	[taɪp]	.
particular	type	.
特别的	类型	.

各亚型所占百分比指的是特定类型星云的数量。

[ˈteɪb(ə)]	[ˈsɪksθ]
TABLE	VI
桌子	六年级

表六

[ˈfriːkwənsi] [ˌdɪstrɪˈbjʊːʃn] [pɒv; əv][ˈmæɡnɪtjuːd]
Frequency Distribution of Magnitudes
频率 分配 的 震级

幅值频率分布

[ˈmæɡnɪtjuːd] [ˈɪntəv(ə)l] [ˈnʌmbəz] [pɒv; əv] [ˈnebjʊ,liː]
Magnitude Interval Numbers of Nebulae
震级 间隔 数字 的 星云

星云的星等区间编号

[iː][es] All8 . [wʌn] – [eit] . [faɪv] – [tuː'tuː] - . [sɪks] – [naɪn] . - [tuː'tuː][fɔːr] - . [wʌn] – [naɪn] . [faɪv][fɔːr][sɪks]
E S All8 . 1 – 8 . 5 0 2 28 . 6 – 9 . 0 2 4 79 . 1 – 9 . 5 4 6
E S All8 . 1 – 8 . 5 - 2 - . 6 – 9 . - 2 4 - . 1 – 9 . 5 4 6
- . [sɪks] – - . - ['seɪvən]['seɪvən] - . [wʌn] – - . [faɪv]['seɪvən] - - . [sɪks] – - . - [eit] - - .
119 . 6 – 10 . 0 7 7 1910 . 1 – 10 . 5 7 13 2010 . 6 – 11 . 0 8 14 3211 .
- . 6 – - . - 7 7 - . 1 – - . 5 7 - - . 6 – - . - 8 - - .
[wʌn] – - . [faɪv][naɪn] - - . [sɪks] – - . - - - - - . [wʌn] – - . [faɪv] - - - . [sɪks] – -
1 – 11 . 5 9 24 4911 . 6 – 12 . 0 21 57 8812 . 1 – 12 . 5 20 52 8612 . 6 – 13
1 - - . 5 9 - - . 6 - - . - - - - - . 1 - - . 5 - - - - - . 6 - - .
- - - - - .
. 0 10 33 51
- - - - - .
ES All8.1– 8.5 0 2 28.6– 9.0 2 4 79.1– 9.5 4 6 119.6–10.0 7 7 1910.1–10.5 7 13 2010.6–11.0 8 14 3211.1–11.5 9 24
4911.6–12.0 21 57 8812.1–12.5 20 52 8612.6–13.0 10 33 51

[ðə; ði] [kə'rektɪd] [ˈvæljuːz][pɒv; əv][lɒɡ][diː][wɜː(r); wə(r)] [ðen] [plɒtɪd] [ə'genst] [ðə; ði] [əb'zɜːvd]
The corrected values of log d were then plotted against the observed
这 已更正 值 的 日志 d 是 然后 绘制 反对 这 观察到

[ˈmæɡnɪtjuːd] .
magnitudes .
震级 .

然后，将修正后的 log d 值与观测到的星等作图。

[ðɪs] [ə'maʊnts] [tuː; tə] [ˈɪftɪŋ] [ðə; ði] [ə'prɒksɪmətli] [ˈpærəlel] [ˌkɒrə'leɪ(ə)n] [kɜːrvz] [fɔː(r); fə(r)][ðə; ði]
This amounts to shifting the approximately parallel correlation curves for the
这 金额 到 转变 这 大约 平行线 相关性 曲线 为了 这
[ˈseprət] [taɪps] [ə'lɒŋ] [ðə; ði][ˈæksɪs][pɒv; əv][lɒɡ][diː][ʌn'tɪl] [ðeɪ] [ˌkəʊɪn'saɪd] .
separate types along the axis of log d until they coincide .
分离 类型 沿着 这 轴 的 日志 d 直到 他们 重合 .

这相当于沿着 log d 轴移动不同类型的近似平行的相关曲线，直到它们重合为止。

[sɪns] [ðə; ði] [miːn] [ˈmæɡnɪtjuːd] [pɒv; əv][ðə; ði] [ˈveəriəs] [taɪps] [ɑː(r); ə(r)] [ˈniəli] [ˈkɒnstənt] ,
Since the mean magnitudes of the various types are nearly constant ,
自从 这 意思是 震级 的 这 各种各样的 类型 是 几乎 持续的 ,
由于各种类型的平均强度几乎恒定，

[ðə; ði] [ˈrelətɪv] [ˈɪfts] [wɪl] [ˈveri] [ˈniəli] [ˈiːkwəl][ðə; ði] [ˈdɪfərənsɪz] [ɪn][ðə; ði] [miːn] [əb'zɜːvd] [lɒɡ][diː] ,
the relative shifts will very nearly equal the differences in the mean observed log d ,
这 相对的 轮班 将要 非常 几乎 平等的 这 差异 在 这 意思是 观察到 日志 d ,
相对变化将非常接近于观测到的平均对数 d 的差异，

[ænd; ənd] [hens] [ðə; ði] [ɪ'fekt] [pɒv; əv][ˈerə(r)z][ɪn][ðə; ði] [fɜːst] [ə,prɒksɪ'meɪʃn] [tuː; tə][ðə; ði][ˈvæljuːz][pɒv; əv]
and hence the effect of errors in the first approximation to the values of
和 因此 这 影响 的 错误 在 这 第一的 近似 到 这 值 的
[keɪ] [wɪl] [biː; bi][ˈneglɪdʒəb(ə)l] . { - }
K will be negligible . { **20** }
K 将要 是 微不足道 . { - }

因此，对 K 值进行第一次近似计算时出现的误差的影响可以忽略不计。{20}

[fɪg] .
Fig .
如图 .

如图。

[wʌn] . — [ˈfriːkwənsi] [ˌdɪstrɪˈbjʊːʃn] [ɒv; əv] [əˈpærənt] [ˈmæɡnɪtjuːd] [əˈmʌŋ] [ˈnebjʊ.liː] [ɪn] -
1 . — **Frequency distribution of apparent magnitudes among nebulae in Holetschek's**
1 . — 频率 分配 的 明显 震级 之中 星云 在 -

[lɪst] .
list .
列表 .

1.—霍列切克星云列表中的星云视星等频率分布。

[fɪg] .
Fig .
如图 .

如图。

[tuːˈtuː] . — [rɪˈleɪ(ə)n] [brɪˈtwiːn] [ˌluːmɪˈnɒsəti][ænd; ənd][daɪˈæmɪtə(r)] [əˈmʌŋ] [ˈnebjʊ.liː] [æt; ət][ðə; ði]
2 . — **Relation between luminosity and diameter among nebulae at the**
2 . — 关系 之间 亮度 和 直径 之中 星云 在 这
[brɪˈɡɪnɪŋ] [ɒv; əv][ðə; ði] [ˈsiːkwəns] [ɒv; əv] [taɪps] — E0 [ænd; ənd] E1 [ˈnebjʊ.liː] .
beginning of the sequence of types — E0 and E1 nebulae .
开始 的 这 顺序 的 类型 — E0 和 E1 星云 .

2.—星云类型序列开始时的光度和直径之间的关系—E0 和 E1 星云。

[ðə; ði][plɒt][ɪz] [ˈæʊn] [ɪn][ˈfɪɡə(r)][ˈseɪvən] , [ɪn] [wɪtʃ] [ðə; ði] [tuː] [mæɡəˈlænɪk] { - }
The plot is shown in Figure 7 , in which the two Magellanic { 21 }
这 阴谋 是 所示 在 数字 7 , 在 哪个 这 二 麦哲伦 { - }

图 7 显示了该图，其中两个麦哲伦{21}

[klaʊdz] [hæv; həv] [biːn] [ɪnˈkluːdɪd][ɪn][ˈɔːdə(r)][tuː; tə] [ˈstreŋ(k)θn] [ðə; ði] [braɪt] [end][ɒv; əv][ðə; ði] [kɜːv]
Clouds have been included in order to strengthen the bright end of the curve
云 有 到过 包括 在 命令 到 加强 这 明亮的 结尾 的 这 曲线
[wɪtʃ] [wʊd] [ˈʌðəwaɪz] [biː; bi][ˌʌnˈdjuːli] [ˈɪnfluənst] [baɪ][ðə; ði][ˈsɪŋɡ(ə)] { - }
which would otherwise be unduly influenced by the single { 22 }
哪个 会 否则 是 过度 影响 经过 这 单身的 { - }

加入云是为了增强曲线的明亮部分，否则该部分会受到单{22}的过度影响。

[ˈɒbdʒɪkt; əbˈdʒekt] , [em] - .
object , **M 31** .
目的 , M - .

物体，M 31。

[ðə; ði][ˈmæɡnɪtjuːd] +0 . [faɪv][ænd; ənd] +1 . [faɪv] , [wɪtʃ] [wɜː(r); wə(r)] [əˈsaɪnd] [tuː; tə][ðə; ði] [klaʊdz] ,
The magnitudes +0 . 5 and +1 . 5 , which were assigned to the Clouds ,
这 震级 +0 . 5 和 +1 . 5 , 哪个 是 分配 到 这 云 ,
[ɑː(r); ə(r)] [ˈestɪmənts] [beɪst] [əˈpɒn] [ˈpʌblɪʃt] [dɪskʁɪpʃənz] .
are estimates based upon published descriptions .
是 估算 基于 之上 已发布 描述 .

分配给这些星云的星等 +0.5 和 +1.5 是根据已发表的描述估算出来的。

[fɪg] .
Fig .
如图 .

如图。

[θri:] . — [rɪ'leɪ(ə)n] [brɪ'twi:n] [ˌlu:mɪ'nɒsəti][ænd; ənd][daɪ'æmɪtə(r)] [ə'mʌŋ] ['nebjʊ,li:] [æɪ; ət][ðə; ði]['mɪd(ə)]
3 . — Relation between luminosity and diameter among nebulae at the middle
3 . — 关系 之间 亮度 和 直径 之中 星云 在 这 中间
[ɒv; əv][ðə; ði] ['si:kwəns] [ɒv; əv] [taɪps] — E7 ,
of the sequence of types — E7 ;
的 这 顺序 的 类型 — E7 ;
3.—星云类型序列中间部分的光度和直径之间的关系—E7,

[ɛs.eɪ] , [ænd; ənd] [ɛs,bi:'eɪ] ['nebjʊ,li:] .
Sa , and SBa nebulae .
萨 , 和 小企业管理局 星云 .
Sa 和 SBa 星云。

[fɪg] .
Fig .
如图 .
如图。

[fɔ:r] . — [rɪ'leɪ(ə)n] [brɪ'twi:n] [ˌlu:mɪ'nɒsəti][ænd; ənd][daɪ'æmɪtə(r)] [ə'mʌŋ] ['nebjʊ,li:] [æɪ; ət][ðə; ði][end]
4 . — Relation between luminosity and diameter among nebulae at the end
4 . — 关系 之间 亮度 和 直径 之中 星云 在 这 结尾
[ɒv; əv][ðə; ði] ['si:kwəns] [ɒv; əv] [taɪps] — [ɛs'si:][ænd; ənd][ɛs,bi:'si:] ['nebjʊ,li:] .
of the sequence of types — Sc and SBC nebulae .
的 这 顺序 的 类型 — Sc 和 sbc 星云 .
4.—星云类型序列末端星云的光度和直径之间的关系—Sc 和 SBc 星云。

[ðə; ði][ˌkɒrə'leɪ(ə)n] [ɒv; əv][ðə; ði]['deɪtə][ɪz] ['veri] ['kləʊsli] [ˌreprɪ'zentɪd] [baɪ][ðə; ði] ['fɔ:mjələ] ([tu:'tu:])
The correlation of the data is very closely represented by the formula (2)
这 相关性 的 这 数据 是 非常 密切 代表 经过 这 公式 (2)
数据的相关性可以用公式（2）非常精确地表示。

[ðɪs] [fɔ:ls] [brɪ'twi:n] [ðə; ði] [tu:] [rɪ'greʃn] [kɜ:rvz] [dɪ'rʌɪvd] [frɒm; frəm] [li:st] - [skweə(r)] [sə'lʊʃən]
This falls between the two regression curves derived from least - square solutions
这 瀑布 之间 这 二 回归 曲线 衍生的 从 至少 - 正方形 解决方案
[ænd; ənd][kʊd; kəd][bi:; bi] [əb'teɪnd] [ɪg'zæktli][baɪ] [ə'saɪnɪŋ] [ə'prəʊpriət] [weɪts] [tu:; tə][ðə; ði] [tu:]
and could be obtained exactly by assigning appropriate weights to the two
和 可以 是 获得 确切地 经过 分配 合适的 重量 到 这 二
[ˈmeθədʒ] [ɒv; əv] ['gru:pɪŋ] .
methods of grouping .
方法 的 分组 .
这介于由最小二乘法解得出的两条回归曲线之间， 可以通过给两种分组方法赋予适当的权重来精确获得。

[ðə; ði]['neɪtə(r)][ɒv; əv][ðə; ði]['deɪtə][ɪz] [sʌtʃ] [ðæt][ə; eɪ]['kləʊzə(r)] [ə'gri:mənt] [kæn; kən] ['skeəsli] [bi:; bi]
The nature of the data is such that a closer agreement can scarcely be
这 自然 的 这 数据 是这样的 那 一个 更近 协议 能 几乎 是
[ɪk'spektɪd] .
expected .
预期的 .
由于数据的性质， 很难指望达成更紧密的共识。

[nəʊ] [kə'rekʃn] [tu:; tə][ðə; ði] [ə'sju:md] ['vælju:][ɒv; əv][ðə; ði][sləʊp] [ə'prɪəz] [tu:; tə][bi:; bi][rɪ'kwaɪəd] .
No correction to the assumed value of the slope appears to be required .
不 更正 到 这 假定 价值 的 这 坡 出现 到 是 必需的 .
似乎不需要对假定的斜率值进行修正。

[ðə; ði][mə'tɪəriəl][ɪk'stendz; ek-]['əʊvə(r)][ə; eɪ][reɪndʒ][ɒv; əv] - [mæg] . ,
The material extends over a range of 12 mag . ,
这 材料 扩展 超过 一个 范围 的 - 杂志 . ,
该材料的应用范围涵盖 12 倍放大倍率。

[ænd; ənd][ðə; ði][fjuː] [keɪsɪz] [wɪtʃ] [hæv; həv] [biːn] [ɪnˈvestɪɡeɪtɪd] [ˈɪndɪkeɪt] [ðæt][ðə; ði][ˌkɒrəˈleɪ](ə)n]
and the few cases which have been investigated indicate that the correlation
和 这 很少 案例 哪个 有 到过 调查 表明 那 这 相关性
[kæn; kən][biː; bi] [ɪkˈstendɪd] [əˈnʌðə(r)][θriː][mæg] . ,
can be extended another 3 mag . ,
能 是 扩展 其他 3 杂志 . ,
少数已调查的案例表明，这种相关性还可以再扩展 3 个星等。

[tuː; tə][ðə; ði][ˈlɪmɪt][æt; ət] [wɪtʃ] [ˈnebjʊ.liː] [kæn; kən][biː; bi] [ˈklæsɪfaɪd] [wɪð] [ˈsɜːt(ə)nti] [ɒn] [ˈfəʊtəɡræfs]
to the limit at which nebulae can be classified with certainly on photographs
到 这 限制 在 哪个 星云 能 是 分类 和 肯定 在 照片
[meɪd] [wɪð] [ðə; ði] - - [ɪntʃ] [rɪˈflektə(r)] .
made with the 100 - inch reflector .
制成 和 这 - - 英寸 反射器 .
用100英寸反射望远镜拍摄的照片，能够确定地对星云进行分类的极限。

[ðə; ði][rɪˈleɪ](ə)n [meɪ] [ˈðeəfɔː(r)] [biː; bi] [kənˈsɪdəd] [tuː; tə][həʊld] [θruːˈaʊt] [ðə; ði][ɪnˈtaɪə(r)][reɪndʒ]
The relation may therefore be considered to hold throughout the entire range
这 关系 可能 所以 是 经过考虑的 到 抓住 自始至终 这 全部的 范围
[ɒv; əv] [ˌɑːbzərˈveɪʃənz] .
of observations .
的 观察 .
因此，可以认为这种关系在整个观测范围内都成立。

[fɪɡ] .
Fig .
如图 .
如图。

[faɪv] . — [rɪˈleɪ](ə)n [brɪˈtwiːn] [ˌluːmɪˈnɒsəti][ænd; ənd][darˈæmɪtə(r)] [əˈmʌŋ] [ðə; ði][rɪˈɡejlə(r)] [ˈnebjʊ.liː] .
5 . — Relation between luminosity and diameter among the irregular nebulae .
5 . — 关系 之间 亮度 和 直径 之中 这 不规则的 星云 .
5.一不规则星云的光度和直径之间的关系。

[ðə; ði][mæɡəˈlænɪk] [klaʊdz] [ɑː(r); ə(r)][ɪnˈkluːdɪd] .
The Magellanic Clouds are included .
这 麦哲伦 云 是 包括 .
麦哲伦星云也包含在内。

[en] . [dʒiː] . [siː] . - [ɪz][æn; ən] [ɪkˈsepʃən(ə)l] [keɪs] [ɪn] [ðæt] [ˌaɪ ˈtiː] [ʃəʊz] [ə; eɪ] [ˈnærəʊ] ,
N . G . C . 4656 is an exceptional case in that it shows a narrow ,
N . G . C . - 是 一个 非凡的 案件 在 那 它 演出 一个 狭窄的 ,
NGC 4656 是一个特例，因为它显示出一个狭窄的星系团，

[ˈɡreɪtli] [ˈiːlɒŋɡeɪtɪd] [ˈɪmɪdʒ] [ɪn] [wɪtʃ] [əbˈzɔːpʃ(ə)n] [rɪˈfekts] [ɑː(r); ə(r)] [ˈveri] [kənˈspɪkjʊəs] ;
greatly elongated image in which absorption effects are very conspicuous ;
非常 细长的 图像 在 哪个 吸收 效果 是 非常 显眼的 ;
图像被拉长了很多，吸收效应非常明显；

[hens] [ðə; ði][ˈmæksɪməm][darˈæmɪtə(r)][ɪz] [ɪkˈsepʃənəli] [lɑːdʒ] [fɔː(r); fə(r)][ɪts] [əˈpærənt] [ˌluːmɪˈnɒsəti] . {
hence the maximum diameter is exceptionally large for its apparent luminosity . {
因此 这 最大限度 直径 是 非常 大的 为了 它是 明显 亮度 . {
- }
23 }
- }

[ðə; ði][rɪˈzɪdʒuəlz] [wɪˈðəʊt] [rɪˈɡɑːd] [tuː; tə][saɪn] [ˈævərɪdʒ] - . - [mæg] . ,
The residuals without regard to sign average 0 . 87 mag . ,
这 残差 没有 看待 到 符号 平均的 - . - 杂志 . ,
不考虑符号的残差平均值为 0.87 星等。

[ænd; ənd][ðeə(r)] [ə'priəz] [tuː; tə][biː; bi][nəʊ][,sɪstə'mætɪk] [ɪ'fekt] [djuː][ˈaɪðə(r)][tuː; tə] [taɪp] [ɔː(r)]
and there appears to be no systematic effect due either to type or
和 那里 出现 到 是 不 系统 影响 到期的任何一个 到 类型 或者
[,luːmɪ'nɒsəti] .
luminosity .
亮度 .

而且似乎没有因类型或亮度而产生的系统性影响。

[ðə; ði][ˈskætə(r)] , [haʊ'veə(r)] , [ɪz] [mʌtʃ] [ˈgreɪtə(r)][fɔː(r); fə(r)][ðə; ði][ˈspaɪrəlz] , [ɪˈspeʃəli] [ɪn][ðə; ði][ˈleɪtə(r)]
The scatter , however , is much greater for the spirals , especially in the later
这 分散 , 然而 , 是 很多 更大的 为了 这 螺旋 , 尤其 在 这 之后
[taɪps] ,
types ,
类型 ,

然而，螺旋星系的离散程度要大得多，尤其是在后期的类型中。

[ðæn; ðən][fɔː(r); fə(r)][ðə; ði][ɪ'lɪptɪk(ə)l] [ˈnebʊ,liː] .
than for the elliptical nebulae .
比 为了 这 椭圆形 星云 .

比椭圆星云更甚。

[ðə; ði] [ˈlɪmɪtɪŋ] [keɪsɪz][ɑː(r); ə(r)] [ɪkˈspləɪnd] [baɪ][pɪˈkjuːliə(r)] [ˈstrʌktʃərəl] [ˈfiːtʃəz] .
The limiting cases are explained by peculiar structural features .
这 限制 案例 是 解释 经过 奇特 结构 特征 .

这些极限情况可以用特殊的结构特征来解释。

[ðə; ði] [ˈnebʊ,liː] [wɪtʃ] [fɔːl] [wel] [əˈbʌv] [ðə; ði][laɪn][ˈjuːzuəli; ˈjuːzəli][hæv; həv] [braɪt] [ˈstelə(r)][ˈnjuːkliəɪ] ,
The nebulae which fall well above the line usually have bright stellar nuclei ,
这 星云 哪个 落下出色地 多于 这 线 通常 有 明亮的 恒星 细胞核 ,

位于该线以上的星云通常具有明亮的恒星核。

[ænd; ənd] [ðəʊz] [wɪtʃ] [fɔːl] [ləʊɪst] [ɑː(r); ə(r)][ˈspaɪrəlz] [siːn] [edʒ] - [ɒn][ɪn] [wɪtʃ] [belts] [ɒv; əv]
and those which fall lowest are spirals seen edge - on in which belts of
和 那些 哪个 落下 最低 是 螺旋 已见 边缘 - 在 在 哪个 腰带 的
[əb'zɔːp](ə)n] [ɑː(r); ə(r)] [kən'spɪkjuəs] .
absorption are conspicuous .
吸收 是 显眼的 .

而那些最低点的螺旋线是从侧面看到的，其中吸收带非常明显。

[ˈteɪb(ə)l][ˈsevn]
TABLE VII
桌子 七

表七

[taɪp]	[,ɛm'tiː]	[lɒg]	[diː]	[siː]	*	[diː]	†															
Type	mT	log	d	C	*	d	†															
类型	公吨	日志	d	C	*	d	†															
类型 mT log d C* dt																						
E0	-	.	-	-	-	.	-	-	.	-	[wʌn]	.	-	-	.	-	-	.	-	[wʌn]	.	
E0	11	. 40	- 0	. 204	10	. 38	1	. 21	11	. 43	. 177	10	. 54	1	. 32	11	. 52	. 088	11	. 08	1	.
E0	-	.	-	-	-	.	-	-	.	-	1	.	-	-	.	-	-	.	-	-	1	.
-	-	.	-	-	-	.	-	[wʌn]	.	-	-	.	-	-	.	-	-	.	-	[tuː'tuː]	.	
63	11	. 99	. 133	11	. 33	1	. 84	11	. 95	- . 011	11	. 90	2	. 45	10	. 97	+	. 090	11	. 42	.	
-	-	.	-	-	-	.	-	1	.	-	-	.	-	-	.	-	-	.	-	-	-	.
[wʌn]	.	-	-	-	-	.	-	[tuː'tuː]	.	-	-	.	-	-	.	-	-	.	-	[θɪɹiː]	.	
1	. 96	10	. 93	. 220	12	. 03	2	. 57	11	. 02	. 360	12	. 82	3	. 7							
1	.	-	-	-	-	.	-	2	.	-	-	.	-	-	.	-	-	.	-	3	.	7
E0	11.40	-0.204	10.38	1.21	11.43	.177	10.54	1.32	11.52	.088	11.08	1.63	11.99	.133	11.33	1.84	11.95	-	.011	11.90		
				2.45	10.97	+	.090	11.42	1.96	10.93	.220	12.03	2.57	11.02	.360	12.82	3.7					

[ˈɛs.eɪ] - . - . - . - . - [fɔːr] . [ˈseɪvən]

Sa	11	. 69	. 333	13	. 35	4	. 7
萨	-	-	-	-	-	4	7

Sa 11.69 .333 13.35 4.7

[biː] - . - . - . - . - [sɪks] . -

b	11	. 55	. 471	13	. 90	6	. 0
b	-	-	-	-	-	6	-

b 11.55 .471 13.90 6.0

[siː] - . - . - . - . - [ˈseɪvən] . [ˈseɪvən]

c	11	. 74	. 540	14	. 44	7	. 7
c	-	-	-	-	-	7	7

c 11.74 .540 14.44 7.7

[ˌɛs.biːˈeɪ] - . - . - . - . - [fɔːr] . -

SBa	11	. 66	. 267	13	. 00	4	. 0
小企业管理局	-	-	-	-	-	4	-

SBa 11.66 .267 13.00 4.0

[biː] - . - . - . - . - [fɔːr] . [θriː]

b	11	. 48	. 317	13	. 16	4	. 3
b	-	-	-	-	-	4	3

b 11.48 .317 13.16 4.3

[siː] - . - . - . - . - [ˈseɪvən] . [sɪks]

c	11	. 87	. 509	14	. 41	7	. 6
c	-	-	-	-	-	7	6

c 11.87 .509 14.41 7.6

[ˈɪ(r)] - . - - +0 . - - . - - [faɪv] . [fɔːr]

Irr	11	. 34	+0	. 469	13	. 68	5	. 4
不	-	-	+0	-	-	-	5	4

波动率 11.34 +0.469 13.68 5.4

* [siː] = [ˌɛmˈtiː] + [faɪv][lɒɡ][diː] .

* C	=	mT	+	5	log	d	.
* C	=	公吨	+	5	日志	d	.

* C = mT + 5 log d。

† [lɒɡ][diː] = - . [tuːˈtuː] ([siː] — [ˌɛmˈtiː]) ; [ˌɛmˈtiː] = - . - .

† log d	= 0 . 2	(C — mT)	;	mT = 10 . 0 .
† 日志 d	= - . 2	(C — 公吨)	;	公吨 = - . - .

† log d = 0.2 (C — mT); mT = 10.0。

[ɪˈfekts] [ɒv; əv] [ˌɔːriənˈteɪ(ə)n]

EFFECTS	OF	ORIENTATION
效果	的	方向

方向的影响

[ðə; ði] [ɪˈfekt] [ɒv; əv][ðə; ði][ˌɔːriənˈteɪ(ə)n][ɪz] [əˈpriːjəb(ə)l] [əˈmʌŋ] [ðə; ði][ˈspairəlz][ɪn][ˈdʒen(ə)rəl] .

The effect of the orientation is appreciable among the spirals in general .
这影响的方向是值得赞赏之中这螺旋在一般的。

螺旋方向的影响在螺旋形图案中总体上是显著的。

[ɪn][ˈɔːdə(r)][tuː; tə] [ˈɪləstreɪt] [ðɪs] [ˈfiːtʃə(r)] ,

In order to illustrate this feature ,
在命令到阐明这特征 ,

为了说明这一特点，

[ðeɪ] [hæv; həv] [bi:n] [dɪ'vaɪdɪd][ˈɪntu:] [θri:] [gru:ps] [kən'sɪstɪŋ] [ɒv; əv] [ðəʊz] [hu:z] [ˈɪmɪdʒɪz][ɑ:(r); ə(r)]
they have been divided into three groups consisting of those whose images are
他们 有 到过 分割 进入 三 团体 由 的 那些 谁 图片 是
[raʊnd][ɔ:(r)] [ˈniəli] [raʊnd] ,
round or nearly round ,
圆形的 或者 几乎 圆形的 ,

它们被分为三组，分别是图像呈圆形或近圆形的那些图像；

[ɪ'lɪptɪk(ə)] , [ænd; ənd] [edʒ] - [ɒn] , [ɔ:(r)] [ˈniəli] [səʊ] .
elliptical , and edge - on , or nearly so .
椭圆形 , 和 边缘 - 在 , 或者 几乎 所以 .

椭圆形，且侧向，或接近侧向。

[ðə; ði] [mi:n] [ˈvælju:z][ɒv; əv][ɛm'ti:] + [faɪv][lɒg][di:] [wɜ:(r); wə(r)] [ðen] [kəm'pju:tɪd][ænd; ənd] [kəm'peəd]
The mean values of mT + 5 log d were then computed and compared
这 意思是 值 的 公吨 + 5 日志 d 是 然后 计算 和 比较的
[wɪð] [ðə; ði] [θɪə'retɪk(ə)] [ˈvælju:] , - . - .
with the theoretical value , 13 . 0 .
和 这 理论 价值 , - . - .

然后计算 mT + 5 log d 的平均值，并与理论值 13.0 进行比较。

[ðə; ði][rɪ'zɪdʒuəlz][ɑ:(r); ə(r)] [ˈnegətɪv] [wen] [ðə; ði] [ˈnebjʊ.li:] [ɑ:(r); ə(r)] [tu:] [braɪt] [fɔ:(r); fə(r)][ðeə(r)]
The residuals are negative when the nebulae are too bright for their
这 残差 是 消极的 什么时候 这 星云 是 也 明亮的 为了 他们的
[daɪ'æmɪtəz][ænd; ənd] [ˈpɒzətɪv] [wen] [ðeɪ] [ɑ:(r); ə(r)] [tu:] [feɪnt] .
diameters and positive when they are too faint .
直径 和 积极的 什么时候 他们 是 也 头晕的 .

当星云亮度与其直径不成比例时，残差为负值；当星云亮度与其直径不成比例时，残差为正值。

[ðə; ði] [rɪ'zʌlts] [ɑ:(r); ə(r)][ˈɡɪv(ə)n][ɪn][ˈteɪb(ə)l] [ɪks] , [weə(r)] [mi:n] [rɪ'zɪdʒuəlz][ɑ:(r); ə(r)] [ˈfɒləʊd] [baɪ][ðə; ði]
The results are given in Table IX , where mean residuals are followed by the
这 结果 是 给定 在 桌子 第九章 , 在哪里 意思是 残差 是 随后 经过 这
[ˈnʌmbəz] [ɒv; əv] [ˈnebjʊ.li:] ,
numbers of nebulae ,
数字 的 星云 ,

结果见表 IX，其中平均残差后面是星云的数量，

[ɪn] [pə'renθəsi:z] , [wɪtʃ] [ɑ:(r); ə(r)] [reprɪ'zentɪd] [baɪ][ðə; ði] [mi:nz] . { - }
in parentheses , which are represented by the means . { 24 }
在 括号 , 哪个 是 代表 经过 这 方法 . { - }

括号内的内容用均值表示。{24}

[ðə; ði] [ˈnʌmbəz] [ɒv; əv][ðə; ði] [bɑ:d] [ˈspaɪrəlz][ɑ:(r); ə(r)] [tu:] [ˈlɪmɪtɪd] [tu:; tə][ɪnˈspaɪə(r)] [ˈkɒnfɪdəns] [ɪn]
The numbers of the barred spirals are too limited to inspire confidence in
这 数字 的 这 禁止 螺旋 是 也 有限的 到 启发 信心 在
[ðə; ði] [rɪ'zʌlts] ,
the results ,
这 结果 ,

条纹螺旋的数量太少，不足以让人对结果充满信心。

[bʌt; bət] [əˈmʌŋ] [ðə; ði][ˈnɔ:m(ə)l][ˈspaɪrəlz][ðeə(r)][ɪz] [kənˈklu:sɪv] [ˈeɪvɪdəns] [ðæt][ðə; ði] [ˈhaɪli] [ˈtɪltɪd]
but among the normal spirals there is conclusive evidence that the highly tilted
但 之中 这 普通的 螺旋 那里 是 确凿 证据 那 这 高度 斜
[ænd; ənd] [edʒ] - [ɒn] [ˈnebjʊ.li:] [ɑ:(r); ə(r)][ˈfeɪntə(r)][fɔ:(r); fə(r)][ə; eɪ][ˈɡɪv(ə)n][daɪ'æmɪtə(r)][ðæn; ðən] [ðəʊz]
and edge - on nebulae are fainter for a given diameter than those
和 边缘 - 在 星云 是 较暗 为了 一个 给定 直径 比 那些
[si:n] [ɪn][ðə; ði] [raʊnd] .
seen in the round .
已见 在 这 圆形的 .

但在正常的旋涡星云中，有确凿的证据表明，对于给定的直径，高度倾斜和侧向的星云比圆形的星云更暗。

[ə; eɪ] ['stʌdi] [ɒv; əv][ðə; ði][ˌɪndɪˈvɪdʒuəl][ˈɪmɪdʒɪz] ['ɪndɪkerts] [ðæt][ðə; ði] [ɪˈfekt] [ɪz][dju:] ['veri] ['lɑ:dʒli] [tu:; tə]
A study of the individual images indicates that the effect is due very largely to
一个 学习 的 这 个人 图片 表示 那 这 影响 是 到期的 非常 很大程度上 到
[dɑ:k] [əb'zɔ:pj(ə)n] [klaʊdz] ,
dark absorption clouds ,
黑暗的 吸收 云 ,
对单张图像的研究表明, 这种效应很大程度上是由于暗吸收云造成的。

[wɪtʃ] [bɪˈkʌm] [mɔ:(r)] [kənˈspɪkjʊəs] [wen] [ðə; ði] ['nebjʊ.li:] [ɑ:(r); ə(r)] ['haɪli] ['tɪltɪd] .
which become more conspicuous when the nebulae are highly tilted .
哪个 变得 更多的 显眼的 什么时候 这 星云 是 高度 斜 .
当星云倾斜角度很大时, 这种现象会变得更加明显。

[ði:z] [klaʊdz] [ɑ:(r); ə(r)][ˈdʒen(ə)rəli] , [bʌt; bət][nɒt] [ju:nɪˈvɜ:səli] , [pəˈrɪfərəl] ['fi:tʃəz] .
These clouds are generally , but not universally , peripheral features .
这些 云 是 一般来说 , 但 不是 普遍地 , 外围 特征 .
这些云通常 (但不总是) 是边缘特征。

[æn; ən] [ɪkˈstensɪv] [ɪnˌvestɪˈgeɪ(ə)n] [wɪl] [bi:; bi] ['nesəsəri] [bɪˈfɔ:(r)] ['eni] [rɪˈzɪdʒuəl] [ɪˈfekt] [dju:] [tu:; tə]
An extensive investigation will be necessary before any residual effect due to
一个 广泛的 调查 将要 是 必要的 前 任何 残余 影响 到期的 到
[əb'zɔ:pj(ə)n] [baɪ] ['lu:mɪnəs] [ˌnebjʊˈləsəti][kæn; kən][bi:; bi] [ɪˈstæblɪʃt] [wɪð] ['sɜ:t(ə)nti] .
absorption by luminous nebulosity can be established with certainty .
吸收 经过 发光的 星云 能 是 已确立的 和 肯定 .
要确定发光星云吸收造成的任何残留效应, 还需要进行广泛的调查。

['i:v(ə)n][ʃʊd; ʃəd] [sʌtʃ] [ɪgˈzɪst] , [aɪ ˈti:] ['kliəli] ['kænɒt] [bi:; bi] [ɪkˈsesɪv] .
Even should such exist , it clearly cannot be excessive .
甚至 应该 这样的 存在 , 它 清楚地 不能 是 过多的 .
即使存在这种情况, 也显然不能过量。

[fɪg] .
Fig :
如图 :
如图。

[saɪks] . — [prəˈɡresɪv] [ˌkærəktəˈrɪstɪks] [ɪn][ðə; ði] ['si:kwəns] [ɒv; əv] [taɪps] .
6 . — Progressive characteristics in the sequence of types .
6 . — 进步 特征 在 这 顺序 的 类型 .
6.—类型序列中的渐进特征。

[ðə; ði] [ˈʌpə(r)] [kɜ:v] [ˌreprɪˈzents] [ðə; ði] [prəˈɡreɪ(ə)n] [ɪn][ˈtəʊt(ə)l][ˈmæɡnɪtju:d] [wɪð] [taɪp] [fɔ:(r); fə(r)]
The upper curve represents the progression in total magnitude with type for
这 上 曲线 代表 这 进展 在 全部的 震级 和 类型 为了
[ˌnebjʊ.li:] ['hævɪŋ] ['mæksɪməm][daɪˈæmɪtəz][ɒv; əv][wʌn] ['mɪnɪt] [ɒv; əv][ɑ:k] .
nebulae having maximum diameters of one minute of arc .
星云 拥有 最大限度 直径 的 — 分钟 的 弧 .
上曲线表示最大直径为 1 角分的星云的总星等随类型的变化。

[ðə; ði] [ɪˈlɪptɪk(ə)l] ['nebjʊ.li:] [ænd; ænd][ðə; ði][ˈnɔ:m(ə)l][ˈspaɪrəlz][ɑ:(r); ə(r)][ɪnˈklu:dɪd][æz; əz] [ˌreprɪˈzentɪŋ]
The elliptical nebulae and the normal spirals are included as representing
这 椭圆形 星云 和 这 普通的 螺旋 是 包括 作为 代表
[ðə; ði][ˈnɔ:m(ə)l] ['si:kwəns] ,
the normal sequence ,
这 普通的 顺序 ,
椭圆星云和正常的旋涡星系被包括在内, 以代表正常的星系序列。

[bʌt; bət][ðə; ði] [bɑ:d] [ˈspaɪrəlz][ænd; ænd][ðə; ði][ɪˈregjələ(r)] [ˌnebjʊ.li:] [ɑ:(r); ə(r)] [əʊˈmɪtɪd] .
but the barred spirals and the irregular nebulae are omitted .
但 这 禁止 螺旋 和 这 不规则的 星云 是 省略 .
但棒旋星系和不规则星云被省略了。

[ðə; ði] [ˈfɪgəz] [gɪv] [ðə; ði][ˈnʌmbə(r)][ɒv; əv][ˈɒbdʒɪkts] [əbˈzɜ:vɪd] [ɪn] [i:tʃ] [taɪp] .
The figures give the number of objects observed in each type .
这 数据 给 这 数字 的 对象 观察到 在 每个 类型 .

这些数字给出了每种类型观察到的物体数量。

[əˈmʌŋ] [ðə; ði][ˈleɪtə(r)][ɪˈlɪptɪk(ə)l] [ˈneɪbjʊ.li:] [ðə; ði] [ˈnʌmbəz] [ɑ:(r); ə(r)][səʊ] [smɔ:l] [ðæt] [mi:nz] [ɒv; əv]
Among the later elliptical nebulae the numbers are so small that means of
之中 这 之后 椭圆形 星云 这 数字 是 所以 小的 那 方法 的
[əˈdʒers(ə)nt] [taɪps] [hæv; həv] [bi:n] [plɒtɪd] .
adjacent types have been plotted .
邻近的 类型 有 到过 绘制 .

后期形成的椭圆星云数量非常少，因此只能绘制相邻类型的平均值。

[ðə; ði][ˈləʊə(r)] [kɜ:v] [ˌreprɪˈzents] [ðə; ði] [prəˈgreʃ(ə)n] [ɪn][daɪˈæmɪtə(r)] [əˈlɒŋ] [ðə; ði][ˈnɔ:m(ə)l] [ˈsi:kwəns]
The lower curve represents the progression in diameter along the normal sequence
这 降低 曲线 代表 这 进展 在 直径 沿着 这 普通的 顺序
[fɔ:(r); fə(r)] [ˈneɪbjʊ.li:] [ɒv; əv][ðə; ði] [tenθ] [ˈmæɡnɪtju:d] .
for nebulae of the tenth magnitude .
为了 星云 的 这 第十 震级 .

下方的曲线代表了10等星云直径沿正常序列的变化。

[ˈteɪb(ə)l][eɪtθ]
TABLE VIII
桌子 八

表八

[ðə; ði] ['nebjʊ.li:] [hæv; həv] [bi:n] [rɪ'dju:st] [tu:; tə][ə; eɪ] ['stændəd] [taɪp] , S0 , [wɪtʃ] , ['bi:ɪŋ] [ðə; ði] [mi:n]
The nebulae have been reduced to a standard type , S0 , which , being the mean
这 星云 有 到过 减少 到 一个 标准 类型 , S0 , 哪个 , 存在 这 意思是
[pʊ; əv] E7 ,
of E7 ,
的 E7 ,

这些星云已被简化为标准类型 S0，它是 E7 的平均值，

[ˈɛs.eɪ] , [ænd; ənd] [ˌɛs.bi:'eɪ] , [ˌreprɪ'zents] [ə; eɪ][ˌhaɪpə'θetɪk(ə)l][ˌtrænzɪ(ə)n] [pɔɪnt] [brɪ'twi:n] [ɪ'lɪptɪk(ə)l]
Sa , and SBa , represents a hypothetical transition point between elliptical
萨 , 和 小企业管理局 , 代表 一个 假想 过渡 观点 之间 椭圆形
['nebjʊ.li:] [ænd; ənd][ˈspaɪrəlz] .
nebulae and spirals .
星云 和 螺旋 .

Sa 和 SBa 代表了椭圆星云和旋涡星云之间的假想过渡点。

[ðə; ði][mæɡə'lænɪk] [klaʊdz] [hæv; həv] [bi:n] [ɪn'klu:dɪd][ɪn][ɪ'ɔ:də(r)][tu:; tə] ['streŋ(k)θn] [ðə; ði] [braɪtə] [end]
The Magellanic Clouds have been included in order to strengthen the brighter end
这 麦哲伦 云 有 到过 包括 在 命令 到 加强 这 更亮 结尾
[pʊ; əv][ðə; ði][plɒt] .
of the plot .
的 这 阴谋 .

加入麦哲伦星云是为了增强画面中较明亮的部分。

[ˌsɪɡ'nɪfɪkəns] [pʊ; əv][ðə; ði] [ˌlu:mɪ'nɒsəti] [rɪ'leɪ(ə)n]
SIGNIFICANCE OF THE LUMINOSITY RELATION
意义 的 这 亮度 关系

光度关系的重要性

[ðə; ði] [ˌkɔ:rə'leɪʃnz] [ðʌs] [fɑ:(r)] [dɪ'raɪvd] [ɑ:(r); ə(r)] [brɪ'twi:n] ['təʊt(ə)l] [ˌlu:mɪ'nɒsəti] [ænd; ənd][ˈmæksɪmə]m]
The correlations thus far derived are between total luminosities and maximum
这 相关性 因此 远的 衍生的 是 之间 全部的 亮度 和 最大限度
[da'ɪæmɪtəz] .
diameters .
直径 .

目前得出的相关性是总光度和最大直径之间的相关性。

[ɪn][ðə; ði][məʊst][ˈdʒen(ə)rəl] [sens] , ['ðeəfɔ:(r)] , [ðeɪ] { - }
In the most general sense , therefore , they { 25 }
在 这 最多 一般的 感觉 , 所以 , 他们 { - }

因此，从最广义的角度来看，它们{25}

[ɪk'spres] [lɔ:z] [pʊ; əv] [mi:n] ['sɜ:fɪs] ['braɪtnəs] .
express laws of mean surface brightness .
表达 法律 的 意思是 表面 亮度 .

表达平均表面亮度规律。

[ðə; ði][ˈvælju:] , [keɪ] = [faɪv] . - ,
The value , K = 5 : 0 ,
这 价值 , K = 5 : - ,

数值 K = 5.0，

[ɪn][ˈfɔ:mjələ] ([wʌn]) ['ɪndɪkeɪts] [ðæt] [ðə; ði] ['sɜ:fɪs] ['braɪtnəs] [ɪz] ['kɒnstənt] [fɔ:(r); fə(r)] [i:tʃ] ['seprət]
in formula (1) indicates that the surface brightness is constant for each separate
在 公式 (1) 表示 那 这 表面 亮度 是 持续的 为了 每个 分离
[taɪp] .
type .
类型 .

公式（1）表示每种单独类型的表面亮度是恒定的。

[ðə; ði] [ˌverɪˈeɪən] [ɪn][si:] [ˈɪndɪkət] [ə; eɪ] [prəˈɡresɪv] [ˌdɪmɪnˈnjuːʃn] [ɪn][ðə; ði] [ˈsɜːfɪs] [ˈbraɪtnəs]
The variations in C indicate a progressive diminution in the surface brightness
这 变体 在 C 表明 一个 进步 减少 在 这 表面 亮度
[frɒm; frəm] [klɑːs] [tuː; tə] [klɑːs] [θruːˈaʊt] [ðə; ði][ɪnˈtaɪə(r)] [ˈsiːkwəns] .
from class to class throughout the entire sequence .
从 班级 到 班级 自始至终 这 全部的 顺序 .

C 的变化表明，在整个序列中，表面亮度从一个等级逐渐降低。

[ðə; ði] [kənˈsɪstənsɪ] [ɒv; əv][ðə; ði] [rɪˈzʌlts] [ˈæmplɪ] [ˈdʒʌstɪfaɪz][ðə; ði] [ˈsiːkwəns] [æz; əz][ə; eɪ][ˈbeɪsɪs][ɒv; əv]
The consistency of the results amply justifies the sequence as a basis of
这 一致性 的 这 结果 充足的 证明其合理性 这 顺序 作为 一个 基础 的
[ˌklæsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n] ,
classification ,
分类 ,

结果的一致性充分证明了该序列作为分类依据的合理性。

[sɪns] [ə; eɪ] [prəˈɡreɪ(ə)n] [ɪn] [ˈfɪzɪk(ə)l] [dɑːˈmenʃ(ə)nz] { - }
since a progression in physical dimensions { 26 }
自从 一个 进展 在 身体的 方面 { - }

自物理维度发展以来{26}

[ɪz][ˈɪndəˌkeɪtɪd] , [wɪtʃ] [əˈkʌmp(ə)nɪz] [ðə; ði] [prəˈɡreɪ(ə)n] [ɪn] [ˈstrʌktʃərəl] [fɔːm] .
is indicated , which accompanies the progression in structural form .
是 表明的 , 哪个 伴随 这 进展 在 结构 形式 .

这表明，结构形式的演变是必然的。

[ɔːlˈðəʊ] [ðə; ði] [ˌkɔːrəˈleɪʃnz] [duː; də][nɒt] [ˌnesəˈserəli] [ɪˈstæblɪ] [ˈeni][dʒəˈnerɪk][rɪˈleɪʃ(ə)n] [əˈmʌŋ] [ðə; ði]
Although the correlations do not necessarily establish any generic relation among the
虽然 这 相关性 做 不是 一定 建立 任何 通用的 关系 之中 这
[əbˈzɜːvd] [ˈklaːsɪz] ,
observed classes ,
观察到 课程 ,

尽管相关性并不一定能建立观察到的类别之间的任何普遍关系，

[ðeɪ] [səˈpɔːt] [ɪn][ə; eɪ] [ˈveri] [ˈeɪvɪdənt] [ˈmænə(r)][ðə; ði] [haɪˈpɒθəsɪs] [ðæt] [ðə; ði] [ˈveəriəs] [steɪdʒɪz][ɪn][ðə; ði]
they support in a very evident manner the hypothesis that the various stages in the
他们 支持 在 一个 非常 明显 方式 这 假设 那 这 各种各样的 阶段 在 这
[ˈsiːkwəns] [ˌreprɪˈzent] [ˈdɪfrənt] [ˈfeɪzɪz] [ɒv; əv][ə; eɪ][ˈsɪŋɡ(ə)l][ˌfʌndəˈment(ə)l] [taɪp] [ɒv; əv][ˌæstrəˈnɒmɪk(ə)l]
sequence represent different phases of a single fundamental type of astronomical
顺序 代表 不同的 阶段 的 一个 单身的 基本的 类型 的 天文
[ˈbɒdɪ] .
body .
身体 .

它们以非常明显的方式支持了以下假设：序列中的各个阶段代表了单一基本类型天体的不同阶段。

[mɔːrˈəʊvə(r)] , [ðə; ði] [ˈkwɒntɪtətɪv] [ˌveəriˈeɪʃ(ə)n][ɪn][si:] [ɪz] [kənˈsɪstənt] [wɪð] [ðɪs] [ɪnˌtɜːˈpreɪʃ(ə)n] ,
Moreover , the quantitative variation in C is consistent with this interpretation ,
而且 , 这 定量 变化 在 C 是 持续的 和 这 解释 ,

此外，C 的定量变化也与这种解释相符。

[æz; əz][ɪz] [əˈpærənt] [frɒm; frəm][ðə; ði] [ˈfɒləʊɪŋ] [kənˌsɪdəˈreɪʃnz] .
as is apparent from the following considerations .
作为 是 明显 从 这 下列的 考虑因素 .

从以下几点可以看出这一点。

[ˈteɪb(ə)l] [ɪks]
TABLE IX
桌子 第九章

[rɪˈzɪdʒuəlz] [ɪn] [ɛmˈti:] + [faɪv] [lɒg] [di:] [æz; əz] [ə; eɪ] ['fʌŋk(ə)n] [ɒv; əv] [ɔːriənˈteɪ(ə)n]

Residuals	in	mT	+	5	log	d	as	a	Function	of	Orientation
残差	在	公吨	+	5	日志	d	作为	一个	功能	的	方向

mT + 5 log d 残差与方向的关系

[taɪp] [raʊnd] [ɪˈlɪptɪk(ə)l] [edʒ] - [ɒn]

Type	Round	Elliptical	Edge	-	On
类型	圆形的	椭圆形	边缘	-	在

类型：圆形、椭圆形、边缘朝外

[ˈɛs.eɪ] - - . - (-) - - . - (-) +0 . - (-)

Sa	-	0	.	02	(	13	)	-	0	.	27	(	13	)	+0	.	57	(	23	)
萨	-	-	.	-	(	-	)	-	-	.	-	(	-	)	+0	.	-	(	-	)

萨 -0.02 (13) -0.27 (13) +0.57 (23)

[ˈsʌmbədi] . - (-) . - (-) [wʌn] . - (-)

Sb	.	77	(	24	)	.	0	(	35	)	1	.	71	(	11	)
某人	.	-	(	-	)	.	-	(	-	)	1	.	-	(	-	)

Sb .77 (24) .0 (35) 1.71 (11)

[ˌɛsˈsi:] - - . - (-) - - . - (-) +0 . - (-)

Sc	-	0	.	08	(	35	)	-	0	.	13	(	57	)	+0	.	66	(	22	)
Sc	-	-	.	-	(	-	)	-	-	.	-	(	-	)	+0	.	-	(	-	)

Sc -0.08 (35) -0.13 (57) +0.66 (22)

[ɔːl] [es] - - . - (-) - - . - (-) +0 . - (-)

All	S	-	0	.	26	(	72	)	-	0	.	11	(	105	)	+0	.	83	(	56	)
全部	S	-	-	.	-	(	-	)	-	-	.	-	(	-	)	+0	.	-	(	-	)

所有 S -0.26 (72) -0.11 (105) +0.83 (56)

[ˌɛs.biːˈeɪ] - - . - (-) - - . - (['sɛvən]) +0 . - ([eɪt])

SBa	0	.	0	(	10	)	-	0	.	30	(	7	)	+0	.	31	(	8	)
小企业管理局	-	.	-	(	-	)	-	-	.	-	(	7	)	+0	.	-	(	8	)

SBa 0.0 (10) -0.30 (7) +0.31 (8)

[ˌɛs.biːˈbi:] - . - (-) + . - ([sɪks])

SBb	-	.	16	(	10	)	+	.	07	(	6	)
sbb	-	.	-	(	-	)	+	.	-	(	6	)

SBb - .16 (10) + .07 (6)

[ˌɛs.biːˈsi:] +0 . - ([naɪn]) - - . - ([fɔːr]) +0 . - ([tuːtuː])

SBc	+0	.	19	(	9	)	-	0	.	50	(	4	)	+0	.	32	(	2	)
sbc	+0	.	-	(	9	)	-	-	.	-	(	4	)	+0	.	-	(	2	)

SBc +0.19 (9) -0.50 (4) +0.32 (2)

[ɔːl] ['sʌmbədi] +0 . - (-) +0 . - (-) +0 . - (-)

All	SB	+0	.	01	(	29	)	+0	.	21	(	17	)	+0	.	31	(	10	)
全部	SB	+0	.	-	(	-	)	+0	.	-	(	-	)	+0	.	-	(	-	)

所有SB +0.01 (29) +0.21 (17) +0.31 (10)

[ɔːl] ['spairəlz] - - . - (-) - - . - (-) +0 . - (-)

All	spirals	-	0	.	22	(	101	)	-	0	.	13	(	122	)	+0	.	73	(	66	)
全部	螺旋	-	-	.	-	(	-	)	-	-	.	-	(	-	)	+0	.	-	(	-	)

所有螺旋线 -0.22 (101) -0.13 (122) +0.73 (66)

[əˈmʌŋ] [ðə; ði] [ɪˈlɪptɪk(ə)l] ['nebjuːli:] [aɪˈtiː][ɪz] [əbˈzɜːvd] [ðæt] [ðə; ði] ['njuːkliəɪ][ɑː(r); ə(r)] [ʃɑːp] [ænd; ənd]

Among	the	elliptical	nebulae	it	is	observed	that	the	nuclei	are	sharp	and
之中	这	椭圆形	星云	它	是	观察到	那	这	细胞核	是	锋利的	和

[dɪˈstɪŋkt] [ænd; ənd] [ðæt] [ðə; ði] ['kʌlə(r)] [ˌdɪstrɪˈbjuːʃn] [ɪz] ['juːnɪfɔːm] ['əʊvə(r)] [ðə; ði] ['ɪmɪdʒɪz] .

distinct	and	that	the	color	distribution	is	uniform	over	the	images	.
清楚的	和	那	这	颜色	分配	是	制服	超过	这	图片	.

在椭圆星云中，可以观察到星核清晰分明，并且图像上的颜色分布均匀。

[ðɪs] [ˈɪndɪkerts] [ðæt] [ðeə(r)][ɪz][nəʊ] [əˈpriːəb(ə)l] [əbˈzɔːp](ə)n] , [ˈaɪðə(r)][ˈdʒen(ə)rəl][ɔː(r)] [srˈlektɪv] ,
This indicates that there is no appreciable absorption , either general or selective ,
这 表示 那 那里 是 不 值得赞赏 吸收 , 任何一个 一般的 或者 选择性 ,
这表明没有明显的吸收, 无论是普遍吸收还是选择性吸收。

[ænd; ənd] [hens] [ðæt] [ðə; ði][,luːmɪˈnɒsəti][pʊ; əv][ðə; ði][prəˈdʒektɪd] [ˈɪmɪdʒ] [ˌreprɪˈzents] [ðə; ði][ˈtəʊt(ə)l]
and hence that the luminosity of the projected image represents the total
和 因此 那 这 亮度 的 这 预计 图像 代表 这 全部的
[,luːmɪˈnɒsəti][pʊ; əv][ðə; ði][ˈnebjələ] ,
luminosity of the nebula ,
亮度 的 这 星云 ,
因此, 投影图像的亮度代表了星云的总亮度。

[rɪˈɡɑːdləs] [pʊ; əv][ðə; ði][,ɔːrɪənˈteɪ](ə)n] .
regardless of the orientation .
不管 的 这 方向 .
无论方向如何。

[ɪf] [ðə; ði] [əbˈzɜːvd] [ˈklɑːsɪz] [wɜː(r); wə(r)][pʃʊə(r)] , [ðæt] [ɪz] , [ɪf] [ðə; ði] [əˈpærənt] [wɜː(r); wə(r)]
If the observed classes were pure , that is , if the apparent ellipticities were
如果 这 观察到 课程 是 纯的 , 那 是 , 如果 这 明显 椭圆率 是
[ðə; ði][ˈæktʃuəl]
the actual ellipticities ,
这 实际的 椭圆率 ,
如果观测到的类是纯的, 也就是说, 如果表观椭圆率就是实际椭圆率,

[ˈfɔːmjələ] ([wʌn]) [kʊd; kəd][biː; bi] [ˈrɪt(ə)n] ([θriː])
formula (1) could be written (3)
公式 (1) 可以 是 书面 (3)
公式 (1) 可以写成 (3)

[weə(r)] [biː][ɪz][ðə; ði][ˈmaɪnə(r)][daɪˈæmɪtə(r)][ɪn] [ˈmɪnɪts] [pʊ; əv][ɑːk][ænd; ənd][iː][ɪz][ðə; ði] [ɪlɪpˈtɪsəti] .
where b is the minor diameter in minutes of arc and e is the ellipticity .
在哪里 b 是 这 次要的 直径 在 分钟 的 弧 和 e 是 这 椭圆率 .
其中 b 是以角分表示的短轴直径, e 是椭圆率。

[ðə; ði] [tɜːm] [ˌɛmˈtiː] + [faɪv][lɒɡ][biː][ɪz] [əbˈzɜːvd] [tuː; tə][biː; bi] [ˈkɒnstənt] [fɔː(r); fə(r)][ə; eɪ][ˈɡɪv(ə)n] [taɪp] .
The term mT + 5 log b is observed to be constant for a given type .
这 学期 公吨 + 5 日志 b 是 观察到 到 是 持续的 为了 一个 给定 类型 .
对于给定的类型, 项 mT + 5 log b 被观察到是常数。

[ɪf] [ˌaɪˈtiː][wɜː(r); wə(r)] [ˈkɒnstənt] [fɔː(r); fə(r)][ɔːl] [rɪˈlɪptɪk(ə)l] [ˈnebjʊˌliː] ,
If it were constant for all elliptical nebulae ,
如果 它 是 持续的 为了 全部 椭圆形 星云 ,
如果这个值对所有椭圆星云都是恒定的,

[ðen] [ðə; ði] [tɜːm] [ˌsiːˈiː] + [faɪv][lɒɡ] ([wʌn] - [iː]) [wʊd] [biː; bi] [ˈkɒnstənt] [ˈɔːlsəʊ] .
then the term Ce + 5 log (1 - e) would be constant also .
然后 这 学期 塞 + 5 日志 (1 - e) 会 是 持续的 还 .
那么 Ce + 5 log (1 - e) 项也将是常数。

[ʊn] [ðɪs] [əˈsʌmpn] , { - }
On this assumption , { 27 }
在 这 假设 , { - }
基于此假设, {27}

[weə(r)] C0 [ɪz][ðə; ði][ˈvæljuː][pʊ; əv][siː][fɔː(r); fə(r)][ðə; ði][pʃʊə(r)] [klɑːs] E0 .
where C0 is the value of C for the pure class E0 .
在哪里 C0 是 这 价值 的 C 为了 这 纯的 班级 E0 .
其中 C0 是纯类 E0 的 C 值。

[hens] ([fɔ:r])
Hence (4)
因此 (4)

因此 (4)

[ə; eɪ][rɪ'leɪ(ə)n] [wɪtʃ] [kæn; kən][biː; bi] ['testɪd] [baɪ][ðə; ði] [ˌɑːbzər'veɪʃənz] .
a relation which can be tested by the observations .
一个 关系 哪个 能 是 测试 经过 这 观察 .
可以通过观察来检验的关系。

[æŋ; ən][ə'næləsis][pɒv; əv][ðə; ði][mə'tɪəriəl] ['ɪndɪkeɪts] [ðæt] [ðɪs] [ɪz] ['æktʃuəli] [ðə; ði] [keɪs] ,
An analysis of the material indicates that this is actually the case ,
一个 分析 的 这 材料 表示 那 这 是 实际上 这 案件 ;
对材料的分析表明, 情况确实如此。

[ænd; ənd] [hens] [ðæt] [ə'mʌŋ] [ðə; ði][ɪ'liptɪk(ə)l] ['nebjʊ.liː] [ɪn][ˈdʒen(ə)rəl] , [ðə; ði][ˈmaɪnə(r)][dar'æmɪtə(r)]
and hence that among the elliptical nebulae in general , the minor diameter
和 因此 那 之中 这 椭圆形 星云 在 一般的 , 这 次要的 直径
[dɪ'tɜːmɪnz] [ðə; ði][ˈtəʊt(ə)l][ˌluːmɪ'nɒsəti] ,
determines the total luminosity ,
决定 这 全部的 亮度 ,
因此, 在椭圆星云中, 短轴直径决定了总光度。

[æt; ət] [liːst] [tuː; tə][ə; eɪ][fɜːst] [əˌprɒksɪ'meɪʃn] . -
at least to a first approximation . 18
在 至少 到 一个 第一的 近似 . -
至少在第一近似下是这样。18

[ðə; ði] [əb'zɜːvd] ['væljuːz][pɒv; əv][siː] ['veəri] [wɪð] [ðə; ði] [klaːs] ,
The observed values of C vary with the class ,
这 观察到 值 的 C 各不相同 和 这 班级 ,
C 的观测值随类别而异,

[æz; əz][ɪz] [siːn] [ɪn][ˈteɪb(ə)l][sevn][ænd; ənd] [ˈfɪɡə(r)] [sɪks] , [bʌt; bət] , [ɪk'septɪŋ] [ðæt] [fɔː(r); fə(r)] E7 ,
as is seen in Table VII and Figure 6 , but , excepting that for E7 ,
作为 是 已见 在 桌子 七 和 数字 6 , 但 , 除外 那 为了 E7 ,
如表 VII 和图 6 所示, 但 E7 除外,

[ðeɪ] [ɑː(r); ə(r)] [tuː] [lɑːdʒ] [brɪ'kæz; brɪ'kɒz][pɒv; əv][ðə; ði][ˈmɪkstʃə(r)][pɒv; əv][ˈleɪtə(r)] [taɪps] [pɒv; əv] ['nebjʊ.liː]
they are too large because of the mixture of later types of nebulae
他们 是 也 大的 因为 的 这 混合物 的 之后 类型 的 星云
[ə'mʌŋ] [ðəʊz] [pɒv; əv][ə; eɪ][ˈɡɪv(ə)n] [əb'zɜːvd] [klaːs] .
among those of a given observed class .
之中 那些 的 一个 给定 观察到 班级 .
由于在特定观测类别的星云中混入了后来出现的星云类型, 所以它们的体积过大。

[ˌaɪ 'tiː][ɪz][ˈpɒsəb(ə)l] , [haʊ'evə(r)] ,
It is possible , however ,
它 是 可能的 , 然而 ,
然而, 这是有可能的。

[tuː; tə][ˈkælkjuleɪt][ðə; ði][ˈvæljuːz][pɒv; əv][siː 'iː - C0 [fɔː(r); fə(r)][ðə; ði][pʃʊə(r)] ['klaːsɪz] [ænd; ənd] [ðen] [tuː; tə]
to calculate the values of Ce - C0 for the pure classes and then to
到 计算 这 值 的 塞 - C0 为了 这 纯的 课程 和 然后 到
[meɪk] [əˌprɒksɪmət] [kə'rekʃnz] [fɔː(r); fə(r)][ðə; ði] [əb'zɜːvd] ['mɪkstʃə] [pɒn][ðə; ði] [ə'sʌmpʃn] [ðæt]
make approximate corrections for the observed mixtures on the assumption that
制作 近似 更正 为了 这 观察到 混合物 在 这 假设 那
[ðə; ði] ['nebjʊ.liː] [pɒv; əv][ˈeni] [ˈɡɪv(ə)n][ˈæktʃuəl] [ɪlɪp'tɪsəti] [ɑː(r); ə(r)] [ˈɔːrientɪd] [æt; ət][ˈrændəm] .
the nebulae of any given actual ellipticity are oriented at random .
这 星云 的 任何 给定 实际的 椭圆率 是 定向 在 随机的 .
计算纯星云的 Ce - C0 值, 然后假设任何给定实际椭圆率的星云都是随机取向的, 对观测到的混合物进行近似修正。

[ɪn] [ðɪs] ['mæənə(r)] , [mi:n] [θɪə'retɪk(ə)l] ['vælju:z][kæn; kən][bi:; bi] [kəm'peəd] [wɪð] [ðə; ði] [əb'zɜ:vð] ['vælju:z]
In this manner , mean theoretical values can be compared with the observed values
在 这 方式 , 意思是 理论 值 能 是 比较的 和 这 观察到 值
.
:
.

通过这种方式，可以将平均理论值与观测值进行比较。

[ðə; ði] [kəm'pærəsnz] [ɑ:(r); ə(r)] [jəʊn] [ɪn]['teɪb(ə)l][,ɛks,ɑɪ'aɪ][ɪn][ðə; ði] [fɔ:m] C7 - [si: 'i:] ,
The comparisons are shown in Table XII in the form C7 - Ce ,
这 比较 是 所示 在 桌子 十二 在 这 形式 C7 - 塞 ,
表十二中以 C7 - Ce 的形式列出了比较结果，

[brɪ'kæz; brɪ'kɒz] E7 [ɪz][ðə; ði]['əʊnli] [əb'zɜ:vð] [klɑ:s] [ðæt][kæn; kən][bi:; bi] [kən'sɪdəd] [æz; əz][pjuə(r)] .
because E7 is the only observed class that can be considered as pure .
因为 E7 是 这 仅有的 观察到 班级 那 能 是 经过考虑的 作为 纯的 .
因为 E7 是唯一被观察到的可以被认为是纯类的类。

[ðə; ði] [sɪg'nɪfɪkəns] [ɒv; əv][ðə; ði]['teɪb(ə)l] [wɪl] [bi:; bi] [dɪ'skʌst] ['leɪtə(r)] .
The significance of the table will be discussed later .
这 意义 的 这 桌子 将要 是 讨论 之后 .
该表格的意义将在后文讨论。

[ðə; ði] ['fɒləʊɪŋ] ['meθəd] [hæz; həz] [bi:n] [ju:st] [tu:; tə] [dɪ'tɜ:mɪn] [ðə; ði] ['relatɪv] ['fɪkwənsɪz] [wɪð]
The following method has been used to determine the relative frequencies with
这 下列的 方法 有 到过 用过的 到 决定 这 相对的 频率 和
[wɪtʃ] ['nebjʊ,li:] [ɒv; əv][ə; eɪ]['grɪv(ə)n]['æktʃuəl] [ɪlɪp'tɪsətɪ] ,
which nebulae of a given actual ellipticity ,
哪个 星云 的 一个 给定 实际的 椭圆率 ,
以下方法已被用于确定具有给定实际椭圆率的星云的相对频率：

[ɔ:rientɪd] [æt; ət]['rændəm] , [wɪl] [bi:; bi] [əb'zɜ:vð] [æz; əz] ['hævɪŋ] ['veəriəs] [ə'pærənt]
oriented at random , will be observed as having various apparent ellipticities .
定向 在 随机的 , 将要 是 观察到 作为 拥有 各种各样的 明显 椭圆率 .
随机取向的物体，会被观察到具有各种不同的表现椭圆率。

[ɪn] ['fɪgə(r)] [eɪt] , [let][ðə; ði][,si: 'əʊ - [ɔ:dɪnət] ['æksɪ:z][pɒks][ænd; ænd] [ɔɪ] [kəʊɪn'saɪd] [wɪð] [ðə; ði]['meɪdʒə(r)]
In Figure 8 , let the co - ordinate axes OX and OY coincide with the major
在 数字 8 , 让 这 合作 - 纵坐标 轴 牛 和 oy 重合 和 这 主要的
[ænd; ænd]['maɪnə(r)]['æksɪ:z] ,
and minor axes ,
和 次要的 轴 ,
在图 8 中，令坐标轴 OX 和 OY 与长轴和短轴重合，

[ə; eɪ][ænd; ænd][bi:] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [mə'rɪdiən] ['sekʃ(ə)n][ɒv; əv][æn; ən] [ɪ'lɪpsɔɪd] [ɒv; əv] [revə'lu:ʃn] .
a and b , of a meridian section of an ellipsoid of revolution .
一个 和 b , 的 一个 子午线 部分 的 一个 椭球体 的 革命 .
a 和 b，旋转椭球体的子午面截面。

[let] [,u'ɜ:r] ' [bi:; bi][ðə; ði][laɪn][ɒv; əv] [saɪt] [tu:; tə][ðə; ði][əb'zɜ:və(r)] , ['meɪkɪŋ] [æn; ən][f'æŋg(ə)l][aɪ] [wɪð] [pɒks]
Let OO' , be the line of sight to the observer , making an angle i with OX
让 OO' , 是 这 线 的 视线 到 这 观察员 , 制作 一个 角度 我 和 牛
,
:
,

设 OO' 为观察者的视线，与 OX 成 θ 角，

[ænd; ænd][let][ɔ:(r)][bi:; bi][,pɜ:pən'dɪkjələ(r)][tu:; tə][,u'ɜ:r] ' .
and let OR be perpendicular to OO' .
和 让 或者 是 垂直 到 OO' .
并设 OR 垂直于 OO'。

[let] [pi: 'pi:] ' [bi:; bi][ə; eɪ] { - }
Let PP ' be a { 28 }
让 PP ' 是 一个 { - }

令 PP' 为 a{28}

[tændʒənt][tu:; tə][ðə; ði] [ɪ'lips] ,
tangent to the ellipse ,
切线 到 这 椭圆 ,

与椭圆相切的线段

[pærəlel][tu:; tə][ænd; ənd][æt; ət][ə; eɪ] ['distəns] [frɒm; frəm][u'ɜ:r] ' . [let] x0 [ænd; ənd] y0 [bi:; bi][ðə; ði]
parallel to and at a distance from OO ' . Let x0 and y0 be the
平行线 到 和 在 一个 距离 从 OO ' . 让 x0 和 y0 是 这
[,intə'sept] [ɒv; əv][ðə; ði][tændʒənt][ɒn][ðə; ði][eks] - [ænd; ənd][waɪ] - ['æksɪs] ,
intercepts of the tangent on the X - and Y - axis ,
拦截 的 这 切线 在 这 X - 和 是 - 轴 ,
与 OO' 平行且距离相等的直线, 设 x0 和 y0 分别为切线在 X 轴和 Y 轴上的截距。

[rɪ'spektɪvli] .
respectively .
分别 .

分别。

[ðə; ði] [ə'pærənt] [ɪlɪp'tɪsəti] [ɪz] [dɪ'tɜ:mɪnd] [baɪ][bi:'eks] , [wɪt] , [fɜ:(r); fə(r)] ['veəriəs] ['vælju:z][ɒv; əv]
The apparent ellipticity is determined by bx , which , for various values of
这 明显 椭圆率 是 决定 经过 bx , 哪个 , 为了 各种各样的 值 的
[ðə; ði][t'æŋg(ə)l][ai] ,
the angle i ,
这 角度 我 ,
表观椭圆率由 bx 决定, 对于角度 i 的不同值,

[reɪndʒɪz][frɒm; frəm][bi:][tu:; tə][ə; eɪ] . [ðə; ði] ['prɒbləm] [ɪz][tu:; tə] [dɪ'tɜ:mɪn] [ðə; ði] ['relatɪv] ['eəriəz][ɒn]
ranges from b to a . The problem is to determine the relative areas on
范围 从 b 到 一个 . 这 问题 是 到 决定 这 相对的 区域 在
[ðə; ði] ['sɜ:fɪs] [ɒv; əv][ə; eɪ] [sfɪə(r)] [hu:z] ['sentə(r)][ɪz][əʊ] ,
the surface of a sphere whose center is O ,
这 表面 的 一个 领域 谁 中心 是 哦 ,
范围从 b 到 a。 问题是确定以 O 为中心、球面上各元素的相对面积。

[wɪ'ðɪn] [wɪt] [ðə; ði]['reɪdiəs] [ɔɪ] [mʌst; məst] [pa:s] [ɪn][t'ɜ:də(r)] [ðæt] [ðə; ði]['vælju:z][ɒv; əv] b1 ,
within which the radius OY must pass in order that the values of b1 ,
之内 哪个 这 半径 oy 必须 经过 在 命令 那 这 值 的 b1 ,
其中半径 OY 必须穿过的区域, 使得 b1 的值,
[ænd; ənd] [hens] [ɒv; əv][ðə; ði] [ə'pærənt] [ɪlɪp'tɪsəti] , e1 [meɪ] [fɜ:l] [wɪ'ðɪn] ['sɜ:t(ə)n] ['deɪzɪneɪtɪd] ['lɪmɪts] .
and hence of the apparent ellipticity , e1 may fall within certain designated limits .
和 因此 的 这 明显 椭圆率 , e1 可能 落下 之内 肯定 指定的 限制 .

因此, 对于表观椭圆率 e1, 可以落在某些指定的限度内。

[ðɪs] [rɪ'kwaɪəz] [ðæt] [ðə; ði]['æŋg(ə)l][ai][bi:; bi] [ɪk'sprest] [ɪn] [tɜ:mz] [ɒv; əv] b1 .
This requires that the angle i be expressed in terms of b1 .
这 需要 那 这 角度 我 是 表达 在 条款 的 b1 .
这就要求用 b1 表示角度 i。

[fɪg] . [eɪt]
Fig . 8
如图 . 8

图 8

[frɒm; frəm][ðə; ði][ɪ'kweɪz(ə)n][ɒv; əv][ðə; ði][tændʒənt] , [pi: 'pi:] ' ,
From the equation of the tangent , PP ' ,
从 这 方程 的 这 切线 , PP ' ,
由切线方程 PP' 可得,

[sɪns]
Since
自从

自从

[let] [ə; eɪ] = [wʌn] , [ðen]
Let a = 1 , then
让 一个 = 1 , 然后

令 a = 1，则

[weə(r)]
where
在哪里

在哪里

[frɒm; frəm] [ði:z] [ɪ'kweɪʒnz] , [ðə; ði][ˈvælju:z][pʊv; əv][ai][kæn; kən][bi:; bi] [dɪ'tɜ:mɪnd] [fɔ:(r); fə(r)][ɔ:l]
From these equations , the values of i can be determined for all
从 这些 方程式 , 这 值 的 我 能 是 决定 为了 全部
[ˈpɒsəb(ə)l][ˈvælju:z][pʊv; əv] e1 .
possible values of e1 .
可能的 值 的 e1 .

通过这些方程，可以确定 e1 的所有可能值对应的 i 值。

[ðə; ði][ˈlɪmɪts][fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði] [əb'zɜ:vɪd] ['klɑ:sɪz] E0 [tu:; tə] E7 [wɜ:(r); wə(r)] [ˈtʃəʊzn] [ˌmɪd'weɪ] [bɪ'twi:n]
The limits for the observed classes E0 to E7 were chosen midway between
这 限制 为了 这 观察到 课程 E0 到 E7 是 选定 中途 之间
[ðə; ði] [kən'sekjətɪv] [tenθs] ,
the consecutive tenths ,
这 连续的 十分之一 ,

观测类别 E0 至 E7 的界限选择在相邻十分位的中间位置。

E0 [ˈreɪndʒɪŋ] { - }
E0 ranging { 29 }
E0 范围 { - }

E0 范围{29}

[frɒm; frəm][i:] = - [tu:; tə][i:] = - . - ; E1 , [frɒm; frəm][i:] = - . - [tu:; tə][i:] = - . - ;
from e = 0 to e = 0 . 05 ; E1 , from e = 0 . 05 to e = 0 . 15 ;
从 e = - 到 e = - . - ; E1 , 从 e = - . - 到 e = - . - ;
从 e = 0 到 e = 0.05；E1，从 e = 0.05 到 e = 0.15；

E7 , [frɒm; frəm][i:] = - . - [tu:; tə][i:] = - . - .
E7 , from e = 0 . 65 to e = 0 . 75 .
E7 , 从 e = - . - 到 e = - . - .

E7，从 e = 0.65 到 e = 0.75。

[ðə; ði] ['relatɪv] ['fɪkwənsɪz] [pʊv; əv][ðə; ði] ['veəriəs] [əb'zɜ:vɪd] ['klɑ:sɪz] [ɑ:(r); ə(r)] [ðen] [prə'pɔ:ʃən(ə)l]
The relative frequencies of the various observed classes are then proportional
这 相对的 频率 的 这 各种各样的 观察到 课程 是 然后 比例
[tu:; tə][ðə; ði] ['dɪfərənsɪz] [ɪn][sɪn][ai] [kɒrə'spɒndɪŋ] [tu:; tə][ðə; ði] [tu:] ['lɪmɪtɪŋ] [ˈvælju:z][pʊv; əv] e1 .
to the differences in sin i corresponding to the two limiting values of e1 .
到 这 差异 在 罪 我 相应的 到 这 二 限制 值 的 e1 .

各个观察到的类别的相对频率与对应于 e1 的两个极限值的 sin i 的差异成正比。

[ði:z] ['fɪkwənsɪz] [mʌst; məst][bi:; bi]['kælkjuleɪtrɪd] ['seprətli] [fɔ:(r); fə(r)] ['nebjʊ.li:] [pʊv; əv] ['dɪfrənt]
These frequencies must be calculated separately for nebulae of different
这些 频率 必须 是 计算 分别地 为了 星云 的 不同的
[ˈæktʃuəl]
actual ellipticities .
实际的 椭圆率 .

对于不同实际椭率的星云，必须分别计算这些频率。

[ðə; ði] [rɪˈzʌlts] [ɑ:(r); ə(r)][ˈɡɪv(ə)n][ɪn][ˈteɪb(ə)l][eks] , [weə(r)] [ðə; ði][ˈæktʃuəl] , [ˈlɪstɪd] [ɪn][ðə; ði]
The results are given in Table X , where the actual ellipticities , listed in the
这 结果 是 给定 在 桌子 X , 在哪里 这 实际的 椭圆率 , 列出 在 这
[fɜ:st] [ˈkɒləm] ,
first column ,
第一的 柱子 ,

结果如表 X 所示，其中第一列列出了实际椭圆率，

[ɑ:(r); ə(r)] [ˈfɒləʊd] [əˈkrɒs] [ðə; ði][ˈteɪb(ə)l][baɪ][ðə; ði] [pəˈsentɪdʒɪz] [wɪt] , [ɒn][ðə; ði] [əˈsʌmpʃn] [ɒv; əv]
are followed across the table by the percentages which , on the assumption of
是 随后 穿过 这 桌子 经过 这 百分比 哪个 , 在 这 假设 的
[ˈrændəm][ˌɔ:riənˈteɪ](ə)n] ,
random orientation ,
随机的 方向 ,

表格中接下来列出的是百分比，假设方向随机，

[wɪl] [bi:; bi] [əbˈzɜ:vɪd] [æz; əz] [ˈhævɪŋ] [ðə; ði] [ˈveəriəs] [əˈpærənt] .
will be observed as having the various apparent ellipticities .
将要 是 观察到 作为 拥有 这 各种各样的 明显 椭圆率 .

将会观察到它们具有各种不同的表观椭圆率。

[ðə; ði] [ˈbɒtəm] [rəʊ] [wɪl] [bi:; bi] [si:n] [tu:; tə] [fəʊ] [ðə; ði] [pəˈsentɪdʒɪz] [ɒv; əv] [əˈpærənt]
The bottom row will be seen to show the percentages of apparent ellipticities
这 底部 排 将要 是 已见 到 展示 这 百分比 的 明显 椭圆率
[əbˈzɜ:vɪd] [ɪn][æn; ən] [əˈsembli] [ɒv; əv] [ˈnebjʊ,li:] [ɪn] [wɪt] [ðə; ði] [ˈnʌmbəz] [fɔ:(r); fə(r)] [i:tʃ] [ˈæktʃuəl]
observed in an assembly of nebulae in which the numbers for each actual
观察到 在 一个 集会 的 星云 在 哪个 这 数字 为了 每个 实际的
[ɪlɪpˈtɪsəti] [ɑ:(r); ə(r)][ˈi:kwəl][ænd; ənd][ɔ:l][ɑ:(r); ə(r)] [ˈɔ:rientɪd] [æt; ət][ˈrændəm] .
ellipticity are equal and all are oriented at random .
椭圆率 是 平等的 和 全部 是 定向 在 随机的 .

底行将显示在星云集合中观测到的视椭圆率百分比，其中每个实际椭圆率的数值相等，并且所有星云的方向都是随机的。

[ˈteɪb(ə)l][eks]
TABLE X
桌子 X

表 X

[ˈæktʃuəl] [əˈpærənt]
Actual Apparent
实际的 明显

实际表观

E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 [ˈtəʊt(ə)l]
E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Total
E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 全部的

E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 总计

E7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

E7 0.055 0.111 0.114 0.116 0.121 0.132 0.164 0.187 1.0006 .059 .123 .126 .133 .148 .187 0.2245 .067 .140 .148 .166
.216 0.2634 .079 .169 .190 .250 0.3123 .100 .225 .299 0.3762 .145 .378 0.4771 0.300 0.7000 1.000

[ˈtəʊt(ə)l][wʌŋ] .	-	[wʌŋ] .	-	[wʌŋ] .	-	[wʌŋ] .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[eit] .	-	-	
Total	1	. 805	1	. 846	1	. 354	1	. 041	0	. 797	0	. 582	0	. 388	0	. 187	8	. 0000	. 226
全部的	1	.	1	.	1	.	1	.	-	-	-	-	-	-	-	-	8	.	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

[frɒm; frəm] [ðɪs] [ˈteɪb(ə)l][ænd; ənd][ðə; ði][ˈæktʃuəl] [ˈnʌmbəz] [ɪn][ðə; ði] [əbˈzɜːvd] [ˈklɑːsɪz] [æz; əz] [riːd]
From this table and the actual numbers in the observed classes as read
从 这 桌子 和 这 实际的 数字 在 这 观察到 课程 作为 读
[frɒm; frəm][ə; eɪ] [smuːðd] [kɜːv] ,
from a smoothed curve ,
从 一个 平滑 曲线 ,

根据这张表格以及从平滑曲线读取的观测类别中的实际数字，

[ðə; ði] [ˈnʌmbəz] [ɒv; əv] [iːtʃ] [ˈæktʃuəl] [ɪlɪpˈtɪsəti] [ˈmɪŋɡld] [ɪn][ðə; ði] [əbˈzɜːvd] [ˈklɑːsɪz] [kæn; kən][biː; bi]
the numbers of each actual ellipticity mingled in the observed classes can be
这 数字 的 每个 实际的 椭圆率 混合 在 这 观察到 课程 能 是
[dɪˈtɜːmɪnd] .
determined .
决定 .

可以确定观测类别中混杂的每种实际椭圆率的数量。

[fɔː(r); fə(r)] [ˈɪnstəns] , [ðə; ði][fɔː(r)] [ˈnebʊˌliː] [əbˈzɜːvd] [æz; əz] E7 [ˌreprɪˈzent] - . - [ɒv; əv][ðə; ði][ˈtəʊt(ə)l]
For instance , the four nebulae observed as E7 represent 0 . 187 of the total
为了 实例 , 这 四 星云 观察到 作为 E7 代表 - . - 的 这 全部的
[ˈnʌmbə(r)][ɒv; əv][ˈæktʃuəl] E7 .
number of actual E7 .
数字 的 实际的 E7 .

例如，观测到的四个 E7 星云仅占实际 E7 星云总数的 0.187。

[ðə; ði][ˈʌðə(r)z][ɑː(r); ə(r)][dɪˈstrɪbjuːtɪd; ˈdɪstrɪbjuːtɪd] [əˈmʌŋ] [ðə; ði] [əbˈzɜːvd] [ˈklɑːsɪz] E0 [tuː; tə] E6
The others are distributed among the observed classes E0 to E6
这 其他的 是 分布式 之中 这 观察到 课程 E0 到 E6
[əˈkɔːdɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði] [pəˈsentɪdʒɪz] [ˈlɪstɪd] [ɪn][ˈteɪb(ə)l][eks] . [sɪks] [ˈnebʊˌliː] [ɑː(r); ə(r)] [əbˈzɜːvd] [æz; əz]
according to the percentages listed in Table X . Six nebulae are observed as
根据 到 这 百分比 列出 在 桌子 X . 六 星云 是 观察到 作为
E6 ,
E6 ,
E6 ,

其余星云则根据表 X 中列出的百分比分布在观测到的 E0 至 E6 类星体中。有六个星云被观测为 E6 类星体。

[bʌt; bət][θriː] . [sɪks][ɒv; əv] [ðiːz] [ɑː(r); ə(r)][ˈæktʃuəli] E7 .
but 3 . 6 of these are actually E7 .
但 3 . 6 的 这些 是 实际上 E7 .

但其中 3.6% 实际上是 E7。

[ðə; ði] [rɪˈmeɪnɪŋ] [tuːˈtuː] . [fɔːr][ˈæktʃuəl] E6 [ˈnebʊˌliː] [ˌreprɪˈzent] - . - [ɒv; əv][ðə; ði][ˈtəʊt(ə)l][ˈnʌmbə(r)]
The remaining 2 . 4 actual E6 nebulae represent 0 . 224 of the total number
这 其余的 2 . 4 实际的 E6 星云 代表 - . - 的 这 全部的 数字
[ɒv; əv] [ðæt] [ˈæktʃuəl] [ɪlɪpˈtɪsəti] ,
of that actual ellipticity ,
的 那 实际的 椭圆率 ,

剩余的 2.4 个实际 E6 星云占实际椭圆率总数的 0.224，

[ðə; ði][ˈʌðə(r)z] , [æz; əz][brɪˈfɔː(r)] , [ˈbiːɪŋ] [ˈskætəd] [əˈmʌŋ] [ðə; ði] [əbˈzɜːvd] [ˈklɑːsɪz] E0 [tuː; tə] E5 .
the others , as before , being scattered among the observed classes E0 to E5 .
这 其他的 , 作为 前 , 存在 疏散 之中 这 观察到 课程 E0 到 E5 .

其余的，和以前一样，分散在观察到的 E0 到 E5 类中。

[ˈteɪb(ə)l][sɑː; zɑː; ksɑː; gzɑː] [ɡɪvz] [ðə; ði] [kəmˈpliːt] [əˈnæləsɪs][ænd; ənd][ɪz][ˈsɪmələ(r)][tuː; tə][ˈteɪb(ə)l][eks]
Table XI gives the complete analysis and is similar to Table X
桌子 十一 给予 这 完全的 分析 和 是 相似的 到 桌子 X
[ɪkˈsept] [ðæt] [ðə; ði] [pəˈsentɪdʒɪz] [ɪn][ðə; ði][ˈlætə(r)][ɑː(r); ə(r)] [rɪˈpleɪsd] [baɪ][ðə; ði][ˈæktʃuəl] [ˈnʌmbəz]
except that the percentages in the latter are replaced by the actual numbers
除了 那 这 百分比 在 这 后者 是 替换 经过 这 实际的 数字
[ˈɪndəˌkeɪtɪd][baɪ][ðə; ði][ɑːbzərˈveɪʃənz] . { - }
indicated by the observations . { 30 }
表明的 经过 这 观察 . { - }

表 XI 给出了完整的分析，与表 X 类似，只是表 X 中的百分比被观测值所指示的实际数字所取代。{30}
[ˈfaɪnəli] ,
Finally ,
最后 ,
最后 ,

[ðə; ði] [miːn] [ˈvæljuːz][pʊ; əv] C7 - [ˌsiː ˈiː][ɑː(r); ə(r)][ˈkælkjuleɪtɪd][frɒm; frəm][ðə; ði] [ˈnʌmbəz] [pʊ; əv] [ˈnebʊˌliː]
the mean values of C7 - Ce are calculated from the numbers of nebulae
这 意思是 值 的 C7 - 塞 是 计算 从 这 数字 的 星云
[ɪn][ðə; ði] [ˈveəriəs] [ˈkɒləms] [pʊ; əv][ˈteɪb(ə)l][sɑː; zɑː; ksɑː; gzɑː][təˈgeðə(r)] [wɪð] [ðə; ði][ˈvæljuːz][pʊ; əv] C7 -
in the various columns of Table XI together with the values of C7 -
在 这 各种各样的 列 的 桌子 十一 一起 和 这 值 的 C7 -
[ˌsiː ˈiː][fɔː(r); fə(r)][ðə; ði][pʊʊə(r)] [ˈklɑːsɪz] [æz; əz] [dɪˈraɪvd] [frɒm; frəm] [ˈfɔːmjələ] ([fɔːr]) .
Ce for the pure classes as derived from formula (4) .
塞 为了 这 纯的 课程 作为 衍生的 从 公式 (4) .

C7 - Ce 的平均值是根据表 XI 各列中的星云数量以及根据公式 (4) 得出的纯类 C7 - Ce 的值计算得出的。
[ðə; ði] [rɪˈzʌlts] [ɑː(r); ə(r)] [ˈlɪstɪd] [ɪn][ðə; ði] [fɔːθ] [ˈkɒləm] [pʊ; əv][ˈteɪb(ə)l][ˌeksɑːrˈaɪ] [ˈfɒləʊɪŋ] [ðəʊz]
The results are listed in the fourth column of Table XII following those
这 结果 是 列出 在 这 第四 柱子 的 桌子 十二 下列的 那些
[fɔː(r); fə(r)][ðə; ði][pʊʊə(r)][ænd; ənd][ðə; ði] [əbˈzɜːvd] [ˈklɑːsɪz] .
for the pure and the observed classes .
为了 这 纯的 和 这 观察到 课程 .

结果列于表十二的第四列，紧随纯类和观察类的结果之后。
[ɪn] [dɪˈtɜːmɪnɪŋ] [ðə; ði] [əbˈzɜːvd] [ˈvæljuːz] , [en] . [dʒiː] . [siː] . - [ænd; ənd] - [ɑː(r); ə(r)][ɪnˈkluːdɪd]
In determining the observed values , N . G . C . 524 and 3998 are included
在 确定 这 观察到 值 , N . G . C . - 和 - 是 包括
[æz; əz] E0 [ænd; ənd] E1 ,
as E0 and E1 ,
作为 E0 和 E1 ,

在确定观测值时，NGC 524 和 3998 分别被计为 E0 和 E1。
[ɔːlˈðəʊ] [ɪn][ˈteɪb(ə)l][aɪ] [ðeɪ] [ɑː(r); ə(r)] [ˈlɪstɪd] [æz; əz][pɪˈkjuːliə(r)] ,
although in Table I they are listed as peculiar ,
虽然 在 桌子 我 他们 是 列出 作为 奇特 ,
虽然在表一中它们被列为特殊情况，

[brɪˈkæz; brɪˈkɒz] [ðeɪ] [ɑː(r); ə(r)] [ˈɒbvɪəsli] [mʌt] [ˈflætnd] [ˈnebʊˌliː] [huːz] [ˈmaɪnə(r)][ˈæksiːz][ɑː(r); ə(r)]
because they are obviously much flattened nebulae whose minor axes are
因为 他们是 明显地 很多 扁平的 星云 谁 次要的 轴 是
[kləʊz][tuː; tə][ðə; ði][laɪn][pʊ; əv] [saɪt] .
close to the line of sight .
关闭 到 这 线 的 视线 .

因为它们显然是非常扁平的星云，其短轴接近视线方向。
[ˈteɪb(ə)l][sɑː; zɑː; ksɑː; gzɑː]
TABLE XI
桌子 十一
表十一

[ˈæktʃuəl] [əˈpærənt]
Actual Apparent
实际的 明显

实际表现

E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	[ˈtəʊt(ə)l]																						
E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	Total																						
E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	全部的																						
E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 总计																														
E7 [wʌn] . [tu:ˈtu:][tu:ˈtu:] . [fɔ:r][tu:ˈtu:] . [faɪv][tu:ˈtu:] . [faɪv][tu:ˈtu:] . [sɪks][tu:ˈtu:] . [naɪn][θri:] . [sɪks][fɔ:r] . -																														
E7	1	.	2	2	.	4	2	.	5	2	.	5	2	.	6	2	.	9	3	.	6	4	.	0						
E7	1	.	2	2	.	4	2	.	5	2	.	5	2	.	6	2	.	9	3	.	6	4	.	-						
-	.	-	-	.	[sɪks][wʌn]	.	[θri:][wʌn]	.	[fɔ:r][wʌn]	.	[faɪv][wʌn]	.	[sɪks][tu:ˈtu:]	.	-	[tu:ˈtu:]	.	[fɔ:r]	-	.	-	.	-	[eit][wʌn]						
21	.	76	0	.	6	1	.	3	1	.	4	1	.	5	1	.	6	2	.	0	2	.	4	10	.	85	.	8	1	
-	.	-	-	.	6	1	.	3	1	.	4	1	.	5	1	.	6	2	.	-	2	.	4	-	.	-	.	8	1	
.	[ˈseɪvən][wʌn]	.	[eit][tu:ˈtu:]	.	-	[tu:ˈtu:]	.	[ˈseɪvən][θri:]	.	[wʌn]	-	.	-	.	[eit][wʌn]	.	[ˈseɪvən][wʌn]	.	[naɪn][tu:ˈtu:]	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	7	1	.	8	2	.	0	2	.	7	3	.	1	12	.	14	.	8	1	.	7	1	.	9	2	.	.	.	.	
.	7	1	.	8	2	.	-	2	.	7	3	.	1	-	.	-	.	8	1	.	7	1	.	9	2	.	.	.	.	.
[faɪv][θri:]	.	[wʌn]	-	.	-	.	[naɪn][tu:ˈtu:]	.	[wʌn][tu:ˈtu:]	.	[eit][θri:]	.	[faɪv][naɪn]	.	-	[wʌn]	.	[wʌn][tu:ˈtu:]	.	[naɪn]	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
5	3	.	1	10	.	03	.	9	2	.	1	2	.	8	3	.	5	9	.	32	1	.	1	2	.	9	.	.	.	
5	3	.	1	-	.	-	.	9	2	.	1	2	.	8	3	.	5	9	.	-	1	.	1	2	.	9	.	.	.	.
[θri:]	.	[sɪks][ˈseɪvən]	.	-	[wʌn]	.	[ˈseɪvən][θri:]	.	[naɪn][faɪv]	.	-	[naɪn]	.	[naɪn][naɪn]	.	[naɪn]	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	6	7	.	61	1	.	7	3	.	9	5	.	60	9	.	9	9	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3	.	6	7	.	-	1	.	7	3	.	9	5	.	-	9	.	9	9	.	9	.	9	.	9	.	9	.	9	.	9
E7	1.2	2.4	2.5	2.5	2.6	2.9	3.6	4.0	21.76	0.6	1.3	1.4	1.5	1.6	2.0	2.4	10.85	.8	1.7	1.8	2.0	2.7	3.1	12.14	.8	1.7	1.9	2.5	3.1	
	10.03	.9	2.1	2.8	3.5	9.32	1.1	2.9	3.6	7.61	1.7	3.9	5.60	9.9	9.9															

[təʊt(ə)]	*	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	[eit]	.	-	[sɪks]	.	-	[fɔ:r]	.	-	.	-	.	.	.
Total	*	17	.	0	16	.	0	14	.	0	12	.	0	10	.	0	8	.	0	6	.	0	4	.	0	87	.	0
全部的	*	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	8	.	-	6	.	-	4	.	-	-	.	-	.	-
总计*															17.0	16.0	14.0	12.0	10.0	8.0	6.0	4.0	87.0					

* [ðə; ði][tˈəʊtəlz] [ˌreprɪˈzent] [ðə; ði] [ˈnʌmbəz] [ɪn][ðə; ði] [əbˈzɜ:vɪd] [ˈklɑ:sɪz] [æz; əz] [ri:d] [frɒm; frəm][ə; eɪ]
* **The totals represent the numbers in the observed classes as read from a**
* 这 总计 代表 这 数字 在 这 观察到 课程 作为 读 从 一个
[smu:ð] [kɜ:v] .
smooth curve .
光滑的 曲线 .

* 总数代表从平滑曲线读取的观察类别中的数字。

[ðə; ði] [əbˈzɜ:vɪd] [ˈvælju:z][ɪn][ˈdʒen(ə)rəl][fɔ:l] [brɪˈtwi:n] [ðəʊz] [fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði][pjʊə(r)] [ˈklɑ:sɪz] [ænd; ənd]
The observed values in general fall between those for the pure classes and
这 观察到 值 在 一般的 落下 之间 那些 为了 这 纯的 课程 和
[ðəʊz] [ˌkɒrəˈspɒndɪŋ] [tu:; tə][ˈrændəm][ˌɔ:riənˈteɪ(ə)n] .
those corresponding to random orientation .
那些 相应的 到 随机的 方向 .

观测值总体上介于纯类的值和随机取向的值之间。

[ðeɪ] [ɑ:(r); ə(r)][ɒv; əv][ðə; ði] [seɪm] [ˈɔ:də(r)][æz; əz][ðə; ði][ˈlætə(r)] ,
They are of the same order as the latter ,
他们 是 的 这 相同的 命令 作为 这 后者 ,
它们与后者属于同一等级。

[ænd; ənd][ðə; ði] [dɪˈskrepənsɪ] [ɑ:(r); ə(r)] [pəˈhæps] [nɒt] [ˌʌnəˈkaʊntəbli] [lɑ:dʒ] [ɪn] [vju:] [ɒv; əv][ðə; ði]
and the discrepancies are perhaps not unaccountably large in view of the
和 这 差异 是 也许 不是 无故 大的 在 看法 的 这
[ˈneɪtə(r)][ænd; ənd][ðə; ði] [ˈlɪmɪtɪd] [ɪkˈstent][ɒv; əv][ðə; ði][məˈtɪəriəl] .
nature and the limited extent of the material .
自然 和 这 有限的 程度 的 这 材料 .

考虑到材料的性质和有限范围，这些差异或许并非大得离谱。

[ðeə(r)][ɪz][ə; eɪ][ˌsɪstəˈmætɪk] [ˈdɪfrəns] , [haʊˈevə(r)] , [ˈæv(ə)rɪdʒɪŋ][əˈbaʊt] - . [tuːˈtuː][mæg] . ,
There is a systematic difference , however , averaging about 0 . 2 mag . .
那里 是 一个 系统 不同之处 , 然而 , 平均值 关于 - . 2 杂志 . ,
然而, 两者之间存在系统性差异, 平均约为 0.2 星等。

[ɪn][ðə; ði] [sens] [ðæt][ðə; ði] [əbˈzɜːvd] [ˈvæljuːz][ɑː(r); ə(r)] [tuː] [lɑːdʒ] , [ænd; ənd] [ɪnˈkriːsɪŋ] [wɪð]
in the sense that the observed values are too large , and increasing with
在 这 感觉 那 这 观察到 值 是 也 大的 , 和 增加 和
[dɪˈkriːsɪŋ] [ɪlɪpˈtɪsəti] .
decreasing ellipticity .
递减 椭圆率 .
从某种意义上说, 观测值过大, 并且随着椭圆率的减小而增大。

[wʌŋ][ˌekspləˈneɪ(ə)n][ɪz] [ðæt][ðə; ði] [əbˈzɜːvd] [ˈklɑːsɪz] [ɑː(r); ə(r)][ˈpjʊərə] [ðæn; ðən][ɪz] [ɪkˈspektɪd] [ɒn][ðə; ði]
One explanation is that the observed classes are purer than is expected on the
— 解释 是 那 这 观察到 课程 是 更纯净 比 是 预期的 在 这
[əˈsʌmpn] [ɒv; əv][ˈrændəm][ˌɔːrɪənˈteɪ(ə)n] .
assumption of random orientation .
假设 的 随机的 方向 .
一种解释是, 观察到的类别比随机取向假设下预期的要更纯净。

[ðɪs] [vjuː] [ɪz] [səˈpɔːrtɪd] [baɪ][ðə; ði] [ˈrelatɪvli] [smɔːl] [dɪˈspɜːʃn] [ɪn][siː] ,
This view is supported by the relatively small dispersion in C ,
这 看法 是 有 经过 这 相对地 小的 分散 在 C ,
C 的分散度相对较小, 也支持了这一观点。

[æz; əz] [meɪ] [biː; bi] [siːn] [ɪn][ˈteɪb(ə)l][aɪ][ænd; ənd] [ˈfɪɡə(r)] [tuːˈtuː] , [əˈmʌŋ] [ðə; ði] [ˈnebjʊˌliː] [ɒv; əv][ə; eɪ]
as may be seen in Table I and Figure 2 , among the nebulae of a
作为 可能 是 已见 在 桌子 我 和 数字 2 , 之中 这 星云 的 一个
[ˈɡɪv(ə)n] [klɑːs] ,
given class ,
给定 班级 ,
如表 I 和图 2 所示, 在给定类别的星云中,

[bʌt; bət][aɪ ˈtiː][ɪz] [ˈdɪfɪkəlt] [tuː; tə] [əˈkaʊnt] [fɔː(r); fə(r)][ˈeni] [satʃ] [sɪˈlektɪv] [ɪˈfekt] [ɪn][ðə; ði] [ɑːbzərˈveɪʃənz]
but it is difficult to account for any such selective effect in the observations
但 它 是 难的 到 帐户 为了 任何 这样的 选择性 影响 在 这 观察
.
.
.
但很难解释观察结果中是否存在这种选择性效应。

[ðə; ði] [dɪˈskrepənsɪ] [meɪ] [biː; bi] [ˈlɑːdʒli] [ɪˈlɪmɪneɪtɪd] [baɪ][æn; ən] [ˈɑːbɪtrəri] [əˈdʒʌstmənt] [ɒv; əv][ðə; ði]
The discrepancies may be largely eliminated by an arbitrary adjustment of the
这 差异 可能 是 很大程度上 已淘汰 经过 一个 随意的 调整 的 这
[ˈnʌmbəz] [ɒv; əv] [ˈnebjʊˌliː] [wɪð] [ˈveəriəs] [dɪˈɡriːz] [ɒv; əv][ˈæktʃuəl] [ɪlɪpˈtɪsəti] ;
numbers of nebulae with various degrees of actual ellipticity ;
数字 的 星云 和 各种各样的 学位 的 实际的 椭圆率 ;
通过任意调整具有不同程度实际椭圆度的星云数量, 可以很大程度上消除这些差异;

[fɔː(r); fə(r)] [ˈɪnstəns] , [ðə; ði][ˈvæljuːz][ɪn] { - }
for instance , the values in { 31 }
为了 实例 , 这 值 在 { - }
例如, {31}中的值

[ðə; ði][lɑːst] [ˈkɒləm] [ɒv; əv][ˈteɪb(ə)l][ˌeksˌaɪˈaɪ] , [ˈkælkjuleɪtɪd][ɒn][ðə; ði] [əˈsʌmpn] [ɒv; əv][ˈiːkwəl] [ˈnʌmbəz]
the last column of Table XII , calculated on the assumption of equal numbers
这 最后的 柱子 的 桌子 十二 , 计算 在 这 假设 的 平等的 数字
,
.
.
表十二的最后一列, 是在假设数量相等的情况下计算的,

[ə'gri:] ['veri] [wel] [wɪð] [ðə; ði] [əb'zɜ:vð] ['væljʊ:z] ,
agree very well with the observed values ,
同意 非常出色地 和 这 观察到 值 ,
与观测值非常吻合,

[ɔ:l'dəʊ] [ðə; ði] [rɪ'zʌltɪŋ] ['nʌmbəz] ['hævɪŋ] [ðə; ði] ['veəriəs] [ə'pærənt] ['dɪfə(r)] ['slɑ:tli]
although the resulting numbers having the various apparent ellipticities differ slightly
虽然 这 结果 数字 拥有 这 各种各样的 明显 椭圆率 不同 轻微地
[frɒm; frəm] [ðəʊz] [əb'zɜ:vð] .
from those observed .
从 那些 观察到 .

尽管所得出的具有各种表观椭圆率的数值与观测到的数值略有不同。

[ðə; ði] [əb'zɜ:vð] ['væljʊ:z] , [haʊ'evə(r)] ,
The observed values , however ,
这 观察到 值 , 然而 ,
然而, 观测值

[kæn; kən] [ə'gen] [bi:; bi] [ə'kaʊntɪd] [fɔ:(r); fə(r)][baɪ][ðə; ði] [ɪn'klu:ʒn] [ɒv; əv][sʌm; səm]['flætə(r)] ['nebjʊ,li:]
can again be accounted for by the inclusion of some flatter nebulae
能 再次 是 已记录 为了 经过 这 包容性 的 一些 奉承 星云
[ə'mʌŋ] [ðə; ði] ['kla:sɪz] E6 [ænd; ənd] E7 .
among the classes E6 and E7 .
之中 这 课程 E6 和 E7 .

这也可以解释为 E6 类和 E7 类中包含了一些较扁平的星云。

['veri] ['ɜ:li] ['es.eɪ][ɔ:(r)] [ɛs,bi:'eɪ] ['nebjʊ,li:] [maɪt] ['i:zəli] [bi:; bi][mɪ'steɪkən][fɔ:(r); fə(r)][i:] ['nebjʊ,li:] [wen]
Very early Sa or SBa nebulae might easily be mistaken for E nebulae when
非常 早期的 萨 或者 小企业管理局 星云 可能 容易地 是 错误 为了 E 星云 什么时候
['ɔ:rientɪd] [edʒ] - [ɒn] ,
oriented edge - on ,
定向 边缘 - 在 ,

早期形成的Sa或SBa星云侧向观测时很容易被误认为是E星云。

[ɔ:l'dəʊ] [ðeɪ] [wʊd] [bi:; bi] ['redɪli] ['rekəg'naɪzd] [wen] ['i:v(ə)n] ['slɑ:tli] ['tɪltɪd] .
although they would be readily recognized when even slightly tilted .
虽然 他们 会 是 容易 认可 什么时候 甚至 轻微地 斜 .
即使稍微倾斜, 它们也很容易被认出来。

[ɪf] [ðə; ði][nju:'merɪk(ə)l] [rɪ'zʌltɪz] ['fʊli] [reprɪ'zentɪd] ['æktʃuəl][stə'tɪstɪk(ə)] [lɔ:z] ,
If the numerical results fully represented actual statistical laws ,
如果 这 数值 结果 完全 代表 实际的 统计 法律 ,
如果数值结果能够完全反映实际的统计规律,

[ðə; ði][ɛksplə'neɪ(ə)n] [wʊd] [bi:; bi] [sɔ:t] [ɪn][ðə; ði] ['fɪzɪk(ə)l] ['neɪtʃə(r)][ɒv; əv][ðə; ði] ['nebjʊ,li:] .
the explanation would be sought in the physical nature of the nebulae .
这 解释 会 是 寻求 在 这 身体的 自然 的 这 星云 .
解释这一现象需要从星云的物理性质中寻找。

[ðə; ði] [tʃeɪndʒ] [frɒm; frəm] [e'lɪpsɔɪdl] [tu:; tə][len'tɪkjʊlə(r)] ['fɪgəz] , ['nəʊtɪsəb(ə)l][ɪn][ðə; ði]['lertə(r)] - [taɪp]
The change from ellipsoidal to lenticular figures , noticeable in the later - type
这 改变 从 椭球体 到 透镜状的 数据 , 显 在 这 之后 - 类型
['nebjʊ,li:] ,
nebulae ,
星云 ,

在后期型星云中, 可以明显观察到从椭球形到透镜状的转变。

[wʊd] [ə'fekt] [ðə; ði] [rɪ'zʌltɪz] [ɪn][ðə; ði]['prɒpə(r)][də'rekʃ(ə)n] ,
would affect the results in the proper direction ,
会 影响 这 结果 在 这 恰当的 方向 ,
这将使结果朝着正确的方向发展,

[æz; əz] [wʊd] ['ɔ:lsəʊ][ə; eɪ] [prə'gresɪv] ['fɔ:tnɪŋ] [ɒv; əv][ðə; ðɪ]['pəʊlə(r)]['æksɪs] .
as would also a progressive shortening of the polar axis .

作为 会 还 一个 进步 缩短 的 这 极性 轴 .

极轴逐渐缩短也会导致这种情况。

[ðə; ðɪ] [dr'skrepənsɪ] , [haʊ'veə(r)] , [ɑ:(r); ə(r)]['sekənd] - ['ɔ:də(r)] [ɪ'fekts] ,
The discrepancies , however , are second - order effects ,

这 差异 , 然而 , 是 第二 - 命令 效果 ,

然而，这些差异是次要效应。

[ænd; ənd] [sɪns] [ðeɪ] [meɪ] [bi:; bi] [dju:] [tu:; tə][æksɪ'dent(ə)l] [verɪ'eʃən] [frɒm; frəm]['rændəm][ɔ:riən'teɪʃ(ə)n]
and since they may be due to accidental variations from random orientation

和 自从 他们 可能 是 到期的 到 偶然 变体 从 随机的 方向

,
.
,

而且由于它们可能是由于随机方向的偶然偏差造成的，

[ə; eɪ] ['fɜ:ðə(r)] [dr'skʌʃ(ə)n] [mʌst; məst][ə'weɪt][ðə; ðɪ] [ə,kju:mjə'leɪʃn] [ɒv; əv][mɔ:(r)]['deɪtə] .
a further discussion must await the accumulation of more data .

一个 更远 讨论 必须 等待 这 积累 的 更多的 数据 .

需要积累更多数据才能进行进一步讨论。

['teɪb(ə)l][,ɛks,ɑɪ'aɪ]

TABLE XII
桌子 十二

表十二

[,dɪfə'renʃ(ə)l] ['vælju:z][ɒv; əv][si:]
Differential Values of C
微分 值 的 C

的微分值

[kla:s] [pʃʊə(r)] ['kla:sɪz] [əb'zɜ:vɪd] ['rændəm][ɔ:riən'teɪʃ(ə)n]
Class Pure Classes Observed Random Orientation
班级 纯的 课程 观察到 随机的 方向

纯类 观察到的随机取向

[nəʊ] . [æz; əz] [əb'zɜ:vɪd] ['i:kwəl][nəʊ] .
No . as Observed Equal No .
不 . 作为 观察到 平等的 不 .

观察到的数量等于数量。

C7 - C7 - . - - . - - . - - . -
C7 - C7 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00
C7 - C7 - . - - . - - . - - . -

C7-C7 0.00 0.00 0.00 0.00

C6 - . - - . - * - . - - . -
C6 0 . 63 0 . 35 * 0 . 25 0 . 35
C6 - . - - . - * - . - - . -

C6 0.63 0.35* 0.25 0.35

C5 [wʌn] . - - . - * - . - - . -
C5 1 . 10 0 . 70 * 0 . 58 0 . 70
C5 1 . - - . - * - . - - . -

C5 1.10 0.70* 0.58 0.70

C4 [wʌn] . - - . - [wʌn] . - [wʌn] . -
C4 1 . 51 0 . 85 1 . 11 1 . 01
C4 1 . - - . - 1 . - 1 1 . -

C4 1.51 0.85 1.11 1.01

C3 [wʌn] . - [wʌn] . - - . - [wʌn] . -
C3 1 . 84 1 . 42 0 . 87 1 . 28
C3 1 . - 1 . - - . - 1 . -

C3 1.84 1.42 0.87 1.28

C2 [tu:'tu:] . - [wʌn] . - [wʌn] . - [wʌn] . -
C2 2 . 13 1 . 67 1 . 33 1 . 55
C2 2 . - 1 . - 1 . - 1 . -

C2 2.13 1.67 1.33 1.55

C1 [tu:'tu:] . - [tu:'tu:] . - † [wʌn] . - [wʌn] . -
C1 2 . 39 2 . 01 † 1 . 54 1 . 83
C1 2 . - 2 . - † 1 . - 1 . -

C1 2.39 2.01† 1.54 1.83

C0 [tu:'tu:] . - [tu:'tu:] . - † [tu:'tu:] . - [tu:'tu:] . -
C0 2 . 62 2 . 17 † 2 . 15 2 . 25
C0 2 . - 2 . - † 2 . - 2 . -

C0 2.62 2.17† 2.15 2.25

* [ri:d] [frɒm; frəm] [smu:ð] [kɜ:v] [ɪn][fɪg] . [sɪks] .
* **Read from smooth curve in Fig 6 .**
* 读 从 光滑的 曲线 在 如图 6 .

* 从图 6 中的平滑曲线读取数据。

[ðə; ði] [smɔ:l] [ˈnʌmbəz] [ɒv; əv] [əb'zɜ:vð] E5 [ænd; ənd] E6 ['nebʊli:] ['dʒʌstɪfaɪ] [ðɪs] [prə'si:dʒə(r)] .
The small numbers of observed E5 and E6 nebulae justify this procedure .
这 小的 数字 的 观察到 E5 和 E6 星云 证明合法 这 程序 .

观测到的 E5 和 E6 星云数量较少，因此有必要采用这种方法。

[ðə; ði][ˈʌðə(r)][ˈvælju:z][ɑ:(r); ə(r)][ðə; ði] [mi:nz] ['æktʃuəli] [əb'zɜ:vð] .
The other values are the means actually observed .
这 其他 值 是 这 方法 实际上 观察到 .

其他数值均为实际观测到的平均值。

† [en] . [dʒi:] . [si:] . - [ænd; ənd] - [ɑ:(r); ə(r)][ɪn'klu:dɪd][æz; əz] E0 [ænd; ənd] E1 , [rɪ'spektɪvli] .
† **N . G . C . 524 and 3998 are included as E0 and E1 , respectively .**
† N . G . C . - 和 - 是 包括 作为 E0 和 E1 , 分别 .

† NGC 524 和 3998 分别被纳入 E0 和 E1。

[ˈmi:nwaɪl] , [ˌaɪ 'ti:] [ɪz] ['eɪvɪdənt] [ðæt] , [tu:; tə][ə; eɪ][fɜ:st] [əˌprɒksɪ'meɪʃn] [æt; ət] [li:st] ,
Meanwhile , it is evident that , to a first approximation at least ,
同时 , 它 是 明显 那 , 到 一个 第一的 近似 在 至少 ,

同时，很明显，至少在初步近似下，

[ðə; ði][ˈpəʊlə(r)][da'ɪæmɪtəz] [ə'ləʊn] [drɪ'tɜ:mɪn] [ðə; ði][ˈtəʊt(ə)l] [ˌlu:mɪ'nɒsəti] [ɒv; əv] [ɔ:l] [rɪ'lɪptɪk(ə)l] ['nebʊli:] ,
the polar diameters alone determine the total luminosities of all elliptical nebulae ,
这 极性 直径 独自的 决定 这 全部的 亮度 的 全部 椭圆形 星云 ,

仅极径即可决定所有椭圆星云的总光度。

[ænd; ənd][ðə; ði][ɪn'taɪə(r)][ˈsɪəri:z] [kæn; kən] [bi:; bi] [ˌreprɪ'zentɪd] [baɪ][ðə; ði] ['veəriəs] [kən'fɪɡjʊ'reɪʃənz] [ɒv; əv]
and the entire series can be represented by the various configurations of
和 这 全部的 系列 能 是 代表 经过 这 各种各样的 配置 的

[æn; ən] [ə'rɪdʒənəli] [ˈɡləʊbjələ(r)] [mæs] [ɪk'spændɪŋ] [ˌɛkwə'tɔ:riəli] .
an originally globular mass expanding equatorially .
一个 起初 球形 大量的 扩展 赤道 .

整个系列可以用最初呈球状的物质向赤道方向膨胀的各种构型来表示。

[ə; eɪ][ˈsɪŋɡ(ə)l] [ˈfɔ:mjələ] [ˌreprɪ'zents] [ðə; ði][rɪ'leɪʃ(ə)n] ,
A single formula represents the relation ,
一个 单身的 公式 代表 这 关系 ,

一个简单的公式就能表示这种关系，

[ɪn] [wɪtʃ] [ðə; ði][ˈvæljuː][ɒv; əv][siː][ɪz] [ðæt] [ˌkɒrəˈspɒndɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði][pʃə(r)] [taɪp] E0 .
in which the value of C is that corresponding to the pure type E0 .
在 哪个 这 价值 的 C 是 那 相应的 到 这 纯的 类型 E0 .
其中 C 的值对应于纯类型 E0。

[frɒm; frəm][ˈteɪb(ə)][ˌɛks, aɪˈaɪ] , { - }
From Table XII , { 32 }
从 桌子 十二 , { - }
根据表十二, {32}

[ðɪs] [ɪz] [faʊnd] [tuː; tə][biː; bi][tuːˈtuː] . - [mæg] .
this is found to be 2 . 62 mag .
这 是 成立 到 是 2 . - 杂志 .
经检测, 其值为 2.62 等。

[les] [ðæn; ðən][ðə; ði][ˈvæljuː][ɒv; əv] C7
less than the value of C7
较少的 比 这 价值 的 C7
小于 C7 的值

[ðə; ði][ˈlætə(r)][ɪz] [əbˈzɜːvd] [tuː; tə][biː; bi] - . - , [hens] ([faɪv])
The latter is observed to be 12 . 75 , hence (5)
这 后者 是 观察到 到 是 - . - , 因此 (5)
后者经观察为 12.75, 因此 (5)

[ɪf] [ðɪs] [rɪˈleɪ(ə)n] [held] [fɔː(r); fə(r)][ðə; ði][ˈspaɪrəlz][æz; əz] [wel] ,
If this relation held for the spirals as well ,
如果 这 关系 握住 为了 这 螺旋 作为 出色地 ,
如果这种关系也适用于螺旋线,

[ðə; ði][ˈpəʊlə(r)][daɪˈæmɪtəz] [kʊd; kəd][biː; bi][ˈkælkjuleɪtɪd][frɒm; frəm][ðə; ði] ['meɪzəd] [ˈmæɡnɪtjuːd] .
the polar diameters could be calculated from the measured magnitudes .
这 极性 直径 可以 是 计算 从 这 测量 震级 .
极径可以根据测得的星等计算得出。

[ʌnˈfɔːtʃənətli] , [aɪˈtiː][hæz; həz][nɒt] [biːn] [ˈpɒsəb(ə)][tuː; tə] ['meɪzə(r)] [ˈækjərətli] [ðə; ði][ˈpəʊlə(r)]
Unfortunately , it has not been possible to measure accurately the polar
很遗憾 , 它 有 不是 到过 可能的 到 措施 准确 这 极性
[daɪˈæmɪtəz] [dəˈrektli] ,
diameters directly ,
直径 直接地 ,
遗憾的是, 目前还无法直接精确测量极轴直径。

[ænd; ənd] [hens] [tuː; tə][test][ðə; ði] [ˈkwɛstʃən] ,
and hence to test the question ,
和 因此 到 测试 这 问题 ,
因此, 为了检验这个问题,

[bʌt; bət] [ðeɪ] [hæv; həv] [biːn] [kəmˈpjuːtɪd][fɔː(r); fə(r)][ðə; ði] [miːn] [ˈmæɡnɪtjuːd] [ɒv; əv][ðə; ði][ˈɛs.eɪ] ,
but they have been computed for the mean magnitudes of the Sa ,
但 他们 有 到过 计算 为了 这 意思是 震级 的 这 萨 ,
[ˈsʌmbədi] ,
Sb ,
某人 ,
但它们是根据 Sa、Sb 的平均星等计算出来的,

[ænd; ənd][ˌɛsˈsiː] [ˈnebʊliː] [æz; əz][ˈɡɪv(ə)n][ɪn][ˈteɪb(ə)][θriː] ,
and Sc nebulae as given in Table III ,
和 Sc 星云 作为 给定 在 桌子 三、 ,
以及表 III 中列出的 Sc 星云,

[ænd; ənd][ðə; ði]['reɪʃəʊz][ɒv; əv][ðə; ði]['æksɪːz][hæv; həv] [biːn] [dɪ'raɪvd] [baɪ][ə; eɪ][kəm'pærɪs(ə)n][ɒv; əv]
and the ratios of the axes have been derived by a comparison of
和 这 比率 的 这 轴 有 到过 衍生的 经过 一个 比较 的
[ðɪːz] [ˌhaɪpə'θetɪk(ə)l]['væljuːz] [wɪð] [ðə; ði] [miːnz] [ɒv; əv][ðə; ði] ['meɪəd] ['mæksɪməm][daɪ'æmɪtəz] .
these hypothetical values with the means of the measured maximum diameters .
这些 假想 值 和 这 方法 的 这 测量 最大限度 直径 .

轴的比率是通过将这些假设值与测量的最大直径的平均值进行比较而得出的。

[ðə; ði] [rɪ'zʌlts] , [wʌn][tuː; tə][fɔːr] . [fɔːr] , [wʌn][tuː; tə][faɪv] . ['sevən] , [ænd; ənd][wʌn][tuː; tə]['sevən] . [θriː] ,
The results , 1 to 4 : 4 , 1 to 5 : 7 , and 1 to 7 : 3 ,
这 结果 , 1 到 4 : 4 , 1 到 5 : 7 , 和 1 到 7 : 3 ,
[rɪ'spektɪvli] ,
respectively ,
分别 ,

结果分别为 1 至 4.4、1 至 5.7 和 1 至 7.3。

[ɔːl'dəʊ] [ɒv; əv][ðə; ði] [raɪt] ['ɔːdə(r)] , [ə'praɪ(r)] [tuː; tə][biː; bi] ['sʌmwʊt] [tuː] [haɪ] .
although of the right order , appear to be somewhat too high .
虽然 的 这 正确的 命令 , 出现 到 是 有些 也 高的 .

虽然顺序正确，但似乎有点太高了。

[æn; ən][ɪg,zæmɪ'neiʃ(ə)n][ɒv; əv][ðə; ði] ['fəʊtəgræfs] ['ɪndɪkeɪts] ['væljuːz][ɒv; əv][ðə; ði]['ɔːdə(r)][ɒv; əv][wʌn]
An examination of the photographs indicates values of the order of 1
一个 考试 的 这 照片 表示 值 的 这 命令 的 1
[tuː; tə][faɪv] . [faɪv] ,
to 5 : 5 ,
到 5 : 5 ,

对照片的检查表明，数值范围在 1 到 5.5 之间。

[wʌn][tuː; tə][eɪt] , [ænd; ənd][wʌn][tuː; tə] - , [bʌt; bət][ðə; ði][mə'tɪəriəl][ɪz]['miːgə(r)][ænd; ənd] [meɪ] [nɒt]
1 to 8 , and 1 to 10 , but the material is meager and may not
1 到 8 , 和 1 到 - , 但 这 材料 是 微薄 和 可能 不是
[biː; bi] [reprɪ'zentətɪv] .
be representative .
是 代表 .

1 到 8，以及 1 到 10，但材料很少，可能不具代表性。

[ðə; ði][kəm'pærɪs(ə)n] ['emfəsaɪz] , [haʊ'evə(r)] ,
The comparison emphasizes , however ,
这 比较 强调 , 然而 ,

然而，这种比较强调了：

[ðə; ði][ˌhəʊməʊdʒə'niːəti][ænd; ənd][ðə; ði] [prə'gresɪv] ['neɪtʃə(r)][ɒv; əv][ðə; ði][ɪn'taɪə(r)] ['siːkwəns] [ɒv; əv]
the homogeneity and the progressive nature of the entire sequence of
这 同质性 和 这 进步 自然 的 这 全部的 顺序 的
['neɪbjʊ,liː] [ænd; ənd] [lend] [sʌm; səm] [ə'dɪʃən(ə)l] ['kʌlə(r)][tuː; tə][ðə; ði] [ə'sʌmpjən] [ðæt] [aɪ 'tiː] [reprɪ'zents]
nebulae and lends some additional color to the assumption that it represents
星云 和 借贷 一些 额外的 颜色 到 这 假设 那 它 代表
[ˌveəriəs] ['æspekts][ɒv; əv][ðə; ði] [seɪm] [ˌfʌndə'ment(ə)l] [taɪp] [ɒv; əv] ['sɪstəm] .
various aspects of the same fundamental type of system .
各种各样的 方面 的 这 相同的 基本的 类型 的 系统 .

整个星云序列的同质性和渐进性，为它代表同一基本类型系统的各个方面的假设增添了一些色彩。

[frɒm; frəm][ðə; ði][daɪ'næmɪk(ə)l] [pɔɪnt] [ɒv; əv] [vjuː] ,
From the dynamical point of view ,
从 这 动态 观点 的 看法 ,

从动力学的角度来看，

[ðə; ði][ɪmˈpɪrɪk(ə)] [rɪˈzʌlts] [ɑː(r); ə(r)] [kənˈsɪstənt] [wɪð] [ðə; ði][ˈdʒen(ə)rəl][ˈɔːdə(r)][pʊv; əv] [rɪˈvents] [ɪn] -
the empirical results are consistent with the general order of events in Jeans's
这 经验 结果 是 持续的 和 这 一般的 命令 的 活动 在 -
[ˈθɪəri] .
theory .
理论 .

实证结果与吉恩斯理论中的一般事件顺序一致。

[ðʌs] [ɪnˈtɜːprətɪd] , [ðə; ði][ˈsɪəriːz][ɪz][wʌn][pʊv; əv][ɪkˈspænʃ(ə)n] ,
Thus interpreted , the series is one of expansion ,
因此 翻译 , 这 系列 是 一 的 扩张 ,

如此解读，该系列是一部扩张系列小说。

[ænd; ænd][ðə; ði] [skeɪl] [pʊv; əv] [taɪps] [brɪˈkʌmz] [ðə; ði][taɪm] [skeɪl] [ɪn][ðə; ði][,ɪːvəˈluːʃən(ə)ri] [ˈhɪstri; ˈhɪstəri]
and the scale of types becomes the time scale in the evolutionary history
和 这 规模 的 类型 变成 这 时间 规模 在 这 进化 历史
[pʊv; əv] [ˈnebʊl,i:] .
of nebulae .
的 星云 .

而星云类型的尺度就成为了星云演化历史的时间尺度。

[ɪn] [tuː] [rɪˈspekts] [ðɪs] [skeɪl] [ɪz][nɒt] [ɪnˈtaɪəli] [ˈɑːbɪtrəri] .
In two respects this scale is not entirely arbitrary .
在 二 尊重 这 规模 是 不是 完全 随意的 .

从两个方面来看，这个尺度并非完全任意。

[əˈmʌŋ] [ðə; ði][ɪˈlɪptɪk(ə)] [ˈnebʊl,i:] [ðə; ði] [səkˈsesɪv] [taɪps] [ˈdɪfə(r)][baɪ][ˈiːkwəl] [ˈɪnkrəmənts] [ɪn][ðə; ði]
Among the elliptical nebulae the successive types differ by equal increments in the
之中 这 椭圆形 星云 这 连续 类型 不同 经过 平等的 增量 在 这
[ɪlɪpˈtɪsəti] [ɔː(r)][ðə; ði] [dɪˈɡriː] [pʊv; əv] [ˈflætɪŋ] ,
ellipticity or the degree of flattening ,
椭圆率 或者 这 程度 的 扁平化 ,

在椭圆星云中，相邻类型的星云在椭圆率或扁平度上以相等的增量递增。

[ænd; ænd] [əˈmʌŋ] [ðə; ði][ˈspairəlz][ðə; ði] [ɪntəˈmiːdiət] [steɪdʒ][ɪz][,mɪdˈweɪ] [brɪˈtwiːn] [ðə; ði] [tuː] [end] -
and among the spirals the intermediate stage is midway between the two end -
和 之中 这 螺旋 这 中间的 阶段 是 中途 之间 这 二 结尾 -
[steɪdʒɪz][ɪn][ðə; ði] [ˈstrʌktʃərəl] [ˈfiːtʃəz] [æz; əz] [wel] [æz; əz][ɪn][ðə; ði][,luːmɪˈnɒsəti][rɪˈleɪʃ(ə)nz] .
stages in the structural features as well as in the luminosity relations .
阶段 在 这 结构 特征 作为 出色地 作为 在 这 亮度 关系 .

在旋涡星系中，中间阶段在结构特征和光度关系上都处于两个最终阶段的中间位置。

[wʌn][ˈʌðə(r)] [ˈfiːtʃə(r)] [pʊv; əv][ðə; ði] [kɜːrvz] [meɪ][biː; bi] [dɪˈskʌst] [frɒm; frəm][ðə; ði] [pɔɪnt] [pʊv; əv] [vjuː]
One other feature of the curves may be discussed from the point of view
一 其他 特征 的 这 曲线 可能 是 讨论 从 这 观点 的 看法
[pʊv; əv] - [ˈθɪəri] [brɪˈfɔː(r)] [rɪˈtɜːnɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði] [ˈstriktli] [ɪmˈpɪrɪk(ə)] [ˈætɪtjuːd] .
of Jeans's theory before returning to the strictly empirical attitude .
的 - 理论 前 返回 到 这 严格 经验 态度 .

在回到严格的经验主义态度之前，可以从Jeans的理论角度讨论曲线的另一个特征。

[ðə; ði][kləʊz] [əˈɡriːmənt] [pʊv; əv][ðə; ði][daɪˈæmɪtəz][fɔː(r); fə(r)][ðə; ði][steɪdʒɪz] E7 [ænd; ænd][ˈes.eɪ] [səˈdʒests]
The close agreement of the diameters for the stages E7 and Sa suggests
这 关闭 协议 的 这 直径 为了 这 阶段 E7 和 萨 建议
[ðæt] [ðə; ði][trænˈzɪʃ(ə)n][frɒm; frəm][ðə; ði][lenˈtɪkjʊlə(r)] [ˈnebʊlə][tuː; tə][ðə; ði][ˈnɔːm(ə)] [ˈspairəl] [fɔːm] [ɪz][nɒt]
that the transition from the lenticular nebula to the normal spiral form is not
那 这 过渡 从 这 透镜状的 星云 到 这 普通的 螺旋 形式 是 不是
[kætəˈklɪzmtɪk] .
cataclysmic .
灾难性的 .

E7和Sa阶段直径的紧密一致性表明，从透镜状星云到正常螺旋形态的转变并非灾难性的。

[ɪf] [ðə; ði][træn'zɪ(ə)n][wɜ:(r); wə(r)][ˈgrædʒuəl] , [haʊ'evə(r)] , [wi:; wi][ʃʊd; ʃəd][ɪk'spekt][tu:; tə] [əb'zɜ:v]
If the transition were gradual , however , we should expect to observe
如果 这 过渡 是 逐渐地 , 然而 , 我们 应该 预计 到 观察
[ə'keɪzən(ə)l][ˈɒbdʒɪkts][ɪn][ðə; ði] ['veri] ['prəʊses] ,
occasional objects in the very process ,
偶然 对象 在 这 非常 过程 ,

然而, 如果这种转变是渐进的, 那么我们应该会在这个过程中观察到一些偶发性物体。

[bʌt; bət] [ə'mʌŋ] [ðə; ði][ˈθaʊz(ə)nd][ɔ:(r)][səʊ] ['nebjʊ.li:] [hu:z] [ˈɪmɪdʒɪz][hæv; həv] [bi:n] [ɪn'spektɪd] ,
but among the thousand or so nebulae whose images have been inspected ,
但 之中 这 千 或者 所以 星云 谁 图片 有 到过 检查 ,
但在已检查图像的大约一千个星云中,

[nɒt][wʌŋ][kliə(r)] [keɪs] [ɒv; əv][ə; eɪ][træn'zɪ(ə)n] [fɔ:m] [hæz; həz] [bi:n] [dɪ'tektɪd] .
not one clear case of a transition form has been detected .
不是 一 清除 案件 的 一个 过渡 形式 有 到过 检测到 .
目前尚未发现任何明显的过渡形式。

[ðə; ði] [ˌɑ:bzər'veɪʃənz][dʒʌmp] ['sʌd(ə)nli] [frɒm; frəm][len'tɪkjʊlə(r)] ['nebjʊ.li:] { - }
The observations jump suddenly from lenticular nebulae { 33 }
这 观察 跳 突然 从 透镜状的 星云 { - }
观测结果突然从透镜状星云跃升{33}

[wɪð] [nəʊ] [treɪs] [ɒv; əv][ˈstrʌktʃə(r)][tu:; tə][ˈspaɪrəlz][ɪn] [wɪt] [ðə; ði] [ɑ:mz] [ɑ:(r); ə(r)] [ˈfəʊli] [dɪ'veləpt] .
with no trace of structure to spirals in which the arms are fully developed .
和 不 痕迹 的 结构 到 螺旋 在 哪个 这 武器 是 完全 发达 .
没有丝毫螺旋结构痕迹, 但其臂已完全发育。

[ɪf] [ðə; ði][nju:'merɪk(ə)l][ˈdeɪtə][kʊd; kəd][bi:; bi] [ˈfəʊli] [ˈtrʌstɪd] , [ðə; ði] [ˌɛs.bi:'eɪ] [fɔ:mz] [wʊd] [fɪl] [ðə; ði]
If the numerical data could be fully trusted , the SBa forms would fill the
如果 这 数值 数据 可以 是 完全 可信 , 这 小企业管理局 表格 会 充满 这
[gæp] .
gap .
差距 .
如果数值数据完全可信, SBa 表格就能填补这一空白。

[ə'mʌŋ] [ðɪ:z] ['nebjʊ.li:] , [ðə; ði][træn'zɪ(ə)n][frɒm; frəm][ðə; ði][len'tɪkjʊlə(r)][tu:; tə][ðə; ði][ˈspaɪrəl] [wɪð]
Among these nebulae , the transition from the lenticular to the spiral with
之中 这些 星云 , 这 过渡 从 这 透镜状的 到 这 螺旋 和
[ɑ:mz] [ɪz][ˈgrædʒuəl][ænd; ənd] [kəm'pli:t] .
arms is gradual and complete .
武器 是 逐渐地 和 完全的 .
在这些星云中, 从透镜状星云到旋臂状星云的过渡是渐进且完全的。

[aɪ'ti:][ɪz] [ˈtemptɪŋ] [tu:; tə] [sə'pəʊz] [ðæt][ðə; ði] [bɑ:d] [ˈspaɪrəlz][du:; də][nɒt] [fɔ:m] [æn; ən] [ˌɪndɪ'pendənt]
It is tempting to suppose that the barred spirals do not form an independent
它 是 诱人的 到 认为 那 这 禁止 螺旋 做 不是 形式 一个 独立的
[ˈsɪəri:z] [ˈpærəlel] [wɪð] [ðæt] [ɒv; əv][ðə; ði][ˈnɔ:m(ə)l][ˈspaɪrəlz] ,
series parallel with that of the normal spirals ,
系列 平行线 和 那 的 这 普通的 螺旋 ,
人们很容易认为棒旋纹并不构成与普通旋纹平行的独立序列,

[bʌt; bət] [ðæt] [ɔ:l][ɔ:(r)][məʊst][ˈspaɪrəlz] [br'ɡɪn] [laɪf] [wɪð] [ðə; ði][bɑ:(r)] ,
but that all or most spirals begin life with the bar ,
但 那 全部 或者 最多 螺旋 开始 生活 和 这 酒吧 ,
但所有或大多数螺旋线都是从横梁开始形成的。

[ɔ:l'ðəʊ] [ˈəʊnli][ə; eɪ] [fju:] [meɪn'teɪn] [aɪ'ti:] [kən'spɪkjʊəsli] [θru:'aʊt] [ðəə(r)][ˈhɪstri; 'hɪstəri] .
although only a few maintain it conspicuously throughout their history .
虽然 仅有的 一个 很少 维持 它 显眼地 自始至终 他们的 历史 .
虽然只有少数人在其历史中一直明显地保持着这种传统。

[ðɪs] [wʊd] [ˈɔːlsəʊ] [əˈkaʊnt] [fɔː(r); fə(r)][ðə; ði][fækt] [ðæt] [ðə; ði] [ˈrelatɪv] [ˈnʌmbəz] [ɒv; əv][ðə; ði]
This would also account for the fact that the relative numbers of the
这 会 还 帐户 为了 这 事实 那 这 相对的 数字 的 这
[ˌɛs.biːˈeɪ] [ˈnebjʊ.liː] [ɑː(r); ə(r)] [ˌɪntəˈmiːdiət] [tuː; tə] [ðəʊz] [ɒv; əv][ðə; ði][lenˈtɪkjʊlə(r)][ænd; ənd][ɒv; əv][ðə; ði]
SBa nebulae are intermediate to those of the lenticular and of the
小企业管理局 星云 是 中间的 到 那些 的 这 透镜状的 和 的 这
[ˈɛs.eɪ] .
Sa .
萨 .

这也解释了为什么 SBa 星云的相对数量介于透镜状星云和 Sa 星云之间。

[ðə; ði][ˈnɔːm(ə)] [ˈspairəlz] [brˈkʌm] [mɔː(r)] [ˈnjuːmərəs] [æz; əz][ðə; ði] [ˈsiːkwəns] [prəˈgresɪz] , [waɪl] [ðə; ði]
The normal spirals become more numerous as the sequence progresses , while the
这 普通的 螺旋 变得 更多的 很多的 作为 这 顺序 进展 , 尽管 这
[ˈnʌmbəz] [ɒv; əv] [bɑːd] [ˈspairəlz] ,
numbers of barred spirals ,
数字 的 禁止 螺旋 ,
随着序列的进行, 正常旋涡的数量逐渐增多, 而棒旋涡的数量则逐渐减少。

[ɒn][ðə; ði] [ˈkɒntrəri] , [ˈæktʃuəli] [dɪˈkriːs] [wɪð] [ədˈvɑːnsɪŋ] [taɪp] .
on the contrary , actually decrease with advancing type .
在 这 相反 , 实际上 减少 和 前进 类型 .

相反, 实际上随着类型的发展而减少。

[rɪˈleɪ(ə)n] [brɪˈtwiːn] [ˈnjuːkliə(r)] [ˌluːmɪˈnɒsəti] [ænd; ənd] [daɪəˈmɪtəz]
RELATION BETWEEN NUCLEAR LUMINOSITIES AND DIAMETERS
关系 之间 核 亮度 和 直径

核亮度和直径的关系

[ˈvɪʒuəl] [ˈmægnɪtjuːd] [hæv; həv] [biːn] [dɪˈtɜːmɪnd] [baɪ] - [fɔː(r); fə(r)][ðə; ði][ˈnjuːkliəɪ][ɒv; əv] -
Visual magnitudes have been determined by Hopmann for the nuclei of 37
视觉的 震级 有 到过 决定 经过 - 为了 这 细胞核 的 -
[ɒv; əv][ðə; ði] [ˈnebjʊ.liː] [ɪnˈkluːdɪd][ɪn][ðə; ði][ˈprez(ə)nt] [dɪˈskʌʃ(ə)n] .
of the nebulae included in the present discussion .
的 这 星云 包括 在这 展示 讨论 .

Hopmann 已经测定了本文讨论中包含的 37 个星云的星核的视星等。

[ðiːz] [ˈdeɪtə] , [təˈgeðə(r)] [wɪð] [taɪps] [ænd; ənd][daɪəˈmɪtəz][ɒv; əv][ðə; ði] [ˈnebjʊ.liː] , [ɑː(r); ə(r)] [ˈlɪstɪd] [ɪn]
These data , together with types and diameters of the nebulae , are listed in
这些 数据 , 一起 和 类型 和 直径 的 这 星云 , 是 列出 在
[ˈteɪb(ə)] [ˌɛks.aɪˈaɪ.aɪ] .
Table XIII .
桌子 十三 .

这些数据以及星云的类型和直径列于表十三中。

[wen] [ðə; ði] [ˈmægnɪtjuːd] [ɑː(r); ə(r)] [plɒtɪd] [dəˈrektli] [əˈgenst] [ðə; ði] [ˈlɒɡəriθmz] [ɒv; əv][ðə; ði]
When the magnitudes are plotted directly against the logarithms of the
什么时候 这 震级 是 绘制 直接地 反对 这 对数 的 这
[daɪəˈmɪtəz] ,
diameters ,
直径 ,

当将星等直接与直径的对数作图时,

[ðeɪ] [fəʊ] [ˈlɪt(ə)] [ɔː(r)][nəʊ] [ˌkɒrəˈleɪ(ə)n] .
they show little or no correlation .
他们 展示 小的 或者 不 相关性 .

它们之间几乎没有相关性。

[wen] , [haʊˈevə(r)] ,
When , however ,
什么时候 , 然而 ,

然而, 当

[ðə; ði] ['nebʊ,li:] [ɑ:(r); ə(r)] [rɪ'dju:st] [tu:; tə][ðə; ði] ['stændəd] [taɪp] ([baɪ] [ə'plaɪŋ] [kə'rekʃnz] [fɔ:(r); fə(r)]
the nebulae are reduced to the standard type (by applying corrections for
这 星云 是 减少 到 这 标准 类型 (经过 申请 更正 为了
['dɪfərənsɪz] [ɪn][daɪ'æmɪtə(r)] [ə'lɒŋ] [ðə; ði] ['si:kwəns]) ,
differences in diameter along the sequence) ,
差异 在 直径 沿着 这 顺序) ,

通过对序列中直径差异进行校正，将星云简化为标准类型。

[ə; eɪ][dɪ'saɪdɪd] [kə'reɪlɪ(ə)n] [ɪz] [faʊnd] [hu:z] [kəʊr'fɪ(ə)nt] [ɪz] - . - .
a decided correlation is found whose coefficient is 0 . 76 .
一个 决定 相关性 是 成立 谁 系数 是 - . - .

发现存在显著相关性，其系数为 0.76。

[ðɪs] [ɪz] [əʊn] [ɪn] ['fɪgə(r)] [naɪn]
This is shown in Figure 9
这 是 所示 在 数字 9

如图9所示

[ðə; ði] ['sɪmp(ə)li] [mi:n] [ɒv; əv][ðə; ði] [tu:] [rɪ'greʃn] [kɜ:rvz] [ɪz] ([sɪks])
The simple mean of the two regression curves is (6)
这 简单的 意思是 的 这 二 回归 曲线 是 (6)

两条回归曲线的简单平均值为 (6)

[weə(r)] [ðə; ði] [sləʊp] ['dɪfəz] [baɪ] [ə'baʊt] [wʌn] [pə(r)] [sent] [frəm; frəm] [ðæt] [ɪn] ['fɔ:mjələ] ([tu:'tu:]) .
where the slope differs by about 1 per cent from that in formula (2) .
在哪里 这 坡 不同 经过 关于 1 每 中心 从 那 在 公式 (2) .

其中斜率与公式 (2) 中的斜率相差约 1%。

[ðə; ði] [lɪst] [kən'teɪnz] - [ɪ'lɪptɪk(ə)li] ['nebʊ,li:] , - ['nɔ:m(ə)li] , [ænd; ənd][sɪks] [bɑ:d] ['spairəlz] .
The list contains 16 elliptical nebulae , 15 normal , and 6 barred spirals .
这 列表 包含 - 椭圆形 星云 , - 普通的 , 和 6 禁止 螺旋 .

该列表包含 16 个椭圆星云、15 个普通星云和 6 个棒旋星云。

[ðə; ði] ['nebʊ,li:] [ɑ:(r); ə(r)] ['feəli] [reprɪ'zentətɪv] , [ɪk'sept] [ðæt] [fju:] [leɪt] - [taɪp] ['spairəlz][ɑ:(r); ə(r)]
The nebulae are fairly representative , except that few late - type spirals are
这 星云 是 相当 代表 , 除了 那 很少 晚的 - 类型 螺旋 是

[ɪn'klu:dɪd] .
included .
包括 .

这些星云相当具有代表性，只是晚型旋涡星系较少。

[ðɪs] [ɪz][æn; ən] [ɪ'fekt] [ɒv; əv] [sɪ'lekʃ(ə)n] [dju:] [tu:; tə][ðə; ði] [fækt] [ðæt] ['nju:kliəɪ] [brɪ'kʌm] [les] [ænd; ənd]
This is an effect of selection due to the fact that nuclei become less and
这 是 一个 影响 的 选择 到期的 到 这 事实 那 细胞核 变得 较少的 和

[les] [kən'spɪkjuəs] [æz; əz][ðə; ði] ['si:kwəns] [prə'gresɪz] .
less conspicuous as the sequence progresses .
较少的 显眼的 作为 这 顺序 进展 .

这是选择的结果，因为随着序列的进行，细胞核变得越来越不明显。

[ðə; ði] [seɪm] [rɪ'zʌlt] [kæn; kən][bi:; bi] [dɪ'raɪvd] [frəm; frəm][ə; eɪ] ['stʌdi] [ɒv; əv][ðə; ði] ['dɪfərənsɪz] , [ɛm'ɛn]
The same result can be derived from a study of the differences , mn
这 相同的 结果 能 是 衍生的 从 一个 学习 的 这 差异 , 明尼苏达州
- [ɛm'ti:] ,
= **mT** ;
= 公吨 ,

通过研究 mn - mT 之间的差异，也可以得出相同的结果。

[fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði][ɪndɪ'rɪvdʒuəl] ['nebʊ,li:] .
for the individual nebulae .
为了 这 个人 星云 .

针对单个星云。

[ðə; ði] [mi:n] [ˈvælju:][ɪz][wʌn] . - ± - . - , [ænd; ənd][ðə; ði] [ˈævərɪdʒ] [rɪˈzɪdʒuəl][ɪz] - . - [mæg] .
The mean value is 1 ± 0.08 , and the average residual is 0.60 mag .
这 意思是 价值 是 1 . ± . 0.08 , 和 这 平均的 残余 是 . . 杂志 .
平均值为 1.55 ± 0.08，平均残差为 0.60 星等。

[mi:nz] [fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði] [ˈseprət] [taɪps] [ɑ:(r); ə(r)][tu:; tə][bi:; bi] [faʊnd] [ɪn][ˈteɪb(ə)l][ˌeks,arɪˈvi:] .
Means for the separate types are to be found in Table XIV .
方法 为了 这 分离 类型 是 到 是 成立 在 桌子 十四 .
各类型的具体方法见表十四。

[ˈteɪb(ə)l][ˌeks,arɪˈarɪ]
TABLE XIII
桌子 十三

表十三

[daɪˈæmɪtəz] [ænd; ənd][ˈnju:kliə(r)][ˈmæɡnɪtju:d]
Diameters and Nuclear Magnitudes
直径 和 核 震级

直径和核质量

[en] . [dʒi:] . [si:] . [taɪp] [lɒɡ][di:] [ˌem'ɛn] - [ˌem'ɛn] [rɪˈdʒu:st]
N . G . C . Type log d mn Hopmann mn Reduced
N . G . C . 类型 日志 d 明尼苏达州 - 明尼苏达州 减少
NGC 类型 log d mn Hopmann mn 简化

- E2 +0 . - [naɪn] . - - . -
221 E2 +0 . 42 9 . 84 11 . 85
- E2 +0 . - 9 . - - . -

221 E2 +0.42 9.84 11.85

- [ˌɛs,bi:ˈeɪ] . - - . - - . -
1023 SBa . 78 11 . 86 11 . 86
- 小企业管理局 . - - . - - . -

1023 SBa .78 11.86 11.86

- [ˈsʌmbədi] - . - - . - - . -
2841 Sb 0 . 78 12 . 08 11 . 19
- 某人 - . - - . - - . -

2841 Sb 0.78 12.08 11.19

- [ˈsʌmbədi][wʌn] . - - . - - . -
3031 Sb 1 . 20 10 . 94 10 . 05
- 某人 1 . - - . - - . -

3031 Sb 1.20 10.94 10.05

- E7 - . - - . - - . -
3115 E7 0 . 60 10 . 83 11 . 09
- E7 - . - - . - - . -

3115 E7 0.60 10.83 11.09

- [ˌɛs,bi:ˈbi:] . - - . - - . -
3351 SBb . 48 12 . 31 12 . 15
- sbb . - - . - - . -

3351 SBb .48 12.31 12.15

- [ˈɛs.eɪ] . - - . - - . -
3368 Sa . 85 11 . 68 11 . 43
- 萨 . - - . - - . -

3368 Sa .85 11.68 11.43

- E0 . - - . - - . -
3379 E0 . 30 11 . 55 14 . 27
- E0 . - - . - - . -

3379 E0 .30 11.55 14.27

-	[ɛs̺biː'eɪ]	-	-	-	-	-	-		
<u>3412</u>	<u>SBa</u>	-	<u>40</u>	<u>11</u>	-	<u>59</u>	<u>11</u>	-	<u>59</u>
-	小企业管理局	-	-	-	-	-	-	-	-

3412 SBa .40 11.59 11.59

-	['sʌmbəði]	-	-	-	-	-	-		
<u>3489</u>	<u>Sb</u>	-	<u>40</u>	<u>11</u>	-	<u>54</u>	<u>10</u>	-	<u>65</u>
-	某人	-	-	-	-	-	-	-	-

3489 Sb .40 11.54 10.65

-	['ɛs̺.eɪ]	-	-	-	-	-	-		
<u>3626</u>	<u>Sa</u>	-	<u>28</u>	<u>12</u>	-	<u>37</u>	<u>12</u>	-	<u>12</u>
-	萨	-	-	-	-	-	-	-	-

3626 Sa .28 12.37 12.12

-	['sʌmbəði]	-	-	-	-	-	-		
<u>3627</u>	<u>Sb</u>	-	<u>90</u>	<u>12</u>	-	<u>03</u>	<u>11</u>	-	<u>14</u>
-	某人	-	-	-	-	-	-	-	-

3627 Sb .90 12.03 11.14

-	E4	-	-	-	-	-	-	
<u>4125</u>	<u>E4</u>	-	<u>3011</u>	-	<u>74</u>	<u>13</u>	-	<u>04</u>
-	E4	-	-	-	-	-	-	

4125 E4 .3011.74 13.04

-	['sʌmbəði]	-	-	-	-	-	-		
<u>4216</u>	<u>Sb</u>	-	<u>85</u>	<u>11</u>	-	<u>65</u>	<u>10</u>	-	<u>76</u>
-	某人	-	-	-	-	-	-	-	-

4216 Sb .85 11.65 10.76

-	E1	-	-	-	-	-	-		
<u>4278</u>	<u>E1</u>	-	<u>0</u>	<u>12</u>	-	<u>02</u>	<u>14</u>	-	<u>38</u>
-	E1	-	-	-	-	-	-	-	-

4278 E1 .0 12.02 14.38

-	E1	-	-	-	-	-	-		
<u>4374</u>	<u>E1</u>	-	<u>08</u>	<u>11</u>	-	<u>43</u>	<u>13</u>	-	<u>79</u>
-	E1	-	-	-	-	-	-	-	-

4374 E1 .08 11.43 13.79

-	E4	-	-	-	-	-	-		
<u>4382</u>	<u>E4</u>	-	<u>48</u>	<u>11</u>	-	<u>77</u>	<u>13</u>	-	<u>07</u>
-	E4	-	-	-	-	-	-	-	-

4382 E4 .48 11.77 13.07

-	E6	-	-	-	-	-	-		
<u>4435</u>	<u>E6</u>	-	<u>11</u>	<u>11</u>	-	<u>65</u>	<u>12</u>	-	<u>264438</u>
-	E6	-	-	-	-	-	-	-	-

4435 E6 .11 11.65 12.264438

['sʌmbəði]	-	-	-	-	-	-	-	
<u>Sb</u>	-	<u>54</u>	<u>11</u>	-	<u>83</u>	<u>10</u>	-	<u>94</u>
某人	-	-	-	-	-	-	-	-

Sb .54 11.83 10.94

-	E0	-	-	-	-	-	-		
<u>4486</u>	<u>E0</u>	-	<u>30</u>	<u>11</u>	-	<u>23</u>	<u>13</u>	-	<u>95</u>
-	E0	-	-	-	-	-	-	-	-

4486 E0 .30 11.23 13.95

-	E6	-	-	-	-	-	-		
<u>4546</u>	<u>E6</u>	-	<u>18</u>	<u>11</u>	-	<u>75</u>	<u>12</u>	-	<u>36</u>
-	E6	-	-	-	-	-	-	-	-

4546 E6 .18 11.75 12.36

-	E3	-	-	-	-	-	-	-
5322	E3	0	. 15	12	. 10	13	. 76	
-	E3	-	-	-	-	-	-	-

5322 E3 0.15 12.10 13.76

-	[ˈɛs.eɪ]	-	-	-	-	-	-	-
5866	Sa	. 48	11	. 76	11	. 51		
-	萨	-	-	-	-	-	-	-

5866 Sa .48 11.76 11.51

-	[ˈsʌmbədi]	+0	-	-	-	-	-	-
7331	Sb	+0	. 95	11	. 82	10	. 93	
-	某人	+0	-	-	-	-	-	-

7331 Sb +0.95 11.82 10.93

[mi:nz]	+0	-	-	-	-	-	-	-
Means	+0	. 509	11	. 60	11	. 90		
方法	+0	-	-	-	-	-	-	-

平均值 +0.509 11.60 11.90

[ðə; ði]	[ləʊ]	[ˈvælju:]	[fɔ:(r); fə(r)]	[ˈɛs.eɪ]	-	[ɛs.biːˈeɪ]	[ɪz]	[dju:]	[tu;; tə]	[en]	-	[dʒi:]	-	[si:]	-	, [fɔ:(r); fə(r)]	[wɪt]
The	low	value	for	Sa	-	SBa	is	due	to	N	. G	. C	. 5866	,	for	which	
这	低的	价值	为了	萨	-	小企业管理局	是	到期的	到	N	: G	: C	: -	,	为了	哪个	
[ðə; ði]	{ - }																
the	{	34	}														
这	{	-	}														

Sa-SBa 值较低是由于 NGC 5866 星系所致，该星系的 {34}

[ˈmæɡnɪtju:d]	[ˈdɪfrəns]	[ɒv; əv]	-	-	[ɪz]	[ˈsɜ:t(ə)nli]	[ɪn]	[ˈerə(r)]	, [ænd; ənd]	[ðə; ði]	[haɪ]	[ˈvælju:]	[fɔ:(r); fə(r)]	
magnitude	difference	of	0	. 06	is	certainly	in	error	,	and	the	high	value	for
震级	不同之处	的	-	-	是	当然	在	错误	,	和	这	高的	价值	为了
[ɛsˈsi:]	[ænd; ənd]	[ɛs.biːˈsi:]	,											
Sc	and	SBc	,											
Sc	和	sbc	,											

0.06 的量级差异肯定是错误的，而且 Sc 和 SBc 的值也偏高。

[tu;; tə]	[em]	-	, [fɔ:(r); fə(r)]	[wɪt]	[ðə; ði]	[ˈdɪfrəns]	[ɒv; əv]	[θri:]	-	[mæg]	-	[ɪz]	[nɒt]	[ˌreprɪˈzentətɪv]	-
to	M	51	,	for	which	the	difference	of	3	. 98	mag	. is	not	representative	.
到	M	-	,	为了	哪个	这	不同之处	的	3	: -	杂志	: 是	不是	代表	:

对于 M 51 而言，3.98 倍的差异并不具有代表性。

[ðə; ði]	[ˈlætə(r)]	[ɪz]	[əˈkaʊntɪd]	[fɔ:(r); fə(r)]	[ɪn]	[pɑ:t]	[baɪ]	[ðə; ði]	[fækt]	[ðæt]	[ðə; ði]	[ɛmˈti:]	[riˈfə:z]	[tu;; tə]	[ðə; ði]
The	latter	is	accounted	for	in	part	by	the	fact	that	the	mT	refers	to	the
这	后者	是	已记录	为了	在	部分	经过	这	事实	那	这	公吨	指	到	这
[kəmˈbaɪnd]	[ˈmæɡnɪtju:d]	[ɒv; əv]	[ðə; ði]	[meɪn]	[ˈspaɪrəl]	[ænd; ənd]	[ðə; ði]	[ˈaʊtlaɪn]	[mæs]	,					
combined	magnitude	of	the	main	spiral	and	the	outlying	mass	,					
合并	震级	的	这	主要的	螺旋	和	这	边远	大量的	,					

后者部分原因在于，mT 指的是主旋涡星系和外围星系的总质量。

[en]	-	[dʒi:]	-	[si:]	-	-	-	-
N	.	G	.	C	.	5195	.	
N	:	G	:	C	:	-	:	-

NGC 5195。

[wen]	[ðɪ:z]	[tu:]	[keɪsɪz]	[ɑ:(r); ə(r)]	[dɪˈskɑ:dɪd]	, [ðə; ði]	[ˈfaɪn(ə)l]	[mi:n]	[brɪˈkʌmz]	[wʌn]	-	±	-	-	-	,
When	these	two	cases	are	discarded	,	the	final	mean	becomes	1	.	52	±	0	. 05
什么时候	这些	二	案例	是	丢弃	,	这	最终的	意思是	变成	1	:	-	±	-	: -

剔除这两个案例后，最终平均值变为 1.52 ± 0.05。

表示 那 这 常规的 额外的 - 银河系 星云 ,

代表公式 (2) 和 (6) 的两条曲线的平行性表明, 规则的河外星云,

[wen] [rɪ'dju:st] [tu:; tə][ðə; ði] ['stændəd] [taɪp] , [ɑ:(r); ə(r)][ˈsɪmələ(r)][ˈɒbdʒɪkts] .

when reduced to the standard type , are similar objects .

什么时候 减少 到 这 标准 类型 , 是 相似的 对象 .

当简化为标准类型时, 它们是相似的对象。

[ðə; ði] [mi:n] ['sɜ:fɪs] ['braɪtnəs] [ɪz] ['kɒnstənt] , [ænd; ənd][ðə; ði][ˌlu:mɪ'nɒsəti][ɒv; əv][ðə; ði]['nju:kliəs] ,
The mean surface brightness is constant , and the luminosity of the nucleus ,
这意思是表面亮度是持续的 , 和这亮度的这核 ,
[æz; əz] ['meɪəd] [baɪ] - ,
as measured by Hopmann ,
作为测量经过 - ,

平均表面亮度是恒定的，而根据霍普曼测量，原子核的亮度为：

[ɪz][ə; eɪ] ['kɒnstənt] ['frækʃn] , [ə'baʊt][wʌn] - [fɔ:θ] , [ɒv; əv][ðə; ði]['təʊt(ə)l][ˌlu:mɪ'nɒsəti][ɒv; əv][ðə; ði]
is a constant fraction , about one - fourth , of the total luminosity of the
是一个持续的分数 , 关于一 - 第四 , 的这全部的亮度 的 这
['nebju:li:] .
nebulae .
星云 .

是星云总光度的一个固定比例，大约为四分之一。

[ɪf] [ðəə(r)][ɪz][ə; eɪ][kən'sɪdərəb(ə)l][reɪndʒ][ɪn] ['æbsəlu:t] ['mægnɪtju:d][ænd; ənd] [hens] [ɪn]['æktʃuəl]
If there is a considerable range in absolute magnitude and hence in actual
如果那里是一个大量范围在绝对震级和因此 在 实际的
[daɪ'menʃ(ə)nz] ,
dimensions .
方面 ,

如果绝对值范围很大，因而实际尺寸也存在相当大的差异，

[ðə; ði][smɔ:lə(r)] ['nebju:li:] [mʌst; məst][bi:; bi]['feɪθf(ə)l] ['miniətʃəz] [ɒv; əv][ðə; ði]['lɑ:dʒə(r)][wʌnz] .
the smaller nebulae must be faithful miniatures of the larger ones .
这较小的星云必须 是 忠实微缩模型的这更大的一个 .

较小的星云一定是较大星云的忠实缩影。

['æbsəlu:t] ['mægnɪtju:d] [ɒv; əv]['ekstrə] - [gə'læktɪk] ['nebju:li:]
ABSOLUTE MAGNITUDES OF EXTRA - GALACTIC NEBULAE
绝对 震级 的 额外的 - 银河系 星云

银河系外星云的绝对星等

[rɪ'laɪəb(ə)l][ˈvælju:z][ɒv; əv] ['dɪstənsɪz] , [ænd; ənd] [hens] [ɒv; əv] ['æbsəlu:t] ['mægnɪtju:d] ,
Reliable values of distances , and hence of absolute magnitudes ,
可靠的 值 的 距离 , 和 因此 的 绝对 震级 ,

可靠的距离值，进而可靠的绝对量级，

[ɑ:(r); ə(r)] [rɪ'strɪktɪd] [tu:; tə][ə; eɪ] ['veri] [fju:] [ɒv; əv][ðə; ði] [bɹ'aɪtəst] ['nebju:li:] .
are restricted to a very few of the brightest nebulae .
是 受限制的 到 一个 非常 很少 的 这 最亮的 星云 .

仅限于极少数最明亮的星云。

[ði:z] [ɑ:(r); ə(r)] [dɪ'raɪvd] [frɒm; frəm][ə; eɪ] ['stʌdi] [ɒv; əv][ˌɪndɪ'vɪdʒuəl] [stɑ:z] [ɪn'vɒlvd] [ɪn][ðə; ði] ['nebju:li:] ,
These are derived from a study of individual stars involved in the nebulae ,
这些 是 衍生的 从 一个 学习 的 个人 明星 涉及 在 这 星云 ,

这些数据来源于对星云中单个恒星的研究。

[ə'mʌŋ] [wɪtʃ] ['sɜ:t(ə)n] [taɪps] [hæv; həv] [bi:n] [aɪ'dentɪfaɪd] [hu:z] ['æbsəlu:t] ['mægnɪtju:d] [ɪn][ðə; ði]
among which certain types have been identified whose absolute magnitudes in the
之中 哪个 肯定 类型 有 到过 已识别 谁 绝对 震级 在 这

[gə'læktɪk] ['sɪstəm] [ɑ:(r); ə(r)] [wel] [nəʊn] .
galactic system are well known .
银河系 系统 是 出色地 已知 .

其中某些类型的天体已被确定，它们在银河系中的绝对星等是众所周知的。

[ðə; ði] ['meθəd] [ə'sju:mz] [ðæt]
The method assumes that
这 方法 假设 那

该方法假设

[ðə; ði] { - }
the { 36 }
这 { - }

[stɑ:z] [ɪn'vɒlvd] [ɪn][ðə; ði] ['nebʊli:] [ɑ:(r); ə(r)] [də'rektli] ['kɒmpərəb(ə)l] [wɪð] [ðə; ði] [stɑ:z] [ɪn]['aʊə(r)] [əʊn]
stars involved in the nebulae are directly comparable with the stars in our own
明星 涉及 在 这 星云 是 直接地 可比 和 这 明星 在 我们的 自己的
[ˈsɪstəm] ,
system ,
系统 ,

星云中的恒星与我们太阳系中的恒星具有直接可比性。

[ænd; ænd] [ðɪs] [ɪz] [sə'pɔ:rtɪd] [baɪ][ðə; ði] [kən'sɪstənsi] [ɒv; əv][ðə; ði] [rɪ'zʌlts] [dɪ'raɪvd] [frɒm; frəm][ðə; ði]
and this is supported by the consistency of the results derived from the
和 这 是 有 经过 这 一致性 的 这 结果 衍生的 从 这
[ˈsevrəl] [ˈdɪfrənt] [taɪps] [wɪtʃ] [hæv; həv] [bi:n] [aɪ'dentɪfaɪd] .
several different types which have been identified .
一些 不同的 类型 哪个 有 到过 已识别 .

这一点也得到了已识别的几种不同类型所得出的结果的一致性的支持。

[ˈteɪb(ə)] [ˌeks, aɪˈvi:]
TABLE XIV
桌子 十四

表十四

[taɪp] [ˌem'en] - [ˌem'ti:] ['nʌmbə(r)]
Type mn - mT Number
类型 明尼苏达州 - 公吨 数字

mn 型 - mT 编号

E0 - E3 [wʌn] . - ([naɪn])
E0 - E3 1 . 64 (9)
E0 - E3 1 . - (9)

E0-E3 1.64 (9)

E4 - E7 [wʌn] . - (['sevən])
E4 - E7 1 . 43 (7)
E4 - E7 1 . - (7)

E4-E7 1.43 (7)

[ˈes.eɪ] - [ˌes,bi:'eɪ] - . - ([faɪv]) [wʌn] . - [wen] [en] . [dʒi:] . [si:] . - [ɪz] [əʊ'mɪtɪd]
Sa - SBa 0 . 97 (5) 1 . 27 when N . G . C . 5866 is omitted
萨 - 小企业管理局 - . - (5) 1 . - 什么时候 N . G . C . - 是 省略

Sa-SBa 0.97 (5) 1.27 (省略 NGC 5866)

[ˈsʌmbədi] - [ˌes,bi:'bi:] [wʌn] . - (-)
Sb - SBb 1 . 70 (11)
某人 - sbb 1 . - (-)

Sb-SBb 1.70 (11)

[ˌes'si:] - [ˌes,bi:'si:] [wʌn] . - ([faɪv]) [wʌn] . - [wen] [en] . [dʒi:] . [si:] . - [ɪz] [əʊ'mɪtɪd]
Sc - SBc 1 . 76 (5) 1 . 19 when N . G . C . 5194 is omitted
Sc - sbc 1 . - (5) 1 . - 什么时候 N . G . C . - 是 省略

Sc-SBc 1.76 (5) 1.19 (省略 NGC 5194)

[ˌʌn'wertɪd] [mi:n] [wʌn] . - (-) [wʌn] . - (-)
Unweighted mean 1 . 50 (37) 1 . 45 (35)
未加权 意思是 1 . - (-) 1 . - (-)

未加权平均值 1.50 (37) 1.45 (35)

[ˈweɪtɪd]

Weighted

加权

[miːn]

mean

意思是

[wʌn]

1

1

·

55

·

[37]

(37)

(-)

[wʌn]

1

1

·

52

·

[35]

(35)

(-)

加权平均值 1.55 (37) 1.52 (35)

[ˈteɪb(ə)]

TABLE

桌子

[ˈɛksˈviː]

XV

十五

表十五

[ˈæbsəluːt]

Absolute

绝对

[ˈmæɡnɪtjuːd]

Magnitudes

震级

[ɒv; əv]

of

的

[ˈnebjʊ.liː]

Nebulae

星云

星云的绝对星等

[ˈsɪstəm]

System

系统

[,ɛmˈtiː]

MT

公吨

[,emˈes]

MS

多发性硬化症

系统 MT MS

[ˈɡæləksi]

Galaxy

星系

-

5

-

[faɪv]

5

[faɪv]

银河系 −5.5

[em]

M

M

-

31

-

[wʌn]

17

[sɪks]

·

1

·

[faɪv]

6

[faɪv]

·

5

·

[faɪv]

5

[faɪv]

M 31 −17.1 6.5

[ˈelˈɛmsˈiː]

LMC

伦敦地铁公司

-

17

-

[eit]

0

[eit]

·

8

·

[eit]

0

[eit]

·

0

·

[eit]

0

[eit]

LMC 17.0 8.0

[,ɛsˈɛmˈsiː]

SMC

SMC

-

16

-

[faɪv]

0

[faɪv]

·

5

·

[faɪv]

5

[faɪv]

·

5

·

[faɪv]

5

[faɪv]

SMC 16.0 5.5

[em]

M

M

-

33

-

[wʌn]

15

[sɪks]

·

1

·

[faɪv]

6

[faɪv]

·

5

·

[faɪv]

5

[faɪv]

M 33 15.1 6.5

[en]

N

N

·

G

·

[dʒiː]

C

[dʒiː]

·

6822

·

[siː]

13

[siː]

·

7

·

[ˈsɛvən]

5

[ˈsɛvən]

·

8

·

[faɪv]

8

[faɪv]

·

8

·

[eit]

8

[eit]

NGC 6822 13.7 5.8

[em]

M

M

-

101

-

[faɪv]

13

[faɪv]

·

5

·

[sɪks]

6

[sɪks]

·

3

·

[θriː]

3

[θriː]

M 101 13.5 −6.3

[em]

M

M

-

32

-

[θriː]

13

[θriː]

·

3

·

[sɪks]

6

[sɪks]

·

3

·

[θriː]

3

[θriː]

M 32 −13.3−6.3

-

9

-

[naɪn]

9

[naɪn]

·

0

·

[,emˈes]

MS

多发性硬化症

-

9

-

[,ɛmˈtiː]

MT

公吨

-9.0 = MS − MT

[mi:nz] - - . [wʌn] - - . [θri:]
Means - 15 . 1 - 15 . 3
方法 - - . 1 - - . 3

平均值 -15.1 -15.3

[ə'dɒptɪd] - - . [tu:'tu:]
Adopted - 15 . 2
已采用 - - . 2

采纳 -15.2

[ɪn][t'eɪb(ə)][i'eks'vi:] [ɑ:(r); ə(r)] [lɪstɪd] [ˈæbsəlu:t] ['mægnɪtju:d] [ɒv; əv][ðə; ði][ɪn'taɪə(r)] [sɪstəm] [ænd; ənd][ɒv; əv]
In Table XV are listed absolute magnitudes of the entire system and of
在 桌子 十五 是 列出 绝对 震级 的 这 全部的 系统 和 的
[ðə; ði] [bɪ'artəst] [stɑ:z] [ɪn'vɒlvd] ,
the brightest stars involved ,
这 最亮的 明星 涉及 ,

表十五列出了整个星系以及其中最亮恒星的绝对星等。

[fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði][ˈgæləksi][ænd; ənd][ðə; ði][ˈsev(ə)n] [ˈnebʊ.li:] [hu:z] [ˈdɪstənsɪz] [ɑ:(r); ə(r)] [nəʊn] .
for the galaxy and the seven nebulae whose distances are known .
为了 这 星系 和 这 七 星云 谁 距离 是 已知 .
对于该星系和距离已知的七个星云而言。

[ðə; ði][ˈdeɪtə][fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði][mægə'læni:k] [klaʊdz] [ɑ:(r); ə(r)][ˈteɪkən][frɒm; frəm] [ˈjæpli:z] [ɪnˌvestə'geɪən]
The data for the Magellanic Clouds are taken from Shapley's investigations
这 数据 为了 这 麦哲伦 云 是 已采取 从 沙普利 调查
.
:
.

麦哲伦星云的数据取自沙普利的研究。

[ðə; ði] [ˈæbsəlu:t] ['mægnɪtju:d] [ɒv; əv][ðə; ði] [rɪ'meɪnɪŋ] [ˈnebʊ.li:] [wɜ:(r); wə(r)] [dɪ'raɪvd] [frɒm; frəm]
The absolute magnitudes of the remaining nebulae were derived from
这 绝对 震级 的 这 其余的 星云 是 衍生的 从
- [ə'pærənt] ['mægnɪtju:d] [ænd; ənd][ðə; ði] [ˈdɪstənsɪz] [æz; əz] [dɪ'tɜ:mɪnd] [æt; ət] [maʊnt]
Holetschek's apparent magnitudes and the distances as determined at Mount
- 明显 震级 和 这 距离 作为 决定 在 山
[ˈwɪlsn] ,
Wilson ,
威尔逊 ,

其余星云的绝对星等是根据霍列切克的视星等和威尔逊山天文台测定的距离推导出来的。

[weə(r)] [ðə; ði][ˈstelə(r)]['mægnɪtju:d] [wɜ:(r); wə(r)][ˈɔ:lsəʊ] [dɪ'tɜ:mɪnd] .
where the stellar magnitudes were also determined .
在哪里 这 恒星 震级 是 还 决定 .

同时还测定了恒星的星等。

[em] - [ɪz][ˈdʒen(ə)rəli] [ə'sju:md] [tu; tə][bi; bi][ə'səʊsiəɪtɪd; ə'səʊʃiəɪtɪd] [wɪð] [ðə; ði] [greɪt] [ˈspɑɪrəl][em] - ,
M 32 is generally assumed to be associated with the great spiral M 31 ,
M - 是 一般来说 假定 到 是 联系 和 这 伟大的 螺旋 M - ,
人们普遍认为 M 32 与大旋涡星系 M 31 有关联。

[brɪ'kəz; brɪ'kɒz][ðə; ði][ˈreɪdiəl] [və'lɑ:sətɪz] [ɑ:(r); ə(r)] [ˈni:li] [iˈkwəl][ænd; ənd][ɑ:(r); ə(r)] [ju'ni:k] [ɪn] [ðæt] { - }
because the radial velocities are nearly equal and are unique in that { 37 }
因为 这 径向 速度 是 几乎 平等的 和 是 独特的 在 那 { - }
因为径向速度几乎相等，并且是唯一的{37}

[ðeɪ] [ɑː(r); ə(r)][ðə; ði][ˈəʊnli] [lɑːdʒ] [ˈneɡətɪv] [vəˈlɑːsətɪz] [ðæt] [hæv; həv] [biːn] [faʊnd] [əˈmɒŋ] [ðə; ði][ˈekstrə]
they are the only large negative velocities that have been found among the extra
他们是这仅有的大的消极的速度那有到过成立之中这额外的
- [gəˈlæktɪk] [ˈnebjʊ.liː] .
- **galactic nebulae** .
- 银河系 星云 .

它们是目前在河外星云中发现的唯一大的负速度。

[em] - [hæz; həz] [biːn] [ˈædɪd] [tuː; tə][ðə; ði][lɪst][ɒn][ˈrɑːðə(r)] [wiːk] [ˈeɪdəns] .
M 101 has been added to the list on rather weak evidence .
M - 有到过额外到这列表在相当虚弱的证据 .
M 101 被列入名单，但证据相当薄弱。

[ðə; ði] [bɹˈaɪtəst] [stɑːz] [ɪnˈvɒlvd] [ɑː(r); ə(r)] [ˈslaɪtli] [brʌɪtə] [ðæn; ðən] [əˈpærənt] [ˈmæɡnɪtjuːd] - . - ,
The brightest stars involved are slightly brighter than apparent magnitude 17 . 0 ,
这最亮的明星涉及是轻微地更亮比明显震级 - . - ,
其中最亮的恒星亮度略高于视星等 17.0。

[ænd; ənd] [ˈsevrəl] [ˈveriəbl] [hæv; həv] [biːn] [faʊnd] [wɪð] [ˈmæɡnɪtjuːd] [æt; ət][ˈmæksɪmə][ˈfeɪntə(r)]
and several variables have been found with magnitudes at maxima fainter
和 一些 变量 有 到过 成立 和 震级 在 最大值 较暗
[ðæn; ðən] - . . - .
than 19 . 0 .
比 - . - .
已经发现一些变星的最大星等比 19.0 星等暗。

[səˈfɪ(ə)nt] [ɑːbzərˈveɪʃənz] [hæv; həv][nɒt] [jet] [biːn] [əˈkjuːmjələɪtɪd][tuː; tə] [dɪˈtɜːmɪn] [ðə; ði] [laɪt] -
Sufficient observations have not yet been accumulated to determine the light -
充足的 观察 有 不是 然而 到过 积累 到 决定 这 光 -
[kɜːrvz] [ɒv; əv][ðə; ði] [ˈveriəbl] ,
curves of the variables ,
曲线 的 这 变量 ,
目前尚未积累足够的观测数据来确定这些变星的光变曲线。

[bʌt; bət][frɒm; frəm][əˈnælədʒi] [wɪð] [ðə; ði][ˈləðə(r)] [ˈnebjʊ.liː] [ðeɪ] [ɑː(r); ə(r)] [prɪˈzjuːmd] [tuː; tə][biː; bi]
but from analogy with the other nebulae they are presumed to be
但 从 类比 和 这 其他 星云 他们 是 假定 到 是
[ˈsefiːɪd] .
Cepheids .
造父变星 .
但根据与其他星云的类比，它们被认为是造父变星。

[ɒn] [ðɪs] [əˈsʌmpjən] ,
On this assumption ,
在 这 假设 ,
基于此假设，
[bəʊθ][ðə; ði][stɑː(r)] [kaʊnts] [ænd; ənd][ðə; ði] [ˈveriəbl] [liːd] [tuː; tə][ə; eɪ] [ˈdɪstəns] [ɒv; əv][ðə; ði][ˈɔːdə(r)]
both the star counts and the variables lead to a distance of the order
两个都 这 星星 计数 和 这 变量 带领 到 一个 距离 的 这 命令
[ɒv; əv][wʌŋ] . [ˈsevən][taɪmz][ðə; ði] [ˈdɪstəns] [ɒv; əv][em] - .
of 1 . 7 times the distance of M 33 .
的 1 . 7 时代 这 距离 的 M - .
恒星数量和变星数量都表明，该星系的距离约为 M 33 距离的 1.7 倍。

[ðə; ði] [ɪnˈkluːʒn] [ɒv; əv][em] - [dʌz] [nɒt] [tʃeɪndʒ] [ðə; ði] [miːn] [ˈmæɡnɪtjuːd][ɒv; əv][ðə; ði] [bɹˈaɪtəst]
The inclusion of M 101 does not change the mean magnitude of the brightest
这 包容性 的 M - 做 不是 改变 这 意思是 震级 的 这 最亮的
[stɑːz] [ɪnˈvɒlvd] ,
stars involved ,
明星 涉及 ,
将M 101纳入观测范围并不会改变其中最亮恒星的平均星等。

[bʌt; bət][ˌɪdʒ'u:sɪz][ðə; ði] [mi:n] ['mæɡnɪtju:d][ɒv; əv][ðə; ði] ['nebjʊ,li:] [baɪ] - . [tu:'tu:] .

but reduces the mean magnitude of the nebulae by 0 . 2 .

但 减少 这 意思是 震级 的 这 星云 经过 - . 2 .

但会使星云的平均星等减少 0.2。

[ðə; ði][reɪndʒ][ɪn][ðə; ði] [stɑ:z] [ɪn'vɒlvd] [ɪz][ə'baʊt][tu:'tu:] . [faɪv][mæg] . ,

The range in the stars involved is about 2 . 5 mag . ,

这 范围 在 这 明星 涉及 是 关于 2 . 5 杂志 . ,

涉及的恒星亮度范围约为2.5等。

[ænd; ənd][ɪn][ðə; ði]['təʊt(ə)] [ˌlu:mi'nɒsəti] [ɒv; əv][ðə; ði] ['nebjʊ,li:] , [ə'baʊt][θri:] . [eit][mæg] .

and in the total luminosities of the nebulae , about 3 . 8 mag .

和 在 这 全部的 亮度 的 这 星云 , 关于 3 . 8 杂志 .

星云的总亮度约为 3.8 等。

[ðɪs] ['lætə(r)][ɪz] [kən'sɪstənt] [wɪð] [ðə; ði]['skætə(r)][ɪn][ðə; ði]['daɪəgræm][ɪɡ'zɪbɪtɪŋ; eg'zɪbɪtɪŋ][ðə; ði][rɪ'leɪ(ə)n]

This latter is consistent with the scatter in the diagram exhibiting the relation

这 后者 是 持续的 和 这 分散 在 这 图表 展出 这 关系

[bɪ'twi:n] ['təʊt(ə)] [ˌlu:mi'nɒsəti] [ænd; ənd][da'ɪæmɪtəz] .

between total luminosities and diameters .

之间 全部的 亮度 和 直径 .

后者与显示总光度和直径之间关系的图表中的散点一致。

[ðə; ði][ə'səʊsiəriɪd; ə'səʊʃiəriɪd]['ɒbdʒɪkts] , [em] - [ænd; ənd] - , [reprɪ'zent] [ðə; ði] [ɪk'stri:m] ['lɪmɪts] [ə'mʌŋ]

The associated objects , M 31 and 32 , represent the extreme limits among

这 联系 对象 , M - 和 - , 代表 这 极端 限制 之中

[ðə; ði] [nəʊn] ['sɪstəmz] ,

the known systems ,

这 已知 系统 ,

相关天体 M 31 和 32 代表了已知系统中的极端情况。

[ænd; ənd][ðə; ði] [mi:n] [ɒv; əv] [ði:z] [tu:] [ɪz] ['veri] [kləʊz][tu:; tə][ðə; ði] [mi:n] [ɒv; əv][ðem; ðəm][ɔ:l] .

and the mean of these two is very close to the mean of them all .

和 这 意思是 的 这些 二 是 非常 关闭 到 这 意思是 的 他们 全部 .

这两个值的平均值与所有值的平均值非常接近。

[ˌlu:mi'nɒsəti] [ɒv; əv] [stɑ:z] [ɪn'vɒlvd] [ɪn] ['nebjʊ,li:]

LUMINOSITY OF STARS INVOLVED IN NEBULAE

亮度 的 明星 涉及 在 星云

星云中恒星的光度

[ðə; ði]['nʌmbə(r)][ɒv; əv] ['nebjʊ,li:] [ɒv; əv] [nəʊn] ['dɪstəns] [ɪz] [tu:] [smɔ:l] [tu:; tə] [sɜ:v] [æz; əz][ə; eɪ]['beɪsɪs]

The number of nebulae of known distance is too small to serve as a basis

这 数字 的 星云 的 已知 距离 是 也 小的 到 服务 作为一个 基础

[fɔ:(r); fə(r)] ['estɪmeɪts] [ɒv; əv][ðə; ði][reɪndʒ][ɪn] ['æbsəlu:t] ['mæɡnɪtju:d] [ə'mʌŋ] ['nebjʊ,li:] [ɪn]['dʒen(ə)rəl] .

for estimates of the range in absolute magnitude among nebulae in general .

为了 估算 的 这 范围 在 绝对 震级 之中 星云 在 一般的 .

已知距离的星云数量太少，不足以作为估算星云绝对星等范围的依据。

['fɜ:ðə(r)] [ɪnfə'meɪ(ə)n] , [haʊ'evə(r)] ,

Further information , however ,

更远 信息 , 然而 ,

但还有更多信息，

[kæn; kən][bi:; bi] [dɪ'raɪvd] [frɒm; frəm][ə; eɪ][kəm'pærɪs(ə)n][ɒv; əv]['təʊt(ə)] [ə'pærənt] ['mæɡnɪtju:d] [wɪð]

can be derived from a comparison of total apparent magnitudes with

能 是 衍生的 从 一个 比较 的 全部的 明显 震级 和

[ə'pærənt] ['mæɡnɪtju:d] [ɒv; əv][ðə; ði] [bɪ'aɪtəst] [stɑ:z] [ɪn'vɒlvd] ,

apparent magnitudes of the brightest stars involved ,

明显 震级 的 这 最亮的 明星 涉及 ,

可以通过比较总视星等与其中最亮恒星的视星等得出。

[ɒŋ][ðə; ði] [ˈriːznəbl] [əˈsʌmpn] , [səˈpɔːrtɪd] [baɪ] [sʌtʃ] [ˈeɪdɪəns] [æz; əz][ɪz][əˈveɪləb(ə)l] ,
on the reasonable assumption , supported by such evidence as is available ,
在这合理的假设 , 有经过这样的证据作为是可用的 ,
基于合理的假设, 并有现有证据支持,

[ðæt][ðə; ði] [bɹˈaɪtəst] [stɑːz][ɪn][ˈaɪsələɪtɪd] [ˈsɪstəmz] [ɑː(r); ə(r)][ɒv; əv][əˈbaʊt][ðə; ði] [seɪm] [ɪnˈtrɪnzɪk]
that the brightest stars in isolated systems are of about the same intrinsic
那这最亮的明星在孤立系统是的关于这相同的固有的
[ˌluːmɪˈnɒsəti] .
luminosity .
亮度 .
孤立星系中最亮的恒星具有大致相同的固有光度。

[ðə; ði][məʊst] [kənˈviːniənt] [prəˈsiːdʒə(r)][ɪz][tuː; tə][test][ðə; ði] [ˈkɒnstənsi] [ɒv; əv][ðə; ði] [ˈdɪfərənsɪz] [ɪn]
The most convenient procedure is to test the constancy of the differences in
这最多方便的程序是到测试这恒常的这差异在
[əˈpærənt] [ˈmæɡnɪtjuːd] [brɪˈtwiːn] [ðə; ði] [bɹˈaɪtəst] [stɑːz] [ɪnˈvɒlvd] [ænd; ənd][ðə; ði] [ˈnebjʊˌliː]
apparent magnitude between the brightest stars involved and the nebulae
明显震级之间这最亮的明星涉及和这星云
[ðəmˈselvz] ,
themselves ,
他们自己 ,
最便捷的方法是检验相关最亮恒星与星云本身之间的视星等差异是否恒定。

[əʊvə(r)][æz; əz][waɪd][ə; eɪ][reɪndʒ][æz; əz][ˈpɒsəb(ə)l][ɪn][ðə; ði][ˈlætə(r)] [kˈwɒntɪtɪz] .
over as wide a range as possible in the latter quantities .
超过作为宽的 一个 范围 作为 可能的 在这 后者 数量 .
后几个数值的范围要尽可能广。

[æn; ən][ɪɡˌzæmɪˈneɪ(ə)n][ɒv; əv][ðə; ði] [ˈfəʊtəɡræfs] [ɪn][ðə; ði] [maʊnt] [ˈwɪlsn] [kəˈlekʃ(ə)n] [hæz; həz]
An examination of the photographs in the Mount Wilson collection has
一个 考试 的 这 照片 在 这 山 威尔逊 收藏 有
[rɪˈviːld] [nəʊ][stɑːz][ɪn][ðə; ði] [ˈveri] [feɪnt][ˈɒbdʒɪkts][ɔː(r)][ɪn][ðə; ði] [brɑːt] [rɪˈlɪptɪk(ə)l] [ˈnebjʊˌliː] [ænd; ənd]
revealed no stars in the very faint objects or in the bright elliptical nebulae and
揭晓 不 明星 在这 非常 头晕的 对象 或者 在这 明亮的 椭圆形 星云 和
[ˈɜːli] - [taɪp] [ˈspɑɪrəlz] .
early - type spirals .
早期的 - 类型 螺旋 .
对威尔逊山天文台照片集的检查显示, 在非常暗淡的天体、明亮的椭圆星云和早期旋涡星系中都没有发现恒星。

[ðɪs] [wɒz; wəz][tuː; tə][biː; bi] [ɪkˈspektɪd] [frɒm; frəm][ðə; ði] [kənˈklʊʒənz] [ˈpriːviəsli] [dɪˈraɪvd] .
This was to be expected from the conclusions previously derived .
这 曾是 到 是 预期的 从 这 结论 之前 衍生的 .
根据之前得出的结论, 这是意料之中的。

[ɑːbzərˈveɪjənz] [wɜː(r); wə(r)] [ˈðeəfɔː(r)] [kənˈfaɪnd][tuː; tə] [ɪntəˈmiːdiət] - [ænd; ənd] [leɪt] - [taɪp] [ˈspɑɪrəlz]
Observations were therefore confined to intermediate - and late - type spirals
观察 是 所以 受限 到 中间的 - 和 晚的 - 类型 螺旋
[ænd; ənd][ðə; ði][ɪˈregjələ(r)] { - }
and the irregular { 38 }
和 这 不规律的 { - }
因此, 观测仅限于中间型和晚期型旋涡星系以及不规则{38}

[ˈnebjʊˌliː] [tuː; tə][ðə; ði] [ˈlɪmɪtɪŋ] [ˈvɪʒuəl][ˈmæɡnɪtjuːd] - . [faɪv] .
nebulae to the limiting visual magnitude 10 . 5 .
星云 到 这 限制 视觉的 震级 - . 5 .
星云的极限视星等为 10.5。

SBb4699 >19 . [faɪv] - . - > [naɪn] . [faɪv]
SBb4699 >19 . 5 10 . 0 > 9 . 5
SBb4699 >19 . 5 - . - > 9 . 5

SBb4699 >19.5 10.0 > 9.5

Sc253 - . [θri:] [naɪn] . [θri:] [naɪn] . - - . [sɪks] ['seɪvən] . - [eit] . - - . [θri:] [eit] . ['seɪvən] [eit] .
Sc253 18 . 3 9 . 3 9 . 0598 15 . 6 7 . 0 8 . 62403 17 . 3 8 . 7 8 .
Sc253 - . 3 9 . 3 9 . - - . 6 7 . - 8 . - - . 3 8 . 7 8 .
- >20 . - [naɪn] . [naɪn] >10 . - - . - [naɪn] . [wʌn] [naɪn] . - - . [faɪv] - . [fɔːr] [eit] .
62683 >20 . 0 9 . 9 >10 . 12903 19 . 0 9 . 1 9 . 94254 18 . 5 10 . 4 8 .
- >20 . - 9 . 9 >10 . - - . 9 . 1 9 . - - . 5 - . 4 8 .
- - . [eit] - . [faɪv] [eit] . - >19 . [faɪv] - . [wʌn] > [naɪn] . - - . [eit] - . [tuː'tuː] [eit] .
14321 18 . 8 10 . 5 8 . 34414 >19 . 5 10 . 1 > 9 . 44490 18 . 8 10 . 2 8 .
- - . 8 - . 5 8 . - >19 . 5 - . 1 > 9 . - - . 8 - . 2 8 .
- - . [θri:] ['seɪvən] . [fɔːr] [naɪn] . - - . [sɪks] - . [fɔːr] [eit] . - - . - [naɪn] . [naɪn] ['seɪvən] .
65194 17 . 3 7 . 4 9 . 95236 18 . 6 10 . 4 8 . 25457 17 . 0 9 . 9 7 .
- - . 3 7 . 4 9 . - - . 6 - . 4 8 . - - . - 9 . 9 7 .

[wʌn]
1
1
Sc253 18.3 9.3 9.0598 15.6 7.0 8.62403 17.3 8.7 8.62683 >20.0 9.9 >10.12903 19.0 9.1 9.94254 18.5 10.4 8.14321
18.8 10.5 8.34414 >19.5 10.1 > 9.44490 18.8 10.2 8.65194 17.3 7.4 9.95236 18.6 10.4 8.25457 17.0 9.9 7.1

[ɪ(r)] .
Irr .
不 .

错误。

[ˈelˈemsˈiː] [naɪn] . [faɪv] - . [faɪv] [naɪn] . -
LMC 9 . 5 0 . 5 9 . 0
伦敦地铁公司 9 . 5 - . 5 9 . -

LMC 9.5 0.5 9.0

[ˌɛsˈɛmˈsiː] - . - [wʌn] . [faɪv] - . - >19 . [faɪv] [naɪn] . - >10 . - - . [eit] [naɪn] . [faɪv] [eit] .
SMC 12 . 0 1 . 5 10 . 53034 >19 . 5 9 . 0 >10 . 54449 17 . 8 9 . 5 8 .
SMC - . - 1 . 5 - . - >19 . 5 9 . - >10 . - - . 8 9 . 5 8 .
- - . [eit] [eit] . [faɪv] ['seɪvən] . [θri:]
36822 15 . 8 8 . 5 7 . 3
- - . 8 8 . 5 7 . 3

SMC 12.0 1.5 10.53034 >19.5 9.0 >10.54449 17.8 9.5 8.36822 15.8 8.5 7.3

[ðə; ði] ['dɛrtə] [ɑː(r); ə(r)] ['lɪstɪd] [ɪn] ['teɪb(ə)] [ˌɛksˈviːˈaɪ] [ænd; ənd] [ɑː(r); ə(r)] [fəʊn] ['græfɪkli] [ɪn] ['fɪgə(r)] - .
The data are listed in Table XVI and are shown graphically in Figure 10 .
这 数据 是 列出 在 桌子 十六 和 是 所示 图形化 在 数字 - .
数据列于表 XVI 中，并以图 10 的形式显示。

[ðə; ði] [ˌluːmɪˈnɒsəti] [ɒv; əv] [ðə; ði] [bɹˈaɪtəst] [stɑːz] [ɑː(r); ə(r)] ['ɡɪv(ə)n] [ɪn] [ˌfəʊtəˈɡræfɪk] [ˌ'mæɡnɪtjuːd] .
The luminosities of the brightest stars are given in photographic magnitudes .
这 亮度 的 这 最亮的 明星 是 给定 在 摄影 震级 .
最亮恒星的亮度以照相星等表示。

[fɔː(r); fə(r)] [ðə; ði] [mæɡəˈlænɪk] [klaʊdz] , [em] - , [ænd; ənd] [en] . [dʒiː] . [siː] . - , [ðiːz] [wɜː(r); wə(r)]
For the Magellanic Clouds , M 33 , and N . G . C . 6822 , these were
为了 这 麦哲伦 云 , M - , 和 N . G . C . - , 这些 是
[əbˈteɪnd] [frɒm; frəm] ['pʌblɪʃt] [stɑː(r)] [kaʊnts] .
obtained from published star counts .
获得 从 已发布 星星 计数 .
对于麦哲伦星云、M 33 和 NGC 6822，这些数字是通过已发表的恒星计数获得的。

[fɔ:(r); fə(r)][em] - , - , - , - , - , [ænd; ənd][en] ! [dʒi:] . [si:] . - , [ðeɪ] [dɪ'pend] [ə'pɒn]
For M 31 , 51 , 63 , 81 , 94 , and N : G : C : 2403 , they depend upon
为了 M - , - , - , - , - , 和 N : G : C : - , 他们 依赖 之上
[ʌn'pʌblɪft] [kaʊnts] ,
unpublished counts ,
未发表的 计数 ,

对于 M 31、51、63、81、94 和 NGC 2403，它们依赖于未发表的计数数据。

[fɔ:(r); fə(r)] [wɪtʃ] [ðə; ði]['mægnɪtju:d] [wɜ:(r); wə(r)] [dɪ'tɜ:mɪnd] [baɪ] [kəm'pærəsɪz] [wɪð] [sɪ'lektɪd] ['eəriəz]
for which the magnitudes were determined by comparisons with Selected Areas
为了 哪个 这 震级 是 决定 经过 比较 和 已选 区域
.
:
.

其量级是通过与选定区域的比较确定的。

[fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði] [rɪ'meɪnɪŋ] ['nebjʊ.li:] , [ðə; ði]['mægnɪtju:d] [pʊ; əv] [stɑ:z] [wɜ:(r); wə(r)] ['estɪmeɪtɪd] [wɪð]
For the remaining nebulae , the magnitudes of stars were estimated with
为了 这 其余的 星云 , 这 震级 的 明星 是 估计的 和
['veəriŋ] [dɪ'gri:z] [pʊ; əv] [prɪ'sɪʒ(ə)n] ,
varying degrees of precision ,
变化 学位 的 精确 ,

对于其余星云，恒星的星等估计精度各不相同。

[bʌt; bət][ɑ:(r); ə(r)] ['prɒbəbli] [les] [ðæn; ðən] - . [faɪv][mæg] . [ɪn]['erə(r)] .
but are probably less than 0 . 5 mag . in error .
但 是 大概 较少的 比 - : 5 杂志 : 在 错误 :

但误差可能小于 0.5 倍。

[fɪg] .
Fig :
如图 :

如图。

- . — [rɪ'leɪ(ə)n] [bɪ'twi:n] ['təʊt(ə)] ['mægnɪtju:d] [pʊ; əv] ['ekstrə] - [gə'læktɪk] ['nebjʊ.li:] [ænd; ənd]
10 . — Relation between total magnitudes of extra - galactic nebulae and
- . — 关系 之间 全部的 震级 的 额外的 - 银河系 星云 和
['mægnɪtju:d] [pʊ; əv] [ðə; ði] [bɪ'ɑ:təst] [stɑ:z] [ɪn'vɒlvd] .
magnitudes of the brightest stars involved .
震级 的 这 最亮的 明星 涉及 .

10.一河外星云总星等与其中最亮恒星星等的关系。

['dɪfərənsɪz] [bɪ'twi:n] ['təʊt(ə)] ['vɪʒʊəl] ['mægnɪtju:d] [pʊ; əv] ['nebjʊ.li:] [ænd; ənd][ðə; ði] [fəʊtə'græfɪk]
Differences between total visual magnitudes of nebulae and the photographic
差异 之间 全部的 视觉的 震级 的 星云 和 这 摄影
['mægnɪtju:d] [pʊ; əv] [ðə; ði] [bɪ'ɑ:təst] [stɑ:z] [ɑ:(r); ə(r)] [plɒtɪd] [ə'genst] [ðə; ði] ['təʊt(ə)] ['mægnɪtju:d] .
magnitudes of the brightest stars are plotted against the total magnitudes .
震级 的 这 最亮的 明星 是 绘制 反对 这 全部的 震级 .

将星云的总视星等与最亮恒星的照相星等之间的差异与总星等作图。

[ðə; ði][da:ts] [ˌreprɪ'zent] [keɪsɪz][ɪn] [wɪtʃ] [ðə; ði] [stɑ:z] [kʊd; kəd] ['æktʃʊəli] [bi:; bi] [dɪ'tektɪd] ;
The dots represent cases in which the stars could actually be detected ;
这 点 代表 案例 在 哪个 这 明星 可以 实际上 是 检测到 ;

这些点代表实际可以探测到恒星的情况；

[ðə; ði] [ɪnkəm'pli:t] [krɔ:sɪz] [ˌreprɪ'zent] [keɪsɪz][ɪn] [wɪtʃ] [stɑ:z] [kʊd; kəd] [nɒt] [bi:; bi] [dɪ'tektɪd] ,
the incomplete crosses represent cases in which stars could not be detected ,
这 未完成 十字架 代表 案例 在 哪个 明星 可以 不是 是 检测到 ,

不完整的十字代表无法探测到恒星的情况。

因此可以给出幅度差的下限。

与线下实际确定的点相当。

[wen] [ə'laʊəns] [ɪz] [meɪd] [fɔ:(r); fə(r)] [ðɪs] [ɪnæk'sesəb(ə)] ['ri:dʒən] ,
When allowance is made for this inaccessible region ,
什么时候 津贴 是 制成 为了 这 无法进入 地区 ,

考虑到这一偏远地区的情况,

[ðə; ði] ['dertə] [kæn; kən] [bi:; bi] [ɪn'tɜ:prətɪd] [æz; əz] ['ʃəʊɪŋ] [ə; eɪ] ['mɒdərət] [dɪ'spɜ:ʃn] [ə'raʊnd] [ðə; ði]
the data can be interpreted as showing a moderate dispersion around the
这 数据 能 是 翻译 作为 显示 一个 缓和 分散 大约 这
[mi:n] [ˈɔ:dɪnət] (['sevn])
mean ordinate (7)
意思是 纵坐标 (7)

数据可以解释为围绕平均纵坐标 (7) 呈现中等程度的离散性。

[ðə; ði] [reɪndʒ] [ɪn] ['təʊt(ə)] ['mægnɪtju:d] [ɪz] [sə'fɪntli] [lɑ:dʒ] [ɪn] [kəm'pærɪs(ə)n] [wɪð] [ðə; ði] [dɪ'spɜ:ʃn]
The range in total magnitudes is sufficiently large in comparison with the dispersion
这 范围 在 全部的 震级 是 足够 大的 在 比较 和 这 分散
[tu:; tə] [lend] [kən'sɪdərəb(ə)] ['kɒnfɪdəns] [tu:; tə] [ðə; ði] [kən'klu:ʒn] .
to lend considerable confidence to the conclusion .
到 借 大量 信心 到 这 结论 .

与离散程度相比,总震级范围足够大,这足以使结论具有相当大的可信度。

[ðə; ði] ['təʊt(ə)] [reɪndʒ] [ɒv; əv] [fɔ:(r)] , [ænd; ənd] [ðə; ði] ['ævərɪdʒ] [dɪ'spɜ:ʃn] [ɒv; əv] [les] [ðæn; ðən] [wʌn]
The total range of four , and the average dispersion of less than 1
这 全部的 范围 的 四 , 和 这 平均的 分散 的 较少的 比 1
[mæg] . ,
mag : ,
杂志 : ,

总射程为4,平均偏差小于1星等。

[ɑ:(r); ə(r)] ['kɒmpərəb(ə)] [wɪð] [ðəʊz] [ɪn] ['teɪb(ə)] ['eks'vi:] [ænd; ənd] [ɪn] ['fɪgə(r)] ['sevn] ,
are comparable with those in Table XV and in Figure 7 ,
是 可比 和 那些 在 桌子 十五 和 在 数字 7 ,

与表十五和图 7 中的数据相当,

[ænd; ənd] [ə'gri:] [wɪð] [ðə; ði] ['fɔ:mə(r)] [ɪn] ['ɪndɪkertɪŋ] [ə; eɪ] ['kɒnstənt] [ˈɔ:də(r)] [ɒv; əv] ['æbsəlu:t] ['mægnɪtju:d]
and agree with the former in indicating a constant order of absolute magnitude
和 同意 和 这 以前的 在 表明 一个 持续的 命令 的 绝对 震级
.
:
.

并且与前者一致认为绝对量级是恒定的。

[ðə; ði] [mi:n] ['æbsəlu:t] ['mægnɪtju:d] [ɒv; əv] [ðə; ði] [bɪ'artəst] [stɑ:z] [ɪn] [ðə; ði] ['nebjʊ,li:] ['lɪstɪd] [ɪn] ['teɪb(ə)]
The mean absolute magnitude of the brightest stars in the nebulae listed in Table
这 意思是 绝对 震级 的 这 最亮的 明星 在 这 星云 列出 在 桌子
['eks'vi:] ,
XV ,
十五 ,

表十五所列星云中最亮恒星的平均绝对星等

[kəm'baɪnd] [wɪð] [ðə; ði] [mi:n] ['dɪfrəns] [bɪ'twi:n] ['nebjʊ,li:] [ænd; ənd] [ðeə(r)] [bɪ'artəst] [stɑ:z] ,
combined with the mean difference between nebulae and their brightest stars ,
合并 和 这 意思是 不同之处 之间 星云 和 他们的 最亮的 明星 ,

结合星云与其最亮恒星之间的平均差异,

['fə:nɪʃ] [ə; eɪ] [mi:n] ['æbsəlu:t] ['mægnɪtju:d] [ɒv; əv] - - . [θri:] [fɔ:(r); fə(r)] [ðə; ði] ['nebjʊ,li:] ['lɪstɪd] [ɪn]
furnishes a mean absolute magnitude of - 15 . 3 for the nebulae listed in
提供 一个 意思是 绝对 震级 的 - - : 3 为了 这 星云 列出 在
['teɪb(ə)] [,eks'vi:'aɪ] .
Table XVI :
桌子 十六 :

表十六所列星云的平均绝对星等为 -15.3。

[ðɪs] [ˈdɪfəz] [baɪ][ˈəʊnli] - : [tuːˈtuː][ˈmæg] . [frəm; frəm][ðə; ði] [ˈævərɪdʒ] [ɒv; əv][ðə; ði] [ˈneɪbjʊ.li:] [ɪn][ˈteɪb(ə)]
This differs by only 0.2 mag. from the average of the nebulae in Table
这 不同 经过 仅有的 - : 2 杂志 : 从 这 平均的 的 这 星云 在 桌子
[ˈeksˈvi:] ,
XV ,
十五 ,

这与表十五中星云的平均值仅相差0.2星等。

[ænd; ənd][ðə; ði] [miːn] [ɒv; əv][ðə; ði] [tuː] , - - . [tuːˈtuː] ,
and the mean of the two , - 15 : 2 ,
和 这 意思是 的 这 二 , - - . 2 ,

两者的平均值为 -15.2,

[kæn; kən][biː; bi] [juːst] [æz; əz][ðə; ði] [ˈæbsəluːt] [ˈmæɡnɪtjuːd][ɒv; əv] [ɪntəˈmiːdiət] - [ænd; ənd] [leɪt] - [taɪp]
can be used as the absolute magnitude of intermediate - and late - type
能 是 用过的 作为 这 绝对 震级 的 中间的 - 和 晚的 - 类型
[ˈspaɪrəlz][ænd; ənd][ɪˈregjələ(r)] [ˈneɪbjʊ.li:] [huːz] [əˈpærənt] [ˈmæɡnɪtjuːd] [ɑː(r); ə(r)] [braɪtə] [ðæn; ðən] - .
spirals and irregular nebulae whose apparent magnitudes are brighter than 10 .
螺旋 和 不规则的 星云 谁 明显 震级 是 更亮 比 - :
[faɪv] .
5 :
5 .

可作为视星等比 10.5 更亮的中间型和晚期型旋涡星系和不规则星云的绝对星等。

[ðə; ði] [dɪˈspɜːʃn] [ɪz] [smɔːl] [ænd; ənd][kæn; kən] [ˈseɪfli] [biː; bi] [nɪˈɡlektɪd] [ɪn][stəˈtɪstɪk(ə)l] [ɪnˌvestəˈɡeɪʃən] .
The dispersion is small and can safely be neglected in statistical investigations .
这 分散 是 小的 和 能 安全 是 被忽视的 在 统计 调查 .

离散程度很小，在统计调查中可以忽略不计。

[ðɪs] [ɪz][æz; əz][faː(r)][æz; əz][ðə; ði] [ˈpɒzətɪv] [ˈeɪvɪdəns] [kæn; kən][biː; bi] [ˈfɒləʊd] .
This is as far as the positive evidence can be followed .
这 是 作为 远的 作为 这 积极的 证据 能 是 随后 .

积极证据仅限于此。

[fɔː(r); fə(r)] [ˈriːz(ə)nz] [ɔːlˈredi] [ˈɡɪv(ə)n] , [haʊˈevə(r)] , [aɪˈtiː][ɪz] [prɪˈzjuːmd] [ðæt] [ðə; ði] [ˈɜːliə(r)] [ˈneɪbjʊ.li:] ,
For reasons already given , however , it is presumed that the earlier nebulae ,
为了 原因 已经 给定 , 然而 , 它 是 假定 那 这 早些时候 星云 ,

然而，基于前面提到的原因，人们推测早期的星云，

[ðə; ði] [ɪˈlɪptɪk(ə)l] [ænd; ənd][ðə; ði] [ˈɜːli] - [taɪp] [ˈspaɪrəlz] , [ɑː(r); ə(r)][ɒv; əv][ðə; ði] [seɪm] [ˈɔːdə(r)][ɒv; əv]
the elliptical and the early - type spirals , are of the same order of
这 椭圆形 和 这 早期的 - 类型 螺旋 , 是 的 这 相同的 命令 的
[ˈæbsəluːt] [ˈmæɡnɪtjuːd][æz; əz][ðə; ði][ˈleɪtə(r)] .
absolute magnitude as the later .
绝对 震级 作为 这 之后 .

椭圆星系和早期型旋涡星系的绝对星等与后期型旋涡星系处于同一数量级。

[ðə; ði][wʌn][ɪˈlɪptɪk(ə)l][ˈneɪbjələ] [huːz] [ˈdɪstəns] [ɪz] [nəʊn] , [em] - , [ɪz] [kənˈsɪstənt] [wɪð] [ðɪs]
The one elliptical nebula whose distance is known , M 32 , is consistent with this
这 一 椭圆形 星云 谁 距离 是 已知 , M - , 是 持续的 和 这
[haɪˈpəθəsɪs] .
hypothesis .
假设 .

目前已知距离的唯一椭圆星云 M 32 与这一假设相符。

[kən'klʊʒənz] [kən'sɜ:nɪŋ] [ðə; ði][ɪn'trɪnzɪk] [ˌlu:mɪ'nɒsəti] [ɒv; əv][ðə; ði] [ə'pærəntli] ['feɪntə(r)] ['nebʊ,li:]
Conclusions concerning the intrinsic luminosities of the apparently fainter nebulae
结论 有关 这 固有的 亮度 的 这 显然 较暗 星云
[ɑ:(r); ə(r)][ɪn][ðə; ði]['neɪtʃə(r)][ɒv; əv] [ɪk'stræpə'leɪʃn] [ɒv; əv][ðə; ði] [rɪ'zʌlts] [faʊnd][fʊ:(r); fə(r)][ðə; ði] [braɪtə]
are in the nature of extrapolations of the results found for the brighter
是 在 这 自然 的 推断 的 这 结果 成立 为了 这 更亮
[ˈɒbdʒɪkts] .
objects .
对象 .

对于看似较暗的星云的固有光度，我们得出的结论本质上是对较亮天体的研究结果进行外推。

[wen] [ðə; ði] ['nebʊ,li:] [ɑ:(r); ə(r)] [rɪ'dju:st] [tu:; tə][ə; eɪ] ['stændəd] [taɪp] ,
When the nebulae are reduced to a standard type ,
什么时候 这 星云 是 减少 到 一个 标准 类型 ,
当星云被简化为标准类型时,
[ðeɪ] [ɑ:(r); ə(r)] [faʊnd] [tu:; tə][bi:; bi] [kən'strʌktɪd] [ɒn][ə; eɪ]['sɪŋg(ə)l]['mɒd(ə)l] ,
they are found to be constructed on a single model ,
他们 是 成立 到 是 建造 在 一个 单身的 模型 ,
经查明，它们是基于同一模型构建的。

[wɪð] [ðə; ði]['təʊt(ə)l] [ˌlu:mɪ'nɒsəti] ['veəriɪŋ] [də'rektli][æz; əz][ðə; ði][skweə(r)][ɒv; əv][ðə; ði][da'ɪæmɪtəz] .
with the total luminosities varying directly as the square of the diameters .
和 这 全部的 亮度 变化 直接地 作为 这 正方形 的 这 直径 .
总光度与直径的平方成正比。

[ðə; ði][məʊst]['dʒen(ə)rəl] [ɪn,tɜ:prə'teɪʃ(ə)n] [ɒv; əv] [ðɪs] [rɪ'leɪʃ(ə)n][ɪz] [ðæt] [ðə; ði] [mi:n] ['sɜ:fɪs] ['braɪtnəs]
The most general interpretation of this relation is that the mean surface brightness
这 最多 一般的 解释 的 这 关系 是 那 这 意思是 表面 亮度
[ɪz] ['kɒnstənt] ,
is constant ,
是 持续的 ,
对这种关系最普遍的解释是，平均表面亮度是恒定的。

[bʌt; bət][ðə; ði] [smɔ:l] [reɪndʒ][ɪn] ['æbsəlu:t] ['mægnɪtju:d] [ə'mʌŋ] [ðə; ði] [braɪtə] ['nebʊ,li:] ['ɪndɪkeɪts] [ðæt]
but the small range in absolute magnitudes among the brighter nebulae indicates that
但 这 小的 范围 在 绝对 震级 之中 这 更亮 星云 表示 那
,
,
,
,
但较亮星云之间绝对星等的微小差异表明，

[ə'mʌŋ] [ðɪ:z] [ˈɒbdʒɪkts][æt; ət] [li:st] ,
among these objects at least ,
之中 这些 对象 在 至少 ,
至少在这些物体中,
[ðə; ði][rɪ'leɪʃ(ə)n] ['mɪəli] [ɪk'spresɪz] [ðə; ði][ɒpə'reɪʃ(ə)n] [ɒv; əv][ðə; ði] [ɪn'vɜ:s] - [skweə(r)] [lɔ:] [ɒn]
the relation merely expresses the operation of the inverse - square law on
这 关系 仅仅 表达 这 手术 的 这 逆 - 正方形 法律 在
['kɒmpərəb(ə)l][ˈɒbdʒɪkts][dɪ'strɪbjʊ:tɪd; 'dɪstrɪbjʊ:tɪd][æt; ət] ['dɪfrənt] ['dɪstənsɪz] .
comparable objects distributed at different distances .
可比 对象 分布式 在 不同的 距离 .

该关系仅仅表达了反平方定律对分布在不同距离上的可比物体的作用。

[ðə; ði]['æktʃuəl] [əb'zɜ:vɪd] [reɪndʒ] ['kʌvəd] [baɪ] [ðɪs] [rɪ'strɪktɪd] [ɪn,tɜ:prə'teɪʃ(ə)n][ɪz][frɒm; frəm] [ə'pærənt]
The actual observed range covered by this restricted interpretation is from apparent
这 实际的 观察到 范围 涵盖 经过 这 受限制的 解释 是 从 明显
['mægnɪtju:d] - . [faɪv][tu:; tə] - . [faɪv] .
magnitude 0 . 5 to 10 . 5 .
震级 - . 5 到 - . 5 .

这种受限解释所涵盖的实际观测范围为视星等 0.5 至 10.5。

[ðə; ði] { - }
The { 41 }
这 { - }

[,həʊməʊdʒə'ni:əti][ʊv; əv][ðə; ði][,kɒrə'leɪ(ə)n][ˈdaɪə,græm][ænd; ənd][ðə; ði] [kəm'pli:t] [ˈæbsəns] [ʊv; əv]
homogeneity of the correlation diagrams and the complete absence of
同质性 的 这 相关性 图表 和 这 完全的 缺席 的
[ˈeɪdəns] [tu;; tə][ðə; ði] [ˈkɒntrəri] [ˈdʒʌstɪfaɪ][ðə; ði] [ɪk'stræpə'leɪn] [ʊv; əv][ðə; ði] [rɪ'strɪktɪd] [ɪn,tɜ:prə'teɪ(ə)n]
evidence to the contrary justify the extrapolation of the restricted interpretation
证据 到 这 相反 证明合法 这 外推法 的 这 受限制的 解释
[tu;; tə][ˈkʌnə(r)][ðə; ði][tu:'tu:][ɔ:(r)][θri:][mæg] .
to cover the 2 or 3 mag .
到 覆盖 这 2 或者 3 杂志 .

相关图的同质性以及完全没有相反的证据，证明了将限制性解释外推至 2 或 3 等星是合理的。

[brɪ'jɒnd] [ðə; ði][ˈlɪmɪts][ʊv; əv][ˈæktʃuəl] [ˌɒbzə'veɪ(ə)n] .
beyond the limits of actual observation .
超过 这 限制 的 实际的 观察 .

超出实际观察范围。

[ði:z] [kən,sɪdə'reɪnz] [li:d] [tu;; tə][ðə; ði] [hə'pɒθəsis] [ðæt][ðə; ði] ['nebjʊ,li:] [ˈtri:tɪd] [ɪn][ðə; ði][ˈprez(ə)nt]
These considerations lead to the hypothesis that the nebulae treated in the present
这些 考虑因素 带领 到 这 假设 那 这 星云 治疗 在 这 展示
[dɪ'skʌ(ə)n] [ɑ:(r); ə(r)][ɔ:l][ʊv; əv][ðə; ði] [seɪm] [ˈɔ:də(r)][ʊv; əv] [ˈæbsəlu:t] [ˈmæɡnɪtju:d] ;
discussion are all of the same order of absolute magnitude ;
讨论 是 全部 的 这 相同的 命令 的 绝对 震级 ;

基于这些考虑，我们得出以下假设：本文讨论的星云的绝对星等都属于同一数量级；

[ɪn][fækt] ,
in fact ,
在 事实 ,

实际上，

[ðeɪ] [lend][kən'sɪdərəb(ə)][ˈkʌlə(r)][tu;; tə][ðə; ði] [ə'sʌmp'n] [ðæt] [ˈekstrə] - [gə'læktɪk] ['nebjʊ,li:] [ɪn]
they lend considerable color to the assumption that extra - galactic nebulae in
他们 借 大量 颜色 到 这 假设 那 额外的 - 银河系 星云 在
[ˈdʒen(ə)rəl][ɑ:(r); ə(r)][ʊv; əv][ðə; ði] [seɪm] [ˈɔ:də(r)][ʊv; əv] [ˈæbsəlu:t] [ˈmæɡnɪtju:d][ænd; ənd] ,
general are of the same order of absolute magnitude and ,
一般的 是 的 这 相同的 命令 的 绝对 震级 和 ,

它们为以下假设增添了相当多的色彩：河外星云的绝对星等通常处于同一数量级，并且

[wɪ'ðɪn] [i:tʃ] [klɑ:s] , [ʊv; əv][ðə; ði] [seɪm] [ˈɔ:də(r)][ʊv; əv][ˈæktʃuəl][daɪ'menʃ(ə)nz] .
within each class , of the same order of actual dimensions .
之内 每个 班级 , 的 这 相同的 命令 的 实际的 方面 .

在每个类别中，实际尺寸处于同一数量级。

[sʌm; səm] [sə'pɔ:t] [tu;; tə] [ðɪs] [ə'sʌmp'n] [ɪz] [faʊnd] [ɪn][ðə; ði] [əb'zɜ:vd] [ˈæbsəns] [ʊv; əv][ɪndɪ'vɪdʒuəl]
Some support to this assumption is found in the observed absence of individual
一些 支持 到 这 假设 是 成立 在 这 观察到 缺席 的 个人
[stɑ:z] [ɪn][ðə; ði] [ə'pærəntli] [ˈfeɪntə(r)] [leɪt] - [taɪp] ['nebjʊ,li:] .
stars in the apparently fainter late - type nebulae .
明星 在 这 显然 较暗 晚的 - 类型 星云 .

在观测到的较暗的晚型星云中没有发现单个恒星，这在一定程度上支持了这一假设。

[ɪf] [ðə; ði][,lu:mɪ'nɒsəti][ʊv; əv][ðə; ði] [bɹ'aɪtəst] [stɑ:z] [ɪn'vɒlvd] [ɪz] [ɪndɪ'pendənt] [ʊv; əv][ðə; ði][ˈtəʊt(ə)l]
If the luminosity of the brightest stars involved is independent of the total
如果 这 亮度 的 这 最亮的 明星 涉及 是 独立的 的 这 全部的
[,lu:mɪ'nɒsəti][ʊv; əv][ə; eɪ]['nebjələ] ,
luminosity of a nebula ,
亮度 的 一个 星云 ,

如果其中最亮恒星的亮度与星云的总亮度无关，

[æz; əz][ɪz] ['sɜ:t(ə)nli] [ðə; ði] [keɪs] [ə'mʌŋ] [ðə; ði] [braɪtə] ['ɒbdʒɪkts] , [ðen] ,
as is certainly the case among the brighter objects , then ,
作为 是 当然 这 案件 之中 这 更亮 对象 , 然后 ,
那么, 对于较亮的物体来说, 情况确实如此。

[wen] [nəʊ][stɑ:z] [braɪtə] [ðæn; ðən] - . [faɪv][ɑ:(r); ə(r)][faʊnd] ,
when no stars brighter than 19 . 5 are found ,
什么时候 不 明星 更亮 比 - . 5 是 成立 ,
当找不到亮度高于 19.5 的恒星时,

[ðə; ði] ['nebjʊ,li:] [mʌst; məst][ɪn]['dʒen(ə)rəl][bi:; bi] [braɪtə] [ðæn; ðən] ['æbsəlu:t] ['mæɡnɪtju:d][,ɛm'ti:] - - .
the nebulae must in general be brighter than absolute magnitude mT - 25 .
这 星云 必须 在 一般的 是 更亮 比 绝对 震级 公吨 - - .
[eit][weə(r)][,ɛm'ti:][ɪz][ðə; ði]['təʊt(ə)] [ə'pærənt] ['mæɡnɪtju:d] .
8 where mT is the total apparent magnitude .
8 在哪里 公吨 是 这 全部的 明显 震级 .
星云的亮度通常必须大于绝对星等 mT - 25.8, 其中 mT 为总视星等。

[ɒn] [ðɪs] [ə'sʌmpn] ,
On this assumption ,
在 这 假设 ,
基于此假设,

[ðə; ði] ['feɪntɪst] [ɒv; əv][ðə; ði] - ['nebjʊ,li:] [ɑ:(r); ə(r)] [braɪtə] [ðæn; ðən] - - . [faɪv][ænd; ənd]
the faintest of the Holetschek nebulae are brighter than - 12 . 5 and
这 最微弱 的 这 - 星云 是 更亮 比 - - . 5 和
[hens] [ɒv; əv][ðə; ði] [seɪm] ['dʒen(ə)rəl]['ɔ:də(r)][æz; əz][ðə; ði] [braɪtə] ['nebjʊ,li:] .
hence of the same general order as the brighter nebulae .
因此 的 这 相同的 一般的 命令 作为 这 更亮 星云 .
霍列切克星云中最暗的星云也比 -12.5 更亮, 因此与较亮的星云属于同一数量级。

[wʌns][ðə; ði] [ə'sʌmpn] [ɒv; əv][ə; eɪ]['ju:nɪfɔ:m]['ɔ:də(r)][ɒv; əv][,lu:mi'nɒsəti][ɪz] [ək'septɪd] [æz; əz][ə; eɪ]
Once the assumption of a uniform order of luminosity is accepted as a
一次 这 假设 的 一个 制服 命令 的 亮度 是 公认 作为 一个
['wɜ:kɪŋ] [haɪ'pɒθəsis] ,
working hypothesis ,
在职的 假设 ,
一旦接受了光度均匀分布的假设作为工作假设,

[ðə; ði] [ə'pærənt] ['mæɡnɪtju:d] [brɪ'kʌm] , [fɔ:(r); fə(r)][stə'tɪstɪk(ə)] [p'ɜ:pəsɪz] , [ə; eɪ] ['meʒə(r)] [ɒv; əv][ðə; ði]
the apparent magnitudes become , for statistical purposes , a measure of the
这 明显 震级 变得 , 为了 统计 目的 , 一个 措施 的 这
[dɪ'stənsɪz] .
distances .
距离 .
从统计角度来看, 视星等就成了距离的度量。

[fɔ:(r); fə(r)][ə; eɪ] [mi:n] ['æbsəlu:t] ['mæɡnɪtju:d][ɒv; əv] - - . [tu:'tu:] , [ðə; ði] ['dɪstəns] [ɪn] ['pɑ:sek] [ɪz] ([eit]
For a mean absolute magnitude of - 15 . 2 , the distance in parsecs is (8
为了 一个 意思是 绝对 震级 的 - - . 2 , 这 距离 在 秒差距 是 (8
)
)
)
平均绝对星等为 -15.2 时, 距离 (以秒差距为单位) 为 (8)

[daɪ'menʃ(ə)nz] [ɒv; əv]['ekstrə] - [gə'læktɪk] ['nebjʊ,li:]
DIMENSIONS OF EXTRA - GALACTIC NEBULAE
方面 的 额外的 - 银河系 星云
银河系外星云的维度

[wen] [ðə; ði] ['distənsɪz] [ɑ:(r); ə(r)] [nəʊn] ,
When the distances are known ,
什么时候 这 距离 是 已知 ,
当距离已知时,
[aɪ 'ti:] [ɪz] ['pɒsəb(ə)l] [tu:; tə] [dɪ'raɪv] ['æktʃuəl] [daɪ'men](ə)nz] [ænd; ənd] [hens] [tu:; tə] ['kælɪbreɪt] [ðə; ði] [kɜ:v] [ɪn]
it is possible to derive actual dimensions and hence to calibrate the curve in
它 是 可能的 到 派生 实际的 方面 和 因此 到 校准 这 曲线 在
['fɪgə(r)] [sɪks] ,
Figure 6 ,
数字 6 ,

可以推导出实际尺寸，从而校准图 6 中的曲线，

[wɪtʃ] [ɪg'zɪbɪts] [ðə; ði] [ə'pærənt] [daɪ'æmɪtəz] [æz; əz] [ə; eɪ] ['fʌŋk](ə)n] [pɒv; əv] [taɪp] , [ɔ:(r)] [steɪdʒ] [ɪn] [ðə; ði]
which exhibits the apparent diameters as a function of type , or stage in the
哪个 展品 这 明显 直径 作为 一个 功能 的 类型 , 或者 阶段 在 这
['nebjʊlə(r)] ['si:kwəns] ,
nebular sequence ,
星云 顺序 ,

它展示了视直径随星云类型或星云序列阶段的变化情况。

[fɔ:(r); fə(r)] ['nebjʊ,li:] [pɒv; əv] [ə; eɪ] ['gɪv(ə)n] [ə'pærənt] ['mæɡnɪtju:d] .
for nebulae of a given apparent magnitude .
为了 星云 的 一个 给定 明显 震级 .

对于给定视星等的星云。

[ðə; ði] [mi:n] ['mæksɪməm] [daɪ'æmɪtəz] [ɪn] ['pɑ:sek] [kərə'spɒndɪŋ] [tu:; tə] [ðə; ði] ['dɪfrənt] [mi:n] [taɪps]
The mean maximum diameters in parsecs corresponding to the different mean types
这 意思是 最大限度 直径 在 秒差距 相应的 到 这 不同的 意思是 类型
[ɑ:(r); ə(r)] ['gɪv(ə)n] [ɪn] ['teɪb(ə)l] [eks,vi:'aɪ'aɪ] .
are given in Table XVII :
是 给定 在 桌子 十七 :

表十七给出了不同平均类型对应的平均最大直径（以秒差距为单位）。

[fɔ:(r); fə(r)] [ðə; ði] [ɪ'lɪptɪk(ə)l] ['nebjʊ,li:] ,
For the elliptical nebulae ,
为了 这 椭圆形 星云 ,

对于椭圆星云而言，

['vælju:z] [ɑ:(r); ə(r)] ['gɪv(ə)n] [bəʊθ] [fɔ:(r); fə(r)] [ðə; ði] [stə'tɪstɪk(ə)l] [mi:n] [əb'zɜ:vð] [daɪ'æmɪtəz] [ænd; ənd]
values are given both for the statistical mean observed diameters and
值 是 给定 两个都 为了 这 统计 意思是 观察到 直径 和
[fɔ:(r); fə(r)] [ðə; ði] [daɪ'æmɪtə(r)] [æz; əz] ['kælkjuleɪtɪd] [fɔ:(r); fə(r)] [ðə; ði] [pjʊə(r)] [taɪps] .
for the diameter as calculated for the pure types .
为了 这 直径 作为 计算 为了 这 纯的 类型 .

给出了统计平均观测直径和纯种计算直径的值。

['spɑɪrəlz] [æt; ət] [ðə; ði] [lɑ:st] [steɪdʒ] [ɪn] [ðə; ði] [əb'zɜ:vð] ['si:kwəns] [hæv; həv] [daɪ'æmɪtəz] [pɒv; əv] [ðə; ði]
Spirals at the last stage in the observed sequence have diameters of the
螺旋 在 这 最后的 阶段 在 这 观察到 顺序 有 直径 的 这
[ɔ:də(r)] [pɒv; əv] - ['pɑ:sek] .
order of 3000 parsecs .
命令 的 - 秒差距 .

观测序列中最后阶段的螺旋星系直径约为 3000 秒差距。

[ə'sju:mɪŋ] [wʌn] : - [æz; əz] [ðə; ði] ['reɪʃəʊ] [pɒv; əv] [ðə; ði] [tu:] { - }
Assuming 1 : 10 as the ratio of the two { 42 }
假设 1 : - 作为 这 比率 的 这 二 { - }

假设两者的比例为 1:10{42}

[ˈæksɪːz] , [ðə; ði] [ˌkərəˈspɒndɪŋ] [ˈvɒljʊːm][ɪz][ɒv; əv][ðə; ði][ˈɔːdə(r)][ɒv; əv][wʌn] . 4×109 [ˈkjuːbrɪk] [ˈpɑːsek] , **axes , the corresponding volume is of the order of 1 . 4×109 cubic parsecs ,** 轴 , 这 相应的 体积 是 的 这 命令 的 1 : 4×109 立方体 秒差距 , 以轴为基准, 相应的体积约为 1.4×109 立方秒差距,

[ænd; ənd][ðə; ði] [miːn] [ˌluːmɪˈnɒsəti][ˈdensəti][ɪz][ɒv; əv][ðə; ði][ˈɔːdə(r)][ɒv; əv][ˈsevən] . [ˈsevən] [ˈæbsəluːtɪ] **and the mean luminosity density is of the order of 7 . 7 absolute** 和 这 意思是 亮度 密度 是 的 这 命令 的 7 : 7 绝对 [ˈmægnɪtjuːd] [pə(r)][ˈkjuːbrɪk][ˈpɑːsek][æz; əz] [kəmˈpeəd] [wɪð] [eit] . - [fɔː(r); fə(r)][ðə; ði][gəˈlæktɪk] [ˈsɪstəm] **magnitudes per cubic parsec as compared with 8 . 15 for the galactic system** 震级 每 立方体 秒差距 作为 比较的 和 8 : 15 为了 这 银河系 系统 [ɪn][ðə; ði][vəˈsɪnəti][ɒv; əv][ðə; ði][sʌn] . **in the vicinity of the sun .** 在 这 附近 的 这 太阳 : 平均光度密度约为每立方秒差距 7.7 绝对星等, 而太阳附近的银河系的平均光度密度为每立方秒差距 8.15 绝对星等。

[ðɪːz] [rɪˈzʌlts] [əˈgriː] [wɪð] [ðəʊz] [ɒv; əv] [sɪːrɪz] [huː] , [frəm; frəm][ə; eɪ] [ˈstʌdɪ] [ɒv; əv] [ˈsɜːfɪs] **These results agree with those of Seares who , from a study of surface** 这些 结果 同意 和 那些 的 西尔斯 WHO , 从 一个 学习 的 表面 [ˈbraɪtnəs] , **brightness ,** 亮度 , 这些结果与Seares的研究结果一致, Seares通过对表面亮度的研究发现:

[kənˈkluːdɪd] [ðæt] [ðə; ði][gəˈlæktɪk] [ˈsɪstəm] [mʌst; məst][biː; bi] [pleɪst] [æt; ət][ðə; ði][end][ɒv; əv] , [ɪf] [nɒt] **concluded that the galactic system must be placed at the end of , if not** 结束 那 这 银河系 系统 必须 是 放置 在 这 结尾 的 , 如果 不是 [ˈæktʃuəli] [ˌaʊtˈsaɪd] , **actually outside ,** 实际上 外部 , 由此得出结论, 银河系必定位于末端, 即便不是完全位于末端, 也肯定位于末端之外。

[ðə; ði][ˈsɪəriːz][ɒv; əv] [nəʊn] [ˈspaɪrəlz] [wen] [əˈreɪndʒd] [əˈkɔːdɪŋ] [tuː; tə][ˈdensəti] . - **the series of known spirals when arranged according to density . 19** 这 系列 的 已知 螺旋 什么时候 安排 根据 到 密度 : - 按密度排列的已知螺旋线序列。19

[ˈteɪb(ə)][ˌɛksˌviːˈaɪˌaɪ] **TABLE XVII** 桌子 十七

表十七

[taɪp] [daɪˈæmɪtə(r)][ɪn] [ˈpɑːsek] **Type Diameter in Parsecs** 类型 直径 在 秒差距 以秒差距为单位输入直径

[ˌoʊˌbiːˈɛs][kæəl] . **Obs Cal .** 观测 卡尔 : 观测校准。

E0 - - **E0 360 340** E0 - - E0 360 340

E1 - - **E1 430 380** E1 - - E1 430 380

E2 - -
E2 500 430
E2 - -

E2 500 430

E3 - -
E3 590 490
E3 - -

E3 590 490

E4 - -
E4 700 570
E4 - -

E4 700 570

E5 - -
E5 810 680
E5 - -

E5 810 680

E6 - -
E6 960 850
E6 - -

E6 960 850

E7 - -
E7 1130 1130
E7 - -

E7 1130 1130

[taɪp] [dar'æmɪtə(r)][ɪn] ['pɑːsek]
Type Diameter in Parsecs
类型 直径 在 秒差距

以秒差距为单位输入直径

['ɛs.eɪ] -
Sa 1450
萨 -

Sa 1450

['sʌmbədi] -
Sb 1900
某人 -

1900年

[,ɛs'siː] -
Sc 2500
Sc -

Sc 2500

[,ɛs,bi:'eɪ] -
SBa 1280
小企业管理局 -

SBa 1280

[,ɛs,bi:'biː] -
SBb 1320
sbb -

SBb 1320

[,ɛs,bi:'siː] -
SBc 2250
sbc -

SBc 2250

[ˈɪ(r)] -
Irr 1500
不 -

1500伊朗里亚尔

[ˈmæsɪz] [ɒv; əv][ˈekstrə] - [gəˈlæktɪk] [ˈnebjʊ.li:]
MASSES OF EXTRA - GALACTIC NEBULAE
群众 的 额外的 - 银河系 星云

银河系外星云的质量

[ˌspektrəˈskɒpɪk] [roʊˈteɪʃənz][ɑ:(r); ə(r)][əˈveɪləb(ə)l][fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði][ˈspairəlz][em] - [ænd; ənd][en] . [dʒi:] .
Spectroscopic rotations are available for the spirals M 3120 and N . G .
光谱学 旋转 是 可用的 为了 这 螺旋 M - 和 N : G :
[si:] . - ,
C . 4594 ,
C : - ,

旋涡星系 M 3120 和 NGC 4594 的光谱旋转数据是可用的。

- [ænd; ənd][frɒm; frəm] [ðɪ:z] [aɪ ˈti:] [ɪz][ˈpɒsəb(ə)l][tu:; tə] [ˈestɪmət; ˈestɪmərt][ðə; ði] [ˈmæsɪz] [ɒn][ðə; ði]
21 and from these it is possible to estimate the masses on the
- 和 从 这些 它 是 可能的 到 估计 这 群众 在 这
[əˈsʌmpʃn] [ɒv; əv][ˈɔ:bit(ə)l][rəʊˈteɪʃ(ə)n] [əˈraʊnd] [ðə; ði][ˈnju:kliəs] .
assumption of orbital rotation around the nucleus .
假设 的 轨道 旋转 大约 这 核 .

21，由此可以假设围绕原子核的轨道旋转来估算质量。

[ðə; ði] [ˈdɪstənsɪz] [ɒv; əv][ðə; ði] [ˈnebjʊ.li:] [ɑ:(r); ə(r)] [ɪnˈvɒlvd] , [haʊˈevə(r)] , [ænd; ənd] [ðɪs] [ɪz] [nəʊn]
The distances of the nebulae are involved , however , and this is known
这 距离 的 这 星云 是 涉及 , 然而 , 和 这 是 已知
[ˈækjərətli] [ˈəʊnli][fɔ:(r); fə(r)][em] - ;
accurately only for M 31 ;
准确 仅有的 为了 M - ;

然而，星云的距离也牵涉其中，而目前只有 M 31 的距离是精确已知的；

[fɔ:(r); fə(r)][en] . [dʒi:] . [si:] . - [aɪ ˈti:] [mʌst; məst][bi:; bi] [ˈestɪmərtɪd] [frɒm; frəm][ðə; ði] [əˈpærənt]
for N . G . C . 4594 it must be estimated from the apparent
为了 N : G : C : - 它 必须 是 估计的 从 这 明显
[ˌlu:mɪˈnɒsəti] .
luminosity .
亮度 .

对于 NGC 4594，必须根据视光度进行估算。

[əˈnʌðə(r)] [ˈmeθəd] [ɒv; əv] [ˈestɪmərtɪŋ] [ˈmæsɪz] [ɪz] [ðæt] [ju:st] [baɪ] Öpik22 [ɪn] [dɪˈraɪvɪŋ] [hɪz; ɪz]
Another method of estimating masses is that used by Öpik22 in deriving his
其他 方法 的 估算 群众 是 那 用过的 经过 Öpik22 在 推导 他的
[ˈestɪmət; ˈestɪmərt][ɒv; əv][ðə; ði] [ˈdɪstəns] [ɒv; əv][em] - .
estimate of the distance of M 31 .
估计 的 这 距离 的 M - .

Öpik22 用另一种方法来估算质量，以此来推导出他对 M 31 距离的估计。

[aɪ ˈti:] [ɪz] [beɪst] [ɒn][ðə; ði] [əˈsʌmpʃn] [ðæt] [ˈlu:ˌmɪnəs] [məˈtɪəriəl][ɪn][ðə; ði][ˈspairəlz][hæz; həz][əˈbaʊt]
It is based on the assumption that luminous material in the spirals has about
它 是 基于 在 这 假设 那 发光的 材料 在 这 螺旋 有 关于
[ðə; ði] [seɪm] [ˌkəʊɪˈfɪ(ə)nt][ɒv; əv] [ɪˈmɪʃ(ə)n] [æz; əz][ðə; ði][məˈtɪəriəl][ɪn][ðə; ði][gəˈlæktɪk] [ˈsɪstəm] .
the same coefficient of emission as the material in the galactic system .
这 相同的 系数 的 排放 作为 这 材料 在 这 银河系 系统 .

它是基于这样的假设：旋涡星系中的发光物质与银河系中的物质具有大致相同的发射系数。

- [kəmˈpju:tɪd][ðə; ði][ˈreɪʃəʊ][ɒv; əv][ˌlu:mɪˈnɒsəti][tu:; tə] [mæs] [fɔ:(r); fə(r)][ˈaʊə(r)] [əʊn] [ˈsɪstəm] [ɪn] { - }
Öpik computed the ratio of luminosity to mass for our own system in { 43 }
- 计算 这 比率 的 亮度 到 大量的 为了 我们的 自己的 系统 在 { - }

Öpik 在{43}中计算了我们自己的系统的光度与质量之比。

[tɜːmz] [ɒv; əv][ðə; ði][sʌn][æz; əz][ˈjuːnəti] ,
terms of the sun as unity ,
条款 的 这 太阳 作为 统一 ,

以太阳作为统一体的术语，

[ˈjuːzɪŋ] - value23 [fɔː(r); fə(r)][ðə; ði] [ˈrelətɪv] [prəˈpɔːʃ(ə)n] [ɒv; əv] [ˈluːmɪnəs] [tuː; tə][nɒn] - [ˈluːmɪnəs]
using Jeans's value23 for the relative proportion of luminous to non - luminous
使用 - value23 为了 这 相对的 部分 的 发光的 到 非 - 发光的
[məˈtɪəriəl] .
material .
材料 .

使用 Jeans 值 23 表示发光材料与非发光材料的相对比例。

[ðə; ði][rɪˈleɪʃ(ə)n][ɪz]
The relation is
这 关系 是

这种关系是

[mæs] = [tuːˈtuː] . [sɪks][el] . ([naɪn])
Mass = 2 . 6 L . (9)
大量的 = 2 . 6 L . (9)

质量 = 2.6 升。(9)

[ðə; ði][æplɪˈkeɪʃ(ə)n][ɒv; əv] [ðɪs] [ˈmeθəd] [ɒv; əv] [dɪˈtɜːmɪnɪŋ] [ˈɔːdərs][ɒv; əv] [ˈmæsɪz] [siːm] [tuː; tə][biː; bi]
The application of this method of determining orders of masses seems to be
这 应用 的 这 方法 的 确定 订单 的 群众 似乎 到 是
[ˈdʒʌstɪfaɪd] ,
justified ,
合理的 ,

应用这种确定质量级数的方法是合理的。

[æt; ət] [liːst] [ɪn][ðə; ði] [keɪs] [ɒv; əv][ðə; ði][ˈleɪtə(r)] - [taɪp] [ˈspʌrəlz][ænd; ənd][ɪˈregjələ(r)] [ˈnebʃʊ.liː] ,
at least in the case of the later - type spirals and irregular nebulae ,
在 至少 在 这 案件 的 这 之后 - 类型 螺旋 和 不规则的 星云 ,
至少对于后期型旋涡星系和不规则星云而言，

[baɪ][ðə; ði] [ˈmeni] [əˈnælədʒɪz] [wɪð] [ðə; ði][gəˈlæktɪk] [ˈsɪstəm] [ɪtˈself] .
by the many analogies with the galactic system itself .
经过 这 许多 类比 和 这 银河系 系统 本身 .
通过与银河系本身的诸多类比。

[mɔːrˈəʊvə(r)] , [wen] [əˈplaɪd] [tuː; tə][em] - , [weə(r)][ðə; ði] [ˈdɪstəns] [ɪz] [ˈfeəli] [wel] [nəʊn] ,
Moreover , when applied to M 31 , where the distance is fairly well known ,
而且 , 什么时候 应用 到 M 31 - , 在哪里 这 距离 是 相当 出色地 已知 ,
此外，当应用于距离相当已知的 M 31 时，

[aɪˈtiː] [liːdz] [tuː; tə][ə; eɪ] [mæs] [ɒv; əv][ðə; ði] [seɪm] [ˈɔːdə(r)][æz; əz] [ðæt] [dɪˈraɪvd] [frɒm; frəm][ðə; ði]
it leads to a mass of the same order as that derived from the
它 线索 到 一个 大量的 的 这 相同的 命令 作为 那 衍生的 从 这
[ˈspektrəʊˌɡrɑːfɪk] [rəʊˈteɪʃ(ə)n] :
spectrographic rotation :
光谱学 旋转 :
它得到的质量与通过光谱旋转法得到的质量处于同一数量级：

[mæs] [ɒv; əv][em] -
MASS OF M 31
大量的 的 M -

M31的质量

[ˈspektrəʊˌɡrɑːfɪk] [rəʊˈteɪʃ(ə)n][θriː] . 5×10⁹ ⊙
Spectrographic rotation 3 . 5×10⁹ ⊙
光谱学 旋转 3 . 5×10⁹ ⊙
光谱旋转度 3.5×10⁹ ⊙

- ['meθəd] [wʌn] . 6×109
Öpik's method 1 . **6×109**
- 方法 1 . 6×109

Öpik 的方法 1.6×109

[ðə; ði] ['distəns] [ɒv; əv][en] . [dʒi:] . [si:] . - [ɪz] [ʌn'həʊn] ,
The distance of N . G . C . 4594 is unknown ,
这 距离 的 N . G . C . - 是 未知 ,
NGC 4594的距离未知。

[bʌt; bət][ðə; ði] [ə'sʌmpn] [ðæt][,ai 'ti:][ɪz][ə; ei]['nɔ:m(ə)]['nebjələ] [wɪð] [æn; ən] ['æbsəlu:t] ['mæɡnɪtju:d]
but the assumption that it is a normal nebula with an absolute magnitude
但 这 假设 那 它 是 一个 普通的 星云 和 一个 绝对 震级
[ɒv; əv] - - . [tu:'tu:]['pleɪsɪz][,ai 'ti:][æt; ət] - ,
of - 15 . 2 places it at 700 ,
的 - - . 2 地方 它 在 - ,
但假设它是一个绝对星等为 -15.2 的普通星云，那么它的坐标是 700，

- ['pɑ:sek] .
000 parsecs .
- 秒差距 .

000秒差距。

[ðə; ði] ['ɔ:dərs] [ɒv; əv][ðə; ði] [mæs] [baɪ][ðə; ði] [tu:] ['meθədz] [ɑ:(r); ə(r)] [ðen]
The orders of the mass by the two methods are then
这 订单 的 这 大量的 经过 这 二 方法 是 然后
两种方法得到的质量阶数分别为

[mæs] [ɒv; əv][en] . [dʒi:] . [si:] . -
MASS OF N . G . C . 4594
大量的 的 N . G . C . -

NGC 4594的质量

['spektrəʊ,ɡrɑ:fɪk] [rəʊ'teɪ(ə)n][tu:'tu:] . 0×109 ⊙
Spectrographic rotation 2 . 0×109 ⊙
光谱学 旋转 2 . 0×109 ⊙

光谱旋转 2.0×10⁹ ⊙

- ['meθəd] [tu:'tu:] . 6×108
Öpik's method 2 . **6×108**
- 方法 2 . 6×108

Öpik 的方法 2.6×108

[hɪə(r)] [ə'gen] [ðə; ði] [rɪ'zʌltɪŋ] ['mæsɪz] [ɑ:(r); ə(r)][ɒv; əv][ðə; ði] [seɪm] ['ɔ:də(r)] .
Here again the resulting masses are of the same order .
这里 再次 这 结果 群众 是 的 这 相同的 命令 .
同样，所得质量也处于同一数量级。

[ðeɪ] [kæn; kən][bi:; bi] [meɪd] [tu:; tə] [ə'ɡri:] [æz; əz] [wel] [æz; əz] [ðəʊz] [fɔ:(r); fə(r)][em] - [baɪ][ðə; ði][nɒt]
They can be made to agree as well as those for M 31 by the not
他们 能 是 制成 到 同意 作为 出色地 作为 那些 为了 M - 经过 这 不是
[ʌn'ri:z(ə)nəb(ə)l] [ə'sʌmpn] [ðæt] [ðə; ði] ['æbsəlu:t] [ˌlu:mɪ'nɒsəti][ɒv; əv][ðə; ði]['nebjələ] [ɪz][tu:'tu:][mæg] .
unreasonable assumption that the absolute luminosity of the nebula is 2 mag .
不合理 假设 那 这 绝对 亮度 的 这 星云 是 2 杂志 .

如果假设星云的绝对光度为 2 等，那么它们就可以像 M 31 的星云一样达成一致。

[ɔ:(r)][səʊ] [braɪtə] [ðæn; ðən]['nɔ:m(ə)l] .
or so brighter than normal .
或者 所以 更亮 比 普通的 .

或者说比正常情况更亮。

Öpik's method leads to values that are reasonable and fairly consistent with those obtained by the independent spectrographic method .

Öpik 的方法得出的值是合理的，并且与独立光谱法得出的值相当一致。

Therefore , in the absence of other resources ,

因此，在缺乏其他资源的情况下，

its use for deriving the mass of the normal nebula appears to be permissible .

将其用于推导正常星云的质量似乎是可行的。

The result , $\frac{2}{2} : \frac{6}{6} \times \frac{108}{\times} \odot$, corresponding to an absolute magnitude of $-15 : \frac{2}{2}$,

结果为 $2.6 \times 108 \odot$ ，对应的绝对星等为 -15.2，

is probably of the right order .

顺序可能正确。

The two test cases suggest that this value may be slightly low ,

这两个测试案例表明，该值可能略低。

河外星云(Extra-galactic nebulae)

第3/3页

[bʌt; bət][ðə; ði][ˈdeɪtə][ɑː(r); ə(r)][nɒt] [səˈfɪ(ə)nt] [tuː; tə] [ˈwɒrənt] [ˈeni][ɪmˈpɪrɪk(ə)l] [kəˈrekʃnz] .
but the data are not sufficient to warrant any empirical corrections .
但 这 数据 是 不是 充足的 到 保证 任何 经验 更正 .

但现有数据不足以支持任何经验修正。

[ˈnʌmbəz] [ɒv; əv] [ˈnebjʊ.liː] [tuː; tə] [ˈdɪfrənt] [ˈlɪmɪtɪŋ] [ˈmæɡnɪtjuːd]
NUMBERS OF NEBULAE TO DIFFERENT LIMITING MAGNITUDES
数字 的 星云 到 不同的 限制 震级

不同极限星等的星云数量

[ðə; ði] [ˈnʌmbəz] [ɒv; əv] [ˈnebjʊ.liː] [tuː; tə] [ˈdɪfrənt] [ˈlɪmɪtɪŋ] [ˈmæɡnɪtjuːd] [kæn; kən][biː; bi] [juːst] [tuː; tə]
The numbers of nebulae to different limiting magnitudes can be used to
这 数字 的 星云 到 不同的 限制 震级 能 是 用过的 到

[test][ðə; ði] [ˈkɒnstənsɪ] [ɒv; əv][ðə; ði][ˈdensəti] [ˈfʌŋkʃ(ə)n] ,
test the constancy of the density function ,
测试 这 恒常 的 这 密度 功能 ,

不同极限星等的星云数量可以用来检验密度函数的恒定性。

[ɔː(r)] , [ɒn][ðə; ði] [haɪˈpɒθəsɪs] { - }
or , on the hypothesis { 44 }
或者 , 在 这 假设 { - }

或者, 基于假设{44}

[ɒv; əv][ˈjuːnɪfɔːm] [ˌluːmɪˈnɒsəti] , [tuː; tə] [dɪˈtɜːmɪn] [ðə; ði] [ˌdɪstrɪˈbjʊːʃn] [ɪn] [speɪs] .
of uniform luminosities , to determine the distribution in space .
的 制服 亮度 , 到 决定 这 分配 在 空间 .

均匀光度, 以确定其在空间中的分布。

[ðə; ði] [ˈnebjʊ.liː] [braɪtə] [ðæn; ðən][əˈbaʊt][ðə; ði] [tenθ] [ˈmæɡnɪtjuːd][ɑː(r); ə(r)] [nəʊn] [ˌɪndrɪˈvɪdʒuəli] .
The nebulae brighter than about the tenth magnitude are known individually .
这 星云 更亮 比 关于 这 第十 震级 是 已知 单独 .

亮度高于十等星云的星云都是单独被发现的。

[ðəʊz] [nɒt] [ɪnˈkluːdɪd][ɪn] - [lɪst][ɑː(r); ə(r)] : [ðə; ði][mæɡəˈlænɪk] [klaʊdz] , [ðə; ði] [tuː] [ˈnebjʊ.liː]
Those not included in Holetschek's list are : the Magellanic Clouds , the two nebulae
那些 不是 包括 在 - 列表 是 : 这 麦哲伦 云 , 这 二 星云

[en] . [dʒiː] . [siː] . - [ænd; ənd] - ,
N . G . C . 55 and 1097 ,
N . G . C . - 和 - ,

霍莱切克的名单中没有包括: 麦哲伦星云、NGC 55 和 NGC 1097 这两个星云。

[brɪˈtwiːn] [naɪn] . - [ænd; ənd][naɪn] . [faɪv][mæɡ] . , [ænd; ənd][ðə; ði][ˈsev(ə)n] [ˈnebjʊ.liː] [en] . [dʒiː] . [siː] . -
between 9 . 0 and 9 . 5 mag . , and the seven nebulae N . G . C . 134
之间 9 . - 和 9 . 5 杂志 . , 和 这 七 星云 N . G . C . -

, - , - ,
 , **289** , **1365** ,
 , - , - ,

亮度介于 9.0 至 9.5 等之间, 以及七个星云 NGC 134、289、1365、

- , - , - , [ænd; ənd] - , [ɔːl] [brɪˈtwiːn] [naɪn] . [faɪv][ænd; ənd] - . - [mæɡ] .
1533 , 1559 , 1792 , and 3726 , all between 9 . 5 and 10 . 0 mag .
- , - , - , 和 - , 全部 之间 9 . 5 和 - . - 杂志 .

1533、1559、1792 和 3726, 都在 9.5 到 10.0 mag 之间。

[ə; eɪ][feə(r)][ˈestɪmət; ˈestɪmənt][pʊv; əv][ðə; ði][ˈnʌmbə(r)] [brɪtwi:n] - . - [ænd; ənd] - . - [mæg] . [kæn; kən]
A fair estimate of the number between 10 . 0 and 11 . 0 mag . can
一个 公平的 估计 的 这 数字 之间 - . - 和 - . - 杂志 . 能
[biː; bi] [dɪˈraɪvd] [frəm; frəm][ə; eɪ][kəmˈpærɪs(ə)n][pʊv; əv] - [lɪst] [wɪð] [ðæt] [pʊv; əv][ˈhɑːrd,kæsəl] ,
be derived from a comparison of Holetschek's list with that of Hardcastle ,
是 衍生的 从 一个 比较 的 - 列表 和 那 的 哈德卡斯尔 ,
通过比较霍莱切克的列表和哈德卡斯尔的列表，可以得出10.0到11.0马格南之间数字的合理估计。

[æn; ən] [ɪnˈspekʃ(ə)n] [pʊv; əv][ˈɪmɪdʒɪz][pʊn][ðə; ði][ˈfræŋklɪn] - [ˈædəmz] [tʃɑːts] [ænd; ənd][ˈʌðə(r)] [ˈfəʊtəgræfs] ,
an inspection of images on the Franklin - Adams charts and other photographs ,
一个 检查 的 图片 在 这 富兰克林 - 亚当斯 图表 和 其他 照片 ,
对富兰克林-亚当斯海图和其他照片上的图像进行检查，

[ænd; ənd][ə; eɪ][ˌkɒrəˈleɪ(ə)n] [brɪtwi:n] [nəʊn] [ˈtəʊt(ə)][ˈmæɡnɪtjuːd] [ænd; ənd][ðə; ði] [dɪskʊˈɪpʃənz] [pʊv; əv]
and a correlation between known total magnitudes and the descriptions of
和 一个 相关性 之间 已知 全部的 震级 和 这 描述 的
[saɪz][ænd; ənd] [ˈbraɪtnəs] [ɪn] [ˈdraɪərz] [ˈkætəloɡz] .
size and brightness in Dreyer's catalogues .
尺寸 和 亮度 在 德雷尔的 产品目录 .
已知总星等与德雷尔星表中对星体大小和亮度的描述之间存在相关性。

[aɪˈtiː] [əˈprɪəz] [ðæt] [ˈveri] [fjuː][pʊv; əv] [ðiːz] [ˈɒbdʒɪkts][wɜː(r); wə(r)] [mɪst] [baɪ] - [ɪn][ðə; ði]
It appears that very few of these objects were missed by Holetschek in the
它 出现 那 非常 很少 的 这些 对象 是 错过 经过 - 在 这
[ˈnɔːðən] [skaɪ] — [nɒt][mɔː(r)][ðæn; ðən][saɪks][pʊv; əv] - [ˈnebjʊˌliː] .
northern sky — not more than six of Hardcastle's nebulae .
北方 天空 — 不是 更多的 比 六 的 - 星云 .
看来霍列切克在北天观测到的天体中，只有极少数是他错过的——哈德卡斯尔星云不超过六个。

[fɔː(r); fə(r)][ðə; ði] [ˈsʌðən] [skaɪ] , [brɪˈpɒnd] [ðə; ði][ˈriːdʒən] [əbˈzɜːvd] [baɪ] - , [ðə; ði] [rɪˈzʌlts]
For the southern sky , beyond the region observed by Holetschek , the results
为了 这 南部 天空 , 超过 这 地区 观察到 经过 - , 这 结果
[ɑː(r); ə(r)] [ˈveri] [ʌnˈsɜːt(ə)n] ,
are very uncertain ,
是 非常 不确定 ,
对于霍列切克观测区域以外的南半球天空，观测结果非常不确定。

[bʌt; bət][ˈprɒbəb(ə)][ˈʌpə(r)] [ænd; ənd][ˈləʊə(r)][ˈlɪmɪts][wɜː(r); wə(r)] [dɪˈtɜːmɪnd] [æz; əz] - [ænd; ənd] - ,
but probable upper and lower limits were determined as 50 and 20 ,
但 可能 上 和 降低 限制 是 决定 作为 - 和 - ,
[rɪˈspektɪvli] .
respectively .
分别 .
但可能的上限和下限分别确定为 50 和 20。

[ðə; ði] [braɪtə] [ˈnebjʊˌliː] [ɑː(r); ə(r)] [nəʊn] [tuː; tə][biː; bi] [skeəs] [ɪn] [ðəʊz] [ˈriːdʒənz] .
The brighter nebulae are known to be scarce in those regions .
这 更亮 星云 是 已知 到 是 稀少 在 那些 地区 .
众所周知，这些区域内较亮的星云数量稀少。

[ə; eɪ] [miːn] [ˈvæljuː][pʊv; əv] - [liːdz] [tuː; tə][ə; eɪ][ˈtəʊt(ə)] - [fɔː(r); fə(r)][ðə; ði][ɪnˈtaɪə(r)][skaɪ] ,
A mean value of 35 leads to a total 295 for the entire sky ,
一个 意思是 价值 的 - 线索 到 一个 全部的 - 为了 这 全部的 天空 ,
平均值为 35，则整个天空的总和为 295。
[ænd; ənd] [ðɪs] [ɪz][æt; ət] [liːst] [pʊv; əv][ðə; ði][ˈprɒpə(r)][ˈɔːdə(r)] .
and this is at least of the proper order .
和 这 是 在 至少 的 这 恰当的 命令 .
至少顺序是正确的。

[ðə; ði][ˈnʌmbə(r)][pʊ; əv] [ˈnebʊ.li:] [brɪtwi:n] - . - [ænd; ənd] - . - [mæg] . [kæn; kən][bi;; bi] [ˈestimeɪtɪd]
The number of nebulae between 11 . 0 and 12 . 0 mag . can be estimated
这 数字 的 星云 之间 - . - 和 - . - 杂志 . 能 是 估计的
[pɒn][ðə; ði] [əˈsʌmpʃn] [ðæt][ðə; ði] [tu:] [ˈlɪsts] ,
on the assumption that the two lists ,
在 这 假设 那 这 二 列表 ,

假设这两个列表成立，就可以估算出星等在 11.0 到 12.0 之间的星云数量：

- [ænd; ənd] - , [ɑ:(r); ə(r)][əˈbaʊt] [ˈi:kwəli] [kəmˈpli:t] [wɪˈðɪn] [ðɪs] [reɪndʒ] .
Holetschek's and Hardcastle's , are about equally complete within this range .
- 和 - , 是 关于 同样地 完全的 之内 这 范围 .

霍莱切克和哈德卡斯尔的著作在这个范围内都相当完整。

[ðeɪ] [ɑ:(r); ə(r)] [nəʊn] [tu;; tə][bi;; bi][ˈkɒmpərəb(ə)l][fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði] [braɪtə] [ˈnebʊ.li:] , [ænd; ənd] ,
They are known to be comparable for the brighter nebulae , and ,
他们 是 已知 到 是 可比 为了 这 更亮 星云 , 和 ,
[mɔːrˈəʊvə(r)] ,
moreover ,
而且 ,

已知它们在较亮的星云中具有可比性，而且，

[ðə; ði][ˈtəʊt(ə)l] [ˈnʌmbəz] [ɪnˈkluːdɪd][ɪn][ðə; ði] [tu:] [ˈlɪsts][fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði] [seɪm] [ˈeəriə][pʊ; əv][ðə; ði][skaɪ] ,
the total numbers included in the two lists for the same area of the sky ,
这 全部的 数字 包括 在 这 二 列表 为了 这 相同的 区域 的 这 天空 ,
两份列表中同一片天空区域的总数，

[ðæt] [nɔːθ] [pʊ; əv] [ˌdeklɪˈneɪʃən] - 10° , [ɑ:(r); ə(r)] [ˈveri] [ˈni:əli] [ˈi:kwəl] — - [æz; əz] [kəmˈpeəd] [wɪð]
that north of declination - 10° , are very nearly equal — 400 as compared with
那 北 的 下降 - 10° , 是 非常 几乎 平等的 — - 作为 比较的 和
- .
408 .
- .

赤纬 -10° 以北的星体数量非常接近 -400 与 408 相比。

[ðə; ði] [pəˈsentɪdʒɪz] [pʊ; əv] - [ˈnebʊ.li:] [ɪnˈkluːdɪd][baɪ][ˈhɑːrd,kæsəl][wɜ:(r); wə(r)][fɜːst]
The percentages of Holetschek's nebulae included by Hardcastle were first
这 百分比 的 - 星云 包括 经过 哈德卡斯尔 是 第一的
[dɪˈtɜːmɪnd] [æz; əz][ə; eɪ][ˈfʌŋk(ə)n] [pʊ; əv][ˈmæɡnɪtjuːd] .
determined as a function of magnitude .
决定 作为 一个 功能 的 震级 .

哈德卡斯尔首先根据星等确定了霍列切克星云的百分比。

[wɪˈðɪn] [ðə; ði][hɑːf] - [ˈmæɡnɪtjuːd] [ˈɪntəv(ə)l] - . - [tu;; tə] - . [faɪv] , [fɔ:(r); fə(r)] [ˈɪnstəns] , - [pə(r)][sent]
Within the half - magnitude interval 11 . 0 to 11 . 5 , for instance , 60 per cent
之内 这 一半 - 震级 间隔 - . - 到 - . 5 , 为了 实例 , - 每 中心
[ɑ:(r); ə(r)][ɪn] - [lɪst] .
are in Hardcastle's list .
是 在 - 列表 .

例如，在 11.0 到 11.5 的半量级区间内，有 60% 的地震在哈德卡斯尔的名单中。

[ɪf] [ðə; ði] [tu:] [ˈlɪsts][ɑ:(r); ə(r)] [ˈi:kwəli] [kəmˈpli:t] [ænd; ənd] , [ˈteɪkən][təˈgeðə(r)] , [ɑ:(r); ə(r)] [ɪɡˈzɔːstɪv] ,
If the two lists are equally complete and , taken together , are exhaustive ,
如果 这 二 列表 是 同样地 完全的 和 , 已采取 一起 , 是 详尽的 ,
如果这两个清单同样完整，并且加在一起也完全涵盖所有信息，

[ðə; ði][ˈtəʊt(ə)l][ˈnʌmbə(r)][ɪn][ðə; ði][ˈɪntəv(ə)l] [wɪl] [bi;; bi][wʌn] . [fɔːr] [taɪmz] [ðə; ði][ˈnʌmbə(r)][pʊ; əv]
the total number in the interval will be 1 . 4 times the number of
这 全部的 数字 在 这 间隔 将要 是 1 . 4 时代 这 数字 的
- [ˈnebʊ.li:] .
Holetschek's nebulae .
- 星云 .

该区间内的总数将是霍列切克星云数量的 1.4 倍。

[ðə; ði][ˈlætə(r)][ɪz] [faʊnd] [tu;; tə][bi;; bi] - [frɒm; frəm] [smu:ðd] [ˈfri:kwənsi] [kɜ:rvz] [ɒv; əv][ðə; ði]
The latter is found to be 50 from smoothed frequency curves of the
 这 后者 是 成立 到 是 - 从 平滑 频率 曲线 的 这
 [ˈmægnitju:d] [ˈlɪstɪd] [ɪn] [ˈteɪblz] [aɪ] - [aɪˈvi:] .
magnitudes listed in Tables I - IV .
 震级 列出 在 表格 我 - 第四 .

通过对表 I-IV 中列出的幅值的平滑频率曲线进行分析，发现后者为 50。

因此，位于 -10° 以北的总数为 70。

[ðɪs] [kæn; kən][biː bi] [kə'rektɪd] [tuː tə] [,reprɪ'zent] [ðə; ði][ɪn'taɪə(r)][skaɪ][baɪ] [ə'plaɪŋ] [ðə; ði]['fæktə(r)][wʌn]

<u>This</u>	<u>can</u>	<u>be</u>	<u>corrected</u>	<u>to</u>	<u>represent</u>	<u>the</u>	<u>entire</u>	<u>sky</u>	<u>by</u>	<u>applying</u>	<u>the</u>	<u>factor</u>	<u>1</u>
这	能	是	已更正	到	代表	这	全部的	天空	经过	申请	这	因素	1

. - ,
.
. - ,

. 75 ,

. - ,

通过应用系数 1.75，可以将其修正为代表整个天空。

[wɪtʃ] [ɪz][ðə; ði][ˈreɪʃəʊ][pʌv; əv][ðə; ði][ˈtəʊt(ə)l][ˈnʌmbə(r)][pʌv; əv] - ['nebjʊ.li:] , - ,
which is the ratio of the total number of Hardcastle's nebulae , 700 ,
 哪个 是 这 比率 的 这 全部的 数字 的 - 星云 , - ,
 这是哈德卡斯尔星云总数（700）的比例，

[tuː; tə][ðə; ði][ˈnʌmbə(r)] [nɔːθ] [pʊ; əv] – 10° , - .
to the number north of – 10° , 400 :
 到 这 数字 北 的 – 10° , - .
 北纬 10° 以北的数字，400。

[In] [ðɪs] ['mænə(r)][ə; eɪ] ['ri:znəbl] ['estɪmət; 'estɪmeɪt][pʊ; əv] - [ɪz] [əb'teɪnd] [fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði]['nʌmbə(r)]
In this manner a reasonable estimate of 123 is obtained for the number
 在 这 方式 一个 合理的 估计 的 - 是 获得 为了 这 数字
 [pʊ; əv] ['nebjʊ,li:] [In] { - }
of nebulae in { 45 }
 的 星云 在 { - }

由此可以合理估计{45}中的星云数量为123。

[ðə; ði][ɪn'taɪə(r)][skaɪ] [bɪ'twi:n] - . - [ænd; ənd] - . [faɪv][mæg] .
the entire sky between 11.0 and 11.5 mag .
这 全部的 天空 之间 - . - 和 - . 5 杂志 .

整个天空介于 11.0 等和 11.5 等之间。

[ˈsɪmələli] , [brɪtwi:n] - . [faɪv][ænd; ənd] - . - , [weə(r)] - [pə(r)][sent][pɒv; əv] - ['nebjuːliː]
Similarly , **between 11 . 5 and 12 . 0** , **where 50 per cent of Holetschek's nebulae**
 相似地 , 之间 - . 5 和 - . - , 在哪里 - 每 中心 的 - 星云
 [ɑː(r); ə(r)][ɪn'kluːdɪd][ɪn] - [lɪst] ,
are included in Hardcastle's list ,
 是 包括 在 - 列表 ,
 同样地, 在 11.5 到 12.0 之间, 霍莱切克星云中有 50% 被包含在哈德卡斯尔的列表中,

[ðə; ði][ˈtəʊt(ə)l][ˈnʌmbə(r)][ˈfɔː(r); fə(r)][ðə; ði][ɪnˈtaɪə(r)][skaɪ][ɪz] [faʊnd] [tuː; tə][biː; bi] - .
the total number for the entire sky is found to be 236 .
 这 全部的 数字 为了 这 全部的 天空 是 成立 到 是 - .
 整个天空的恒星总数为 236。

[ðə; ði] ['greɪtɪst] [ʌn'sɜ:t(ə)nti] [ɪn] [ðɪ:z] ['fɪgəz] [ə'raɪzɪz][frəm; frəm][ðə; ði] [ə'sʌmp[n] [ðæt] [ðə; ði] [tu:]
The greatest uncertainty in these figures arises from the assumption that the two
这 最 不确定 在 这些 数据 出现 从 这 假设 那 这 二
[lɪsts][tə'geðə(r)][ɑ:(r); ə(r)] [kəm'pli:t] [tu:; tə][ðə; ði] [twelfθ] ['mægnɪtju:d] .
lists together are complete to the twelfth magnitude .
列表 一起 是 完全的 到 这 第十二 震级 .

这些数字最大的不确定性来自于假设这两个列表加起来完整到第十二级。

[ðə; ði] ['fɪgəz] [ɑ:(r); ə(r)] ['prɒbəbli] [tu:] [smɔ:l] , [bʌt; bət][nəʊ] ['stændədz] [ɑ:(r); ə(r)][ə'veɪləb(ə)l][baɪ] [wɪtʃ]
The figures are probably too small , but no standards are available by which
这 数据 是 大概 也 小的 , 但 不 标准 是 可用的 经过 哪个
[ðeɪ] [kæn; kən][bi:; bi] [kə'rektɪd] .
they can be corrected .
他们 能 是 已更正 .

这些数字可能偏小，但目前没有标准可以用来修正它们。

[aɪ 'ti:][ɪz] [brɪ'li:vɪd] , [haʊ'evə(r)] ,
It is believed , however ,
它 是 相信 , 然而 ,

然而，人们认为，

[ðæt] [ðə; ði]['erə(r)z][ɑ:(r); ə(r)] ['sɜ:t(ə)nli] [les] [ðæn; ðən] - [pə(r)][sent][ænd; ənd] ['prɒbəbli] [nɒt][mɔ:(r)]
that the errors are certainly less than 50 per cent and probably not more
那 这 错误 是 当然 较少的 比 - 每 中心 和 大概 不是 更多的
[ðæn; ðən] - [pə(r)][sent] .
than 25 per cent .
比 - 每 中心 .

错误率肯定低于 50%，可能不超过 25%。

[ðɪs] [wɪl] [nɒt][bi:; bi] [ɪk'sesɪv] [ɪn] [vju:] [ɒv; əv][ðə; ði][pɒsəb(ə)l] [di:vɪ'eɪfɪnz] [frəm; frəm][ju:nɪfɔ:m]
This will not be excessive in view of the possible deviations from uniform
这 将要 不是 是 过多的 在 看法 的 这 可能的 偏差 从 制服
[dɪstrɪ'bju:ʃn] [weə(r)] [səʊ] ['lɪmɪtɪd] [ə; eɪ][nʌmbə(r)][ɒv; əv]['ɒbdʒɪkts][ɪz] [kən'sɪdəd] .
distribution where so limited a number of objects is considered .
分配 在哪里 所以 有限的 一个 数字 的 对象 是 经过考虑的 .

考虑到对象数量如此有限，分布可能存在偏差，因此这种偏差并不算过分。

[brɪ'jɒnd] - . - [mæg] .
Beyond 12 . 0 mag .
超过 - . - 杂志 .

超过 12.0 倍。

[ðə; ði]['lɪsts] ['kwɪkli] [lu:z] [ðeə(r)]['æspekt][ɒv; əv] [kəm'pli:tnəs] [ænd; ənd] ['kænɒt] [bi:; bi] [ju:st] [fɔ:(r); fə(r)]
the lists quickly lose their aspect of completeness and cannot be used for
这 列表 迅速地 失去 他们的 方面 的 完整性 和 不能 是 用过的 为了
[ðə; ði]['prez(ə)nt] ['pɜ:pəs] .
the present purpose .
这 展示 目的 .

这些清单很快就会失去完整性，无法用于当前目的。

[ðeə(r)][ɑ:(r); ə(r)][ə'veɪləb(ə)l] , [haʊ'evə(r)] ,
There are available , however ,
那里 是 可用的 , 然而 ,

不过，还是有的。

[ðə; ði] [kaʊnts] [baɪ] Fath24 [ɒv; əv] ['nebʊli:] [faʊnd] [ɒn] [plerts] [ɒv; əv] [sɪ'lektɪd] ['eəriəz] [meɪd] [wɪð] [ðə; ði]
the counts by Fath24 of nebulae found on plates of Selected Areas made with the
这 计数 经过 Fath24 的 星云 成立 在 盘子 的 已选 区域 制成 和 这
- - [ɪntʃ] [rɪ'flektə(r)][æt; ət] [maʊnt] ['wɪlsn] .
60 - inch reflector at Mount Wilson .
- - 英寸 反射器 在 山 威尔逊 .

Fath24 对威尔逊山 60 英寸反射望远镜拍摄的选定区域底片上发现的星云进行计数。

[ðə; ði] [iks'pəʊzəz] [wɜ:(r); wə(r)] ['ju:nɪfɔ:mli] - ['mɪnɪts] [ɒn][fɑ:st] [pleɪts] [ænd; ənd]['kʌvə(r)][ðə; ði]['eəriəz][ɪn]
The exposures were uniformly 60 minutes on fast plates and cover the Areas in
这 暴露 是 均匀地 - 分钟 在 快速地 盘子 和 覆盖 这 区域 在
[ðə; ði] ['nɔ:ðən] [skaɪ] [daʊn] [tu:; tə][ænd; ənd] [ɪn'klu:dɪŋ] [ðə; ði] - 15° [zəʊn] .
the northern sky down to and including the - 15° zone .
这 北方 天空 向下 到 和 包括 这 - 15° 区 .
曝光时间统一为 60 分钟，使用快速底片，覆盖北半球天空直至 -15° 区域。

[ðə; ði] ['lɪmɪtɪŋ] [fəʊtə'græfɪk] ['mægnɪtju:d] [fɔ:(r); fə(r)] [stɑ:z] ['ævərɪdʒ] [ə'baʊt] - . [faɪv] .
The limiting photographic magnitudes for stars average about 18 . 5 .
这 限制 摄影 震级 为了 明星 平均的 关于 - . 5 .
恒星的极限照相星等平均约为 18.5。

[ðə; ði] [kaʊnts] [hæv; həv] [bi:n] ['keəfəli] [rɪ'vaɪzɪd] [baɪ] Seares25 [ænd; ənd][ɑ:(r); ə(r)][ðə; ði]['beɪsɪs]
The counts have been carefully revised by Seares25 and are the basis
这 计数 有 到过 小心 修改 经过 Seares25 和 是 这 基础
[fɔ:(r); fə(r)][hɪz; ɪz]['estɪmət; 'estɪment][ɒv; əv] - ,
for his estimate of 300 ,
为了 他的 估计 的 - ,
Seares25 对这些数字进行了仔细修订，并以此为基础估算出 300 人。

- ['nebjʊ.li:] [ɪn][ðə; ði][ɪn'taɪə(r)][skaɪ] [daʊn] [tu:; tə] [ðɪs] ['lɪmɪt] .
000 nebulae in the entire sky down to this limit .
- 星云 在 这 全部的 天空 向下 到 这 限制 .
整个天空中，直至此极限，共有 000 个星云。

[ə'prɒksɪmət] ['lɪmɪtɪŋ] ['təʊt(ə)l] ['mægnɪtju:d] [fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði] ['nebjʊ.li:] [ɪn] [tu:] [ɒv; əv][ðə; ði] ['rɪtʃɪst]
Approximate limiting total magnitudes for the nebulae in two of the richest
近似 限制 全部的 震级 为了 这 星云 在 二 的 这 最富有的
['fi:ldz] ,
fields ,
字段 ,
两个最丰富的星场中星云的近似极限总星等

[es] . [ə; eɪ] . - [ænd; ənd] - , [hæv; həv] [bi:n] [dɪ'tɜ:mɪnd] [frɒm; frəm]['ekstrə] - ['fəʊk(ə)l] [iks'pəʊzəz] [wɪð]
S . A . 56 and 80 , have been determined from extra - focal exposures with
S . 一个 . - 和 - , 有 到过 决定 从 额外的 - 焦点 暴露 和
[ðə; ði] - - [ɪntʃ] [rɪ'flektə(r)] .
the 100 - inch reflector .
这 - - 英寸 反射器 .
SA 56 和 80 是通过 100 英寸反射镜的焦外曝光确定的。

[ðə; ði] [rɪ'zʌlts] [ɑ:(r); ə(r)] - . ['sevən][ɪn] [i:tʃ] [keɪs] , [ænd; ənd] [ðɪs] , [kə'rektɪd] [baɪ][ðə; ði]['nɔ:m(ə)l]
The results are 17 . 7 in each case , and this , corrected by the normal
这 结果 是 - . 7 在 每个 案件 , 和 这 , 已更正 经过 这 普通的
['kʌlə(r)] - ['ɪndeks][ɒv; əv] [sʌtʃ] ['ɒbdʒɪkts] ,
color - index of such objects ,
颜色 - 指数 的 这样的 对象 ,
每种情况下的结果都是 17.7，并且，根据此类物体的正常颜色指数进行校正后，

[gɪvz] [ə; eɪ] ['lɪmɪtɪŋ] ['vɪʒuəl]['mægnɪtju:d][ɒv; əv][ə'baʊt] - . ['sevən] ,
gives a limiting visual magnitude of about 16 . 7 ,
给予 一个 限制 视觉的 震级 的 关于 - . 7 ,
其极限视星等约为16.7，

[wɪtʃ] [kæn; kən][bi:; bi] [ju:st] [fɔ:(r); fə(r)][kəm'pærɪs(ə)n] [wɪð] [ðə; ði] [kaʊnts] [ɒv; əv][ðə; ði] [braɪtə]
which can be used for comparison with the counts of the brighter
哪个 能 是 用过的 为了 比较 和 这 计数 的 这 更亮
['nebjʊ.li:] .
nebulae .
星云 .
可用于与较亮星云的计数进行比较。

[ðə; ði] ['veəriəs] ['dertə][ɑ:(r); ə(r)] [kə'lektɪd] [ɪn]['teɪb(ə)][,ɛks,vi:'aɪə'aɪ] ,
The various data are collected in Table XVIII ,
这 各种各样的 数据 是 集 在 桌子 十八 ,

各项数据汇总于表十八中,

[weə(r)] [ðə; ði] [əb'zɜ:vɪd] ['nʌmbəz] [ɒv; əv]['ekstrə] - [gə'læktɪk] ['neɪbjʊ,li:] [tu;; tə] ['dɪfrənt] ['lɪmɪts][ɒv; əv]
where the observed numbers of extra - galactic nebulae to different limits of
在哪里 这 观察到 数字 的 额外的 - 银河系 星云 到 不同的 限制 的
['vɪʒuəl] ['mægnɪtju:d][ɑ:(r); ə(r)] [kəm'peəd] [wɪð] [ðəʊz] [kəm'pju:tɪd][ɒn][ðə; ði] [ə'sʌmpʃn] [ɒv; əv]['ju:nɪfɔ:m]
visual magnitude are compared with those computed on the assumption of uniform
视觉的 震级 是 比较的 和 那些 计算 在 这 假设 的 制服
[,dɪstrɪ'bju:ʃn] [ɒv; əv]['ɒbdʒɪkts] ['hævɪŋ] [ə; eɪ] ['kɒnstənt] ['æbsəlu:t] [,lu:mɪ'nɒsəti] .
distribution of objects having a constant absolute luminosity .
分配 的 对象 拥有 一个 持续的 绝对 亮度 .

将观测到的、不同视星等极限的河外星云数量与假设物体均匀分布且绝对光度恒定的计算结果进行比较。

[ðə; ði] ['fɔ:mjələ] [ju:st] [fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði][,kɒmpju'teɪ(ə)n][ɪz] (-) { - }
The formula used for the computation is (10) { 46 }
这 公式 用过的 为了 这 计算 是 (-) { - }

计算所用的公式为(10){46}

[weə(r)] [ðə; ði] ['kɒnstənt] [ɪz][ðə; ði]['vælju:][ɒv; əv][lɒg][en][fɔ:(r); fə(r)][,ɛm'ti:] = - .
where the constant is the value of log N for mT = 0 .
在哪里 这 持续的 是 这 价值 的 日志 N 为了 公吨 = - .

其中常数是 mT = 0 时 log N 的值。

[ðə; ði]['vælju:] — [fɔ:(r)] . - [ɪz] [faʊnd] [tu;; tə][fɪt][ðə; ði] [,ɒbzə'veɪʃənl] ['dertə] ['feəli] [wel] .
The value — 4 . 45 is found to fit the observational data fairly well .
这 价值 — 4 . - 是 成立 到 合身 这 观察 数据 相当 出色地 .

数值 -4.45 与观测数据吻合得相当好。

[ðə; ði] [ə'gri:mənt] [bɪ'twi:n] [ðə; ði] [əb'zɜ:vɪd] [ænd; ənd][kəm'pju:tɪd][lɒg][en]['əʊvə(r)][ə; eɪ][reɪndʒ][ɒv; əv]
The agreement between the observed and computed log N over a range of
这 协议 之间 这 观察到 和 计算 日志 N 超过 一个 范围 的
[mɔ:(r)][ðæn; ðən][eit][mæg] . [ɪz] [kən'sɪstənt] [wɪð] [ðə; ði] ['dʌb(ə)] [ə'sʌmpʃn] [ɒv; əv]['ju:nɪfɔ:m][,lu:mɪ'nɒsəti]
more than 8 mag . is consistent with the double assumption of uniform luminosity
更多的 比 8 杂志 . 是 持续的 和 这 双倍的 假设 的 制服 亮度
[ænd; ənd]['ju:nɪfɔ:m] [,dɪstrɪ'bju:ʃn] [ɔ:(r)] ,
and uniform distribution or ,
和 制服 分配 或者 ,

观测到的 log N 值与计算得到的 log N 值在超过 8 星等的范围内吻合，这与均匀光度和均匀分布的双重假设相一致，或者说，

[mɔ:(r)]['dʒen(ə)rəli] , ['ɪndɪkerts] [ðæt][ðə; ði]['densəti] ['fʌŋk(ə)n][ɪz] [ɪndɪ'pendənt] [ɒv; əv][ðə; ði] ['dɪstəns] .
more generally , indicates that the density function is independent of the distance .
更多的 一般来说 , 表示 那 这 密度 功能 是 独立的 的 这 距离 .

更一般地说，这表明密度函数与距离无关。

[ðə; ði][,sɪstə'mætɪk] [dɪ'kri:s] [ɪn][ðə; ði][rɪ'zɪdʒuəlz][əʊ] - [si:] [wɪð] [dɪ'kri:sɪŋ] [,lu:mɪ'nɒsəti][ɪz] ['prɒbəbli]
The systematic decrease in the residuals O - C with decreasing luminosity is probably
这 系统 减少 在 这 残差 哦 - C 和 递减 亮度 是 大概
[wɪ'ðɪn] [ðə; ði] [,ɒbzə'veɪʃənl] ['erə(r)z] ,
within the observational errors ,
之内 这 观察 错误 ,

随着光度降低，残差 O - C 的系统性下降可能在观测误差范围内。

[bʌt; bət][ˌaɪˈtiː][meɪ][ˈɔːlsəʊ][biː; bi][ɪkˈspleɪnd][æz; əz][djuː][tuː; tə][ə; eɪ][ˈklʌstəriŋ][ɒv; əv][ˈneɪbjʊˌliː][ɪn][ðə; ði]
but it may also be explained as due to a clustering of nebulae in the

但 它 可能 还 是 解释 作为 到期的 到 一个 聚类 的 星云 在 这

[vəˈsɪnəti][ɒv; əv][ðə; ði][gəˈlæktɪk][ˈsɪstəm].

vicinity of the galactic system.

附近 的 这 银河系 系统.

但这也可以解释为由于银河系附近星云聚集所致。

[ðə; ði][ˈklʌstə(r)][ɪn][ˈvɜːgəʊ][əˈləʊn][əˈkaʊnts][fɔː(r); fə(r)][æn; ən][əˈpriːjəb(ə)] [pɑːt].

The cluster in Virgo alone accounts for an appreciable part.

这 簇 在 处女座 独自の 账户 为了 一个 值得赞赏 部分.

仅处女座星系团就占了相当大的比例。

[ðɪs][ɪz][ə; eɪ][ˈsekənd] - [ˈɔːdə(r)][ɪˈfekt][ɪn][ðə; ði][ˌdɪstrɪˈbjʊːʃn][ˌhaʊˈevə(r)],

This is a second - order effect in the distribution, however,

这 是 一个 第二 - 命令 影响 在 这 分配, 然而,

但这只是分布中的二阶效应。

[ænd; ənd][wɪl][biː; bi][dɪˈskʌst][æt; ət][lenkθ; lenθ][ɪn][ə; eɪ][ˈleɪtə(r)][ˈpeɪpə(r)].

and will be discussed at length in a later paper.

和 将要 是 讨论 在 长度 在 一个 之后 纸.

这一点将在后续论文中详细讨论。

[ˈteɪb(ə)][ˌɛksˌviːˈɑːrˈɑːɪ]

TABLE XVIII

桌子 十八

表十八

[ˈnʌmbəz][ɒv; əv][ˈneɪbjʊˌliː][tuː; tə][ˈveəriəs][ˈlɪmɪts]

Numbers of Nebulae to Various Limits

数字 的 星云 到 各种各样的 限制

星云数量达到各种极限

[ɛmˈtiː][lɒg][en] * [əʊ] - [siː][lɒg][diː] †

mT log N * O - C log D †

公吨 日志 N * 哦 - C 日志 D †

mT log N* O – C log D†

[əʊ] C8 . [faɪv] - . - - . - +0 . - [faɪv] . - - . - [wʌn] . - - . - . - [faɪv] . - . [faɪv][wʌn] . -

O C8 . 5 0 . 85 0 . 65 +0 . 20 5 . 749 . 0 1 . 08 0 . 95 . 13 5 . 849 . 5 1 . 45

哦 C8 . 5 - . - - . - +0 . - 5 . - - . - 1 . - - . - . - 5 . - . 5 1 . -

[wʌn] . - . - [faɪv] . - - . - [wʌn] . - [wʌn] . - . - [sɪks] . - . [faɪv][wʌn] . - [wʌn] . - . -

1 . 25 . 20 5 . 9410 . 0 1 . 73 1 . 55 . 18 6 . 0410 . 5 1 . 95 1 . 85 . 10

1 . - . - 5 . - - - 1 . - 1 . - . - 6 . - . 5 1 . - 1 . - . -

[sɪks] . - . - [tuːˈtuː] . - [tuːˈtuː] . - + . - [sɪks] . - . [faɪv][tuːˈtuː] . - [tuːˈtuː] . - - . - [sɪks] .

6 . 1411 . 0 2 . 17 2 . 15 + . 02 6 . 2411 . 5 2 . 43 2 . 45 - . 02 6 .

6 . - . - 2 . - 2 . - + . - 6 . - . 5 2 . - 2 . - - . - 6 .

- . - [tuːˈtuː] . - [tuːˈtuː] . - . - [sɪks] . - . ['sevən][faɪv] . - [faɪv] . - - - . - ['sevən] . - (

3412 . 0 2 . 70 2 . 75 . 05 6 . 4416 . 7 5 . 48 5 . 57 - 0 . 09 7 . 38 (

- . - 2 . - 2 . - . - 6 . - . 7 5 . - 5 . - - - . - 7 . - (

- . -) ([sɪks] . -) (['sevən] . -)

18 . 0) (6 . 35) (7 . 64)

- . -) (6 . -) (7 . -)

C8.5 0.85 0.65 +0.20 5.749.0 1.08 0.95 .13 5.849.5 1.45 1.25 .20 5.9410.0 1.73 1.55 .18 6.0410.5 1.95 1.85 .10

6.1411.0 2.17 2.15 + .02 6.2411.5 2.43 2.45 – .02 6.3412.0 2.70 2.75 .05 6.4416.7 5.48 5.57 –0.09 7.38(18.0) (6.35)

(7.64)

* [lɒg][en] = - . [sɪks][ɛmˈtiː] - [fɔːr] . - .

* Log N = 0 . 6 mT - 4 . 45 .

* 日志 N = - . 6 公吨 - 4 . - .

* Log N = 0.6 mT – 4.45。

† [lɒɡ] [di:] = - . [tu:'tu:][ɛm'ti:] + [fɔ:r] . - .
† **Log D = 0 . 2 mT + 4 . 04 .**
† 日志 D = - . 2 公吨 + 4 . - .

† Log D = 0.2 mT + 4.04。

[ˈdɪstənsɪz] [ˌkɒrə'spɒndɪŋ] [tu:; tə][ðə; ði] [ˈdɪfrənt] [ˈlɪmɪtɪŋ] [ˈmæɡnɪtju:d] , [æz; əz] [dɪ'raɪvd] [frəm; frəm]
Distances corresponding to the different limiting magnitudes , as derived from
距离 相应的 到 这 不同的 限制 震级 , 作为 衍生的 从
[ˈfɔ:mjələ] ([eit]) ,
formula (8) ,
公式 (8) ,

根据公式（8）推导出的不同极限量级对应的距离，

[ɑ:(r); ə(r)][ˈɡɪv(ə)n][ɪn][ðə; ði][lɑ:st] [ˈkɒləm] [ɒv; əv][ˈteɪb(ə)][ˌɛks.vi:'aɪ'aɪ'aɪ] .
are given in the last column of Table XVIII .
是 给定 在 这 最后的 柱子 的 桌子 十八 .

列于表十八的最后一列。

[ðə; ði] - ,
The 300 ,
这 - ,

300，

- ['nebjʊ.li:] ['estɪmeɪtɪd] [tu:; tə][ðə; ði][ˈlɪmɪts] [ˌreprɪ'zentɪd] [baɪ][æn; ən] [ˈaʊərz] [ɪk'spəʊzə(r)][ɒn][fɑ:st]
000 nebulae estimated to the limits represented by an hour's exposure on fast
- 星云 估计的 到 这 限制 代表 经过 一个 小时 接触 在 快速地
[plɛrts] [wɪð] [ðə; ði] - - [ɪntʃ] [rɪ'flektə(r)] [ə'prɪə(r)] [tu:; tə][bi:; bi][ðə; ði] [ɪn'hæbətənt] [ɒv; əv] [speɪs] [aʊt]
plates with the 60 - inch reflector appear to be the inhabitants of space out
盘子 和 这 - - 英寸 反射器 出现 到 是 这 居民 的 空间 出去
[tu:; tə][ə; eɪ] [ˈdɪstəns] [ɒv; əv][ðə; ði][ˈɔ:də(r)][ɒv; əv][tu:'tu:] . [fɔ:r] × - ['pɑ:sek] .
to a distance of the order of 2 . 4 × 107 parsecs .
到 一个 距离 的 这 命令 的 2 . 4 × - 秒差距 .

用60英寸反射望远镜在快速底片上曝光一小时所能观测到的000个星云，似乎是距离地球2.4 × 107秒差距范围内的太空居民。

[ðə; ði] - - [ɪntʃ] [rɪ'flektə(r)] , [wɪð] [lɒŋ] [ɪks'pəʊzəz] [ˈʌndə(r)] [ɡʊd] [kən'dɪʃ(ə)nz] , [wɪl] [ˈprɒbəbli] [rɪ:tʃ]
The 100 - inch reflector , with long exposures under good conditions , will probably reach
这 - - 英寸 反射器 , 和 长的 暴露 在下面 好的 状况 , 将要 大概 抵达
[ðə; ði][ˈtəʊt(ə)][ˈvɪʒʊəl][ˈmæɡnɪtju:d] - . - ,
the total visual magnitude 18 . 0 ,
这 全部的 视觉的 震级 - . - ,

在良好条件下进行长时间曝光，100英寸反射望远镜的总视星等可能达到18.0。

[ænd; ənd] [ðɪs] , [baɪ][ə; eɪ] [slɑɪt] [ɪk'stræpə'leɪʃn] ,
and this , by a slight extrapolation ,
和 这 , 经过 一个 轻微 外推法 ,

稍加推断，

[ɪz] ['estɪmeɪtɪd] [tu:; tə] [ˌreprɪ'zent] [ə; eɪ] [ˈdɪstəns] [ɒv; əv][ðə; ði][ˈɔ:də(r)][ɒv; əv][fɔ:r] . 4×107 ['pɑ:sek] [ɔ:(r)]
is estimated to represent a distance of the order of 4 . 4×107 parsecs or
是 估计的 到 代表 一个 距离 的 这 命令 的 4 . 4×107 秒差距 或者
[wʌn] . 4×108 [laɪt] - [j'iəz] ,
1 . 4×108 light - years ,
1 . 4×108 光 - 年 ,

据估计，这代表的距离约为 4.4×10⁷ 秒差距或 1.4×10⁸ 光年。

[wɪ'ðɪn] [wɪtʃ] [ˌaɪ'ti:][ɪz] [ɪk'spektɪd] [ðæt] [ə'baʊt] [tu:] [ˈmɪljən] [ˈnebjʊ.li:] [ʃʊd; ʃəd][bi:; bi] [faʊnd] .
within which it is expected that about two million nebulae should be found .
之内 哪个 它 是 预期的 那 关于 二 百万 星云 应该 是 成立 .

预计其中将发现约两百万个星云。

[ðɪs] { - }
This { 47 }
这 { - }

这{47}

[si:m] [tu:; tə] [ˌreprɪˈzent] [ðə; ði][ˈprez(ə)nt] [ˈbaʊndrɪz] [ɒv; əv][ðə; ði] [əbˈzɜ:vəbl̩] [ˈri:dʒən][θri:][ɒv; əv]
seems to represent the present boundaries of the observable region 3 of
似乎 到 代表 这 展示 边界 的 这 可观察的 地区 3 的
[spɜ:s] .
space .
空间 .

似乎代表了可观测空间区域 3 的当前边界。

[ˈdensəti] [ɒv; əv] [spɜ:s]
DENSITY OF SPACE
密度 的 空间

空间密度

[ðə; ði][ˈdeɪtə][ɑ:(r); ə(r)] [naʊ] [əˈveɪləb(ə)l̩][fɔ:(r); fə(r)] [dɪˈraɪvɪŋ] [ə; eɪ][ˈvælju:][fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði][ˈɔ:də(r)][ɒv; əv]
The data are now available for deriving a value for the order of
这 数据 是 现在 可用的 为了 推导 一个 价值 为了 这 命令 的
[ðə; ði][ˈdensəti] [ɒv; əv] [spɜ:s] .
the density of space .
这 密度 的 空间 .

现在已有数据可以用来推导出空间密度的阶数。

[ðɪs] [ɪz] [əˈkʌmplɪʃt] [baɪ] [mi:nz] [ɒv; əv][ðə; ði] [ˈfɔ:mjʊli:] [fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði] [ˈnʌmbəz] [ɒv; əv] [ˈnebjʊ.li:]
This is accomplished by means of the formulae for the numbers of nebulae
这 是 完成 经过 方法 的 这 公式 为了 这 数字 的 星云
[tu:; tə][ə; eɪ][ˈɡɪv(ə)n] [ˈlɪmɪtɪŋ] [ˈmæɡnɪtju:d][ænd; ənd][fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði] [ˈdɪstəns] [ɪn] [tɜ:mz] [ɒv; əv][ðə; ði]
to a given limiting magnitude and for the distance in terms of the
到 一个 给定 限制 震级 和 为了 这 距离 在 条款 的 这
[ˈmæɡnɪtju:d] .
magnitude .
震级 .

这是通过给定极限星等的星云数量公式和星等与距离的关系公式来实现的。

[ɪn] [ˈnebjʊ.li:] [pə(r)][ˈkju:bɪk] [ˈpɑ:sek] , [ðə; ði][ˈdensəti] [ɪz] (-)
In nebulae per cubic parsec , the density is (11)
在 星云 每 立方体 秒差距 , 这 密度 是 (-)

以每立方秒差距的星云数量表示，密度为（11）

[ðɪs] [ɪz][ə; eɪ][ˈləʊə(r)][ˈlɪmɪt] ,
This is a lower limit ,
这 是 一个 降低 限制 ,

这是下限。

[fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði] [ˈæbsəns] [ɒv; əv] [ˈnebjʊ.li:] [ɪn][ðə; ði] [pleɪn] [ɒv; əv][ðə; ði] [ˈmɪlki] [wei] [hæz; həz] [bi:n]
for the absence of nebulae in the plane of the Milky Way has been
为了 这 缺席 的 星云 在 这 飞机 的 这 乳白色 方式 有 到过
[ɪɡˈnɔ:d] .
ignored .
忽略 .

因为银河系平面上没有星云这一事实被忽略了。

[ðə; ði] ['klərənt] [ˌekspləˈneiʃ(ə)n][ɒv; əv] [ðɪs] [fəˈnɒmɪnən] [ɪn] [tɜːmz] [ɒv; əv][ˌɒbskjʊəˈreiʃən][baɪ] [dɑːk]
The current explanation of this phenomenon in terms of obscuration by dark
这 当前的 解释 的 这 现象 在 条款 的 遮蔽 经过 黑暗的
[klaʊdz] [wɪtʃ] [ɪnˈsɜːkl] [ðə; ði] ['mɪlki] [wei] [ɪz] [səˈpɔːrtɪd] [baɪ][ðə; ði]['ekstrə] - [gəˈlæktɪk][ˈneɪtʃə(r)][ɒv; əv]
clouds which encircle the Milky Way is supported by the extra - galactic nature of
云 哪个 包围 这 乳白色 方式 是 有 经过 这 额外的 - 银河系 自然 的
[ðə; ði] ['neɪbjʊˌliː] ,
the nebulae ,
这 星云 ,

目前对这种现象的解释是，银河系周围的暗云遮蔽了星云，而星云的河外性质也支持这种解释。

[ðəə(r)][ˈdʒen(ə)rəl][ˌsɪməˈlærəti][tuː; tə][ðə; ði][gəˈlæktɪk] ['sɪstəm] ,
their general similarity to the galactic system ,
他们的 一般的 相似 到 这 银河系 系统 ,
它们与银河系的总体相似性，

[ænd; ənd][ðə; ði] ['friːkwənsi] [wɪð] [wɪtʃ] [pəˈrɪfərəl] [belts][ɒv; əv] [əbˈskjʊr] [məˈtɪəriəl][ɑː(r); ə(r)]
and the frequency with which peripheral belts of obscuring material are
和 这 频率 和 哪个 外围 腰带 的 遮蔽 材料 是
[ɪnˈkaʊntəd] [əˈmʌŋ] [ðə; ði][ˈspaɪrəlz] .
encountered among the spirals .
遭遇 之中 这 螺旋 .

以及在螺旋中遇到外围遮蔽物质带的频率。

[ðə; ði] [nəʊn] [klaʊdz] [ɒv; əv] [dɑːk] [ˌneɪbjʊˈləsəti][ɑː(r); ə(r)][ɪnˈtɪəriə(r)] ['fiːtʃəz] [ɒv; əv][ˈaʊə(r)] ['sɪstəm] ,
The known clouds of dark nebulae are interior features of our system ,
这 已知 云 的 黑暗的 星云 是 内部的 特征 的 我们的 系统 ,
已知的暗星云是我们太阳系内部的特征。

[ænd; ənd] [ðeɪ] [duː; də][nɒt] [fɔːm] [ə; eɪ] [kənˈtɪnjuəs] [belt] .
and they do not form a continuous belt .
和 他们 做 不是 形式 一个 连续的 腰带 .
它们并不形成连续的带状结构。

[ɪn][ðə; ði]['riːdʒənz] [weə(r)] [ðeɪ] [ɑː(r); ə(r)] [liːst] [kənˈspɪkjʊəs] , [haʊˈevə(r)] ,
In the regions where they are least conspicuous , however ,
在 这 地区 在哪里 他们 是 至少 显眼的 , 然而 ,
然而，在它们最不显眼的地区，

[ðə; ði]['ekstrə] - [gəˈlæktɪk] ['neɪbjʊˌliː] [əˈprəʊtʃ] ['nɪəriɪst] [tuː; tə][ðə; ði] [pleɪn] [ɒv; əv][ðə; ði] ['mɪlki] [wei] ,
the extra - galactic nebulae approach nearest to the plane of the Milky Way ,
这 额外的 - 银河系 星云 方法 最近的 到 这 飞机 的 这 乳白色 方式 ,
[ˈmeni] ['biːɪŋ] [faʊnd] [wɪˈðɪn] 10° .
many being found within 10° .
许多 存在 成立 之内 10° .

银河系外星云距离银河系平面最近，许多星云距离银河系平面仅 10°。

[ðɪs] [ɪz] [kənˈsɪstənt] [wɪð] [ðə; ði] [haɪˈpɒθəsɪs] [ɒv; əv][ə; eɪ] [pəˈrɪfərəl] [belt][ɒv; əv] [əbˈzɔːpʃ(ə)n] .
This is consistent with the hypothesis of a peripheral belt of absorption .
这 是 持续的 和 这 假设 的 一个 外围 腰带 的 吸收 .
这与外周吸收带的假设相符。

[ðə; ði]['əʊnli] ['pɒzətɪv] [əbˈdʒekʃ(ə)n] [wɪtʃ] [hæz; hæz] [biːn] [ɜːrdʒd][tuː; tə] [ðɪs] [ˌekspləˈneiʃ(ə)n][hæz; hæz]
The only positive objection which has been urged to this explanation has
这 仅有的 积极的 异议 哪个 有 到过 敦促 到 这 解释 有
[biːn] [tuː; tə][ðə; ði] [ɪˈfekt] [ðæt] [ðə; ði][ˌneɪbjʊlə(r)] ['densəti] [ɪz][ə; eɪ][dəˈrekt] ['fʌŋkʃ(ə)n] [ɒv; əv][gəˈlæktɪk]
been to the effect that the nebular density is a direct function of galactic
到过 到 这 影响 那 这 星云 密度 是 一个 直接的 功能 的 银河系
['lætɪtjuːd] .
latitude .
纬度 .

对此解释提出的唯一积极反对意见是，星云密度是银纬的直接函数。

[ə'kju:mjələɪtɪŋ] evidence26 [hæz; həz] [feɪld] [tu:; tə][kən'fɜ:m] [ðɪs] [vju:] [ænd; ənd] ['ɪndɪkeɪts] [ðæt][aɪ'ti:]
Accumulating evidence26 has failed to confirm this view and indicates that it
累积 evidence26 有 失败的 到 确认 这 看法 和 表示 那 它
[ɪz] ['lɑ:dʒli] [dju:] [tu:; tə][ðə; ði] ['ɪnfluəns] [ɒv; əv][ðə; ði] [greɪt] ['klʌstə(r)][ɪn]['vɜ:gəʊ] ,
is largely due to the influence of the great cluster in Virgo ,
是 很大程度上到期的 到 这 影响 的 这 伟大的 簇 在 处女座 ,
越来越多的证据26未能证实这一观点，并表明这主要是由于处女座大星团的影响。

[sʌm; səm] 15° [frɒm; frəm][ðə; ði] [nɔ:θ] [gə'læktɪk][pəʊl] .
some 15° from the north galactic pole .
一些 15° 从 这 北 银河系 极 .
距离银北极约15°。

[ðəə(r)][ɪz][nəʊ] [kɒrə'spɒndɪŋ] [kɒns(ə)n'treɪ(ə)n][ɪn][ðə; ði] ['neɪbəhʊd] [ɒv; əv][ðə; ði] [saʊθ] [pəʊl] . {
There is no corresponding concentration in the neighborhood of the south pole . {
那里 是 不 相应的 专注 在 这 邻里 的 这 南 极 . {
- }
48 }
- }

南极附近没有相应的浓度。{48}

[ɪf] [æn; ən]['aʊtə(r)][belt][ɒv; əv] [əb'zɔ:pj(ə)n] [ɪz] [ə'sju:md] , [wɪt] , [kəm'baɪnd] [wɪð] [ðə; ði] [nəʊn] ['ɪnə(r)]
If an outer belt of absorption is assumed , which , combined with the known inner
如果 一个 外 腰带 的 吸收 是 假定 , 哪个 , 合并 和 这 已知 内
[klaʊdz] ,
clouds ,
云 ,
如果假设存在一个外层吸收带，并且结合已知的内层云，

[əb'skjuəz] ['ekstrə] - [gə'læktɪk] ['nebʊli:] [tu:; tə][ə; eɪ] [mi:n] ['dɪstəns] [ɒv; əv] 15° [frɒm; frəm][ðə; ði][gə'læktɪk]
obscures extra - galactic nebulae to a mean distance of 15° from the galactic
模糊不清 额外的 - 银河系 星云 到 一个 意思是 距离 的 15° 从 这 银河系
[pleɪn] ,
plane ,
飞机 ,
遮蔽了距离银河系平面平均15°范围内的河外星云，

[ðə; ði]['vælju:] [dɪ'raɪvd] [fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði] ['densəti] [ɒv; əv] [speɪs] [mʌst; məst][bi:; bi] [ɪn'kri:st] [baɪ] ['nɪəli] -
the value derived for the density of space must be increased by nearly 40
这 价值 衍生的 为了 这 密度 的 空间 必须 是 增加 经过 几乎 -
[pə(r)][sent] .
per cent .
每 中心 .
计算出的空间密度值必须增加近 40%。

[ðɪs] [wɪl] [nɒt] [tʃeɪndʒ] [ðə; ði]['ɔ:də(r)][ɒv; əv][ðə; ði]['vælju:] ['pri:vɪəsli] [dɪ'tɜ:mɪnd] [ænd; ənd][ɪz] [wɪ'ðɪn]
This will not change the order of the value previously determined and is within
这 将要 不是 改变 这 命令 的 这 价值 之前 决定 和 是 之内
[ðə; ði] [ʌn'sɜ:t(ə)nti] [ɒv; əv][ðə; ði] ['mæsɪz] [æz; əz] [dɪ'raɪvd] [baɪ] - ['meθəd] .
the uncertainty of the masses as derived by Öpik's method .
这 不确定 的 这 群众 作为 衍生的 经过 - 方法 .
这不会改变先前确定的值的顺序，并且在 Öpik 方法得出的质量不确定度范围内。

[ðə; ði] [nju:] ['vælju:][ɪz] [ðen]
The new value is then
这 新的 价值 是 然后
新值则为

- = 9×10 - - ['nebʊli:] [pə(r)]['kju:bɪk]['pa:sek] . (-)
ρ = 9×10 - 18 nebulae per cubic parsec . (12)
- = 9×10 - - 星云 每 立方体 秒差距 . (-)
ρ = 9×10–18 个星云/立方秒差距。(12)

[ðə; ði] [ˌkɒrəˈspɒndɪŋ] [miːn] [ˈdɪstəns] [bɪˈtwiːn] [ˈnebjʊ.liː] [ɪz][ɒv; əv][ðə; ði][ˈɔːdə(r)][ɒv; əv] - , -
The corresponding mean distance between nebulae is of the order of 570 , 000
这 相应的 意思是 距离 之间 星云 是 的 这 命令 的 - , -
[ˈpɑːsek] ,
parsecs ,
秒差距 ,

相应的星云间平均距离约为570,000秒差距。

[ɔːlˈðəʊ] [ɪn] [ˈsevrəl] [ɒv; əv][ðə; ði] [ˈklʌstəz] [ðə; ði] [ˈdɪstənsɪz] [bɪˈtwiːn] [ˈmembəz] [əˈprɪə(r)] [tuː; tə][biː; bi]
although in several of the clusters the distances between members appear to be
虽然 在 一些 的 这 集群 这 距离 之间 成员 出现 到 是
[ə; eɪ] [tenθ] [ɒv; əv] [ðɪs] [əˈmaʊnt] [ɔː(r)] [les] .
a tenth of this amount or less .
一个 第十 的 这 数量 或者 较少的 .
虽然在一些集群中，成员之间的距离似乎只有这个数值的十分之一甚至更少。

[ðə; ði] [ˈdensəti] [kæn; kən][biː; bi] [rɪˈdjuːst] [tuː; tə] [ˈæbsəluːt] [ˈjuːnɪts][baɪ] [ˈsʌbstɪtjuːtɪŋ] [ðə; ði][ˈvæljuː]
The density can be reduced to absolute units by substituting the value
这 密度 能 是 减少 到 绝对 单位 经过 替换 这 价值
[fɔː(r); fə(r)][ðə; ði] [miːn] [mæs] [ɒv; əv][ə; eɪ][ˈnebjələ] , [tuːˈtuː] . $6 \times 10^8 \odot$.
for the mean mass of a nebula , 2 . $6 \times 10^8 \odot$.
为了 这 意思是 大量的 的 一个 星云 , $\frac{2}{2}$. $\frac{6 \times 10^8 \odot}{6 \times 10^8 \odot}$.
密度可以通过代入星云平均质量值 $2.6 \times 10^8 \odot$ 来简化为绝对单位。

[ðen] , [sɪns] [ðə; ði] [mæs] [ɒv; əv][ðə; ði] [sʌn] [ɪn][græmz][ɪz] 2×10^{33} [ænd; ənd][wʌn][ˈpɑːsek][ɪz][θriː] .
Then , since the mass of the sun in grams is 2×10^{33} and 1 parsec is 3 .
然后 , 自从 这 大量的 的 这 太阳 在 克 是 2×10^{33} 和 1 秒差距 是 3 .
 1×10^{18} [ˌsiː ˈem] ,
 1×10^{18} cm ,
 $\frac{1 \times 10^{18}}{1 \times 10^{18}}$ 厘米 ,
那么，由于太阳的质量（以克为单位）为 2×10^{33} 克，1 秒差距为 3.1×10^{18} 厘米，

- = [wʌn] . 5×10^{-31} - - [græmz][pə(r)][ˈkjuːbɪk][ˈsentɪmiːtə(r)] . (-)
 $\rho = \frac{1}{1} \cdot \frac{5 \times 10^{-31}}{5 \times 10^{-31}}$ grams per cubic centimeter . ($\frac{13}{13}$)
- = $\frac{1}{1}$. $\frac{5 \times 10^{-31}}{5 \times 10^{-31}}$ - - 克 每 立方体 厘米 . (-)
 $\rho = 1.5 \times 10^{-31}$ 克每立方厘米。(13)

[ðɪs] [mʌst; məst][biː; bi] [kənˈsɪdəd] [æz; əz][ə; eɪ][ˈləʊə(r)][ˈlɪmɪt] ,
This must be considered as a lower limit ,
这 必须 是 经过考虑的 作为 一个 降低 限制 ,
这必须被视为一个下限。

[fɔː(r); fə(r)] [luːs] [məˈtɪəriəl] [ˈskætəd] [bɪˈtwiːn] [ðə; ði] [ˈsɪstəmz] [ɪz] [ɪnˈtaɪəli] [ɪgˈnɔːd] .
for loose material scattered between the systems is entirely ignored .
为了 松动的 材料 疏散 之间 这 系统 是 完全 忽略 .
对于散布在系统间的松散物质，完全忽略不计。

[ðeə(r)][ɑː(r); ə(r)][nəʊ] [miːnz] [ɒv; əv] [ˈestɪmeɪtɪŋ] [ðə; ði][ˈɔːdə(r)][ɒv; əv][ðə; ði] [ˈnesəsəri] [kəˈrekʃn] .
There are no means of estimating the order of the necessary correction .
那里 是 不 方法 的 估算 这 命令 的 这 必要的 更正 .
目前尚无方法估算所需修正的阶数。

[nəʊ] [ˈpɒzətɪv] [ˈeɪvɪdəns] [ɒv; əv] [əbˈzɔːp](ə)n] [baɪ][ɪnˈtɜː(r)] - [ˈnebjələ(r)][məˈtɪəriəl] , [ˈaɪðə(r)] [sɪˈlektɪv] [ɔː(r)]
No positive evidence of absorption by inter - nebular material , either selective or
不 积极的 证据 的 吸收 经过 间 - 星云 材料 , 任何一个 选择性 或者
[ˈdʒen(ə)rəl] , [hæz; həz] [biːn] [faʊnd] ,
general , has been found ,
一般的 , 有 到过 成立 ,
目前尚未发现星云间物质选择性或普遍吸收的明确证据。

[nɔ:(r)][ʃʊd; ʃəd][wi:; wi][ɪk'spekt][tu:; tə][faɪnd][aɪ 'ti:] [ən'les] [ðə; ði][ə'maʊnt][ɒv; əv] [ðɪs] [mə'tɪəriəl][ɪz] ['meni] **nor should we expect to find it unless the amount of this material is many**
也不 应该 我们 预计 到 寻找 它 除非 这 数量 的 这 材料 是 许多
[taɪmz] [ðæt] [wɪtʃ] [ɪz] ['kɒnsntreɪtɪd] [ɪn][ðə; ði] ['sɪstəmz] .
times that which is concentrated in the systems .
时代 那 哪个 是 集中 在 这 系统 .

除非这种物质的量是系统中浓度的许多倍，否则我们不应该期望找到它。

[ðə; ði][ˈfaɪnaɪt] ['ju:nɪvɜ:s] [ɒv; əv][ˈdʒen(ə)rəl] [relə'tɪvəti]
THE FINITE UNIVERSE OF GENERAL RELATIVITY
这 有限 宇宙 的 一般的 相对论

广义相对论的有限宇宙

[ðə; ði] [mi:n] ['densəti][ɒv; əv] [speɪs] [kæn; kən][bi:; bi] [ju:st] [tu:; tə] [dɪ'tɜ:mɪn] [ðə; ði][daɪ'menʃ(ə)nɪz][ɒv; əv]
The mean density of space can be used to determine the dimensions of
这 意思是 密度 的 空间 能 是 用过的 到 决定 这 方面 的

[ðə; ði][ˈfaɪnaɪt][bʌt; bət] ['baʊndləs] ['ju:nɪvɜ:s] [ɒv; əv][ˈdʒen(ə)rəl] [relə'tɪvəti] .
the finite but boundless universe of general relativity .
这 有限 但 无边无际 宇宙 的 一般的 相对论 .

空间的平均密度可以用来确定广义相对论中有限但无限的宇宙的维度。

[di:] Sitter27 [meɪd] [ðə; ði][k,ælkjʊl'eɪʃənz][sʌm; səm] [j'ɪəz] [ə'gəʊ] , [bʌt; bət] [ju:st] ['vælju:z][fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði]
De Sitter27 made the calculations some years ago , but used values for the
德 Sitter27 制成 这 计算 一些 年 前 , 但 用过的 值 为了 这
['densəti] ,
density ,
密度 ,

De Sitter27几年前就做过这些计算，但他使用的是密度值。

- - - [ænd; ənd][ˈgreɪtə(r)] , [wɪtʃ] [ɑ:(r); ə(r)][ɒv; əv][æn; ən] [ɪn'taɪəli] ['dɪfrənt] ['ɔ:də(r)][frəm; frəm] [ðæt]
10 - 26 and greater , which are of an entirely different order from that
- - - 和 更大的 , 哪个 是 的 一个 完全 不同的 命令 从 那
[ɪndə'keɪtɪd][baɪ][ðə; ði][ˈprez(ə)nt] [ɪn'vestə'geɪʃən] .
indicated by the present investigations .
表明的 经过 这 展示 调查 .

10-26 及以上，这与目前的研究结果完全不同。

[æz; əz][ə; eɪ] ['kɒnsɪkwəns] , [ðə; ði] ['veəriəs] [daɪ'menʃ(ə)nɪz] , [bəʊθ][fɔ:(r); fə(r)] ['sferɪkl] [ænd; ənd]
As a consequence , the various dimensions , both for spherical and
作为 一个 结果 , 这 各种各样的 方面 , 两个都 为了 球形 和
[fɔ:(r); fə(r)][ɪ'lɪptɪk(ə)l] [speɪs] ,
for elliptical space ,
为了 椭圆形 空间 ,

因此，无论是球面空间还是椭圆空间，各种维度都

[wɜ:(r); wə(r)][smɔ:l] [æz; əz] [kəm'peəd] [wɪð] [ðə; ði][reɪndʒ][ɒv; əv] [ɪg'zɪstɪŋ] ['ɪnstɹʊm(ə)nts] .
were small as compared with the range of existing instruments .
是 小的 作为 比较的 和 这 范围 的 现存的 仪器 .

与现有仪器的范围相比，它们规模较小。

[fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði][ˈprez(ə)nt] ['pɜ:pəs] ,
For the present purpose ,
为了 这 展示 目的 ,

就目前而言，

[ðə; ði] ['sɪmplɪfaɪd] [ɪ'kweɪʒnz] [wɪtʃ] [ˈaɪnstəɪn] [hæz; həz] [dɪ'raɪvd] [fɔ:(r); fə(r)][ə; eɪ] ['sferɪkli] [kɜ:vd]
the simplified equations which Einstein has derived for a spherically curved
这 简化 方程式 哪个 爱因斯坦 有 衍生的 为了 一个 球形 弯曲
[speɪs] [kæn; kən][bi:; bi] [ju:st] . - [wen] { - }
space can be used . 28 When { 49 }
空间 能 是 用过的 . - 什么时候 { - }

可以使用爱因斯坦推导出的适用于球面弯曲空间的简化方程。28 当{49}

[ɑ:(r)] , [vi:] , [em] , [ænd; ənd] - [reprɪzənt] [ðə; ði][ˈreɪdiəs][ɒv; əv] [ˈkɜ:vətʃə(r)] , [ˈvɒljʊ:m] , [mæs] , [ænd; ənd]
R , V , M , and ρ represent the radius of curvature , volume , mass , and
拉 , V , M , 和 - 代表 这 半径 的 曲率 , 体积 , 大量的 , 和
[ˈdensəti] ,
density ,
密度 ,

R、V、M 和 ρ 分别代表曲率半径、体积、质量和密度。

[ænd; ənd][keɪ][ænd; ənd][si:] [ɑ:(r); ə(r)][ðə; ði][ˌgrævɪˈteɪʃən(ə)l] [ˈkɒnstənt] [ænd; ənd][ðə; ði] [vəˈlɒsəti] [ɒv; əv]
and k and c are the gravitational constant and the velocity of
和 k 和 c 是 这 引力 持续的 和 这 速度 的
[laɪt] , (-) (-) (-)
light , (14) (15) (16)
光 , (-) (-) (-)

其中 k 和 c 分别是引力常数和光速，(14)(15)(16)

[ˈsʌbstɪtju:tɪŋ] [ðə; ði][ˈvælju:] [faʊnd] [fɔ:(r); fə(r)] - , [wʌn] . 5×10^{-31} , [ðə; ði][daɪˈmenʃ(ə)nz] [bɪˈkʌm]
Substituting the value found for ρ , 1 . 5×10^{-31} , the dimensions become
替换 这 价值 成立 为了 - , 1 . 5×10^{-31} , 这 方面 变得

将求得的 ρ 值 1.5×10^{-31} 代入，则尺寸变为

[ɑ:(r)] = [eit] . 5×10^{28} [si:ˈem] = [tu:ˈtu:] . 7×10^{10} [ˈpɑ:sek] , (-)
R = 8 . 5×10^{28} cm = 2 . 7×10^{10} parsecs , (17)
拉 = 8 . 5×10^{28} 厘米 = 2 . 7×10^{10} 秒差距 , (-)

= 8.5×10^{28} 厘米 = 2.7×10^{10} 秒差距，(17)

[vi:] = [wʌn] . 1×10^{88} [si:ˈem] = [θri:] . 5×10^{32} [ˈkju:bɪk] [ˈpɑ:sek] , (-)
V = 1 . 1×10^{88} cm = 3 . 5×10^{32} cubic parsecs , (18)
V = 1 . 1×10^{88} 厘米 = 3 . 5×10^{32} 立方体 秒差距 , (-)

V = 1.1×10^{88} cm = 3.5×10^{32} 立方秒差距，(18)

[em] = [wʌn] . 8×10^{57} [ˌgræmz] = 9×10^{22} ☉ . (-)
M = 1 . 8×10^{57} grams = 9×10^{22} ☉ . (19)
M = 1 . 8×10^{57} 克 = 9×10^{22} ☉ . (-)

M = 1.8×10^{57} 克 = 9×10^{22} ☉.(19)

[ðə; ði] [mæs] [ˌkɔ:riˈspɒnd] [tu:; tə][θri:] . 5×10^{15} [ˈnɔ:m(ə)l] [ˈnebjʊ.li:] .
The mass corresponds to 3 . 5×10^{15} normal nebulae .
这 大量的 对应 到 3 . 5×10^{15} 普通的 星云 .

该质量相当于 3.5×10^{15} 个普通星云。

[ðə; ði] [ˈdɪstəns] [tu:; tə] [wɪtʃ] [ðə; ði] - - [ɪntʃ] [rɪˈflektə(r)][ʃʊd; ʃəd] [dɪˈtekt] [ðə; ði][ˈnɔ:m(ə)l] [ˈnebjələ]
The distance to which the 100 - inch reflector should detect the normal nebula
这 距离 到 哪个 这 - - 英寸 反射器 应该 探测 这 普通的 星云

[wɒz; wəz] [faʊnd] [tu:; tə][bi:; bi][ɒv; əv][ðə; ði][ˈɔ:də(r)][ɒv; əv][fɔ:r] . 4×10^{75} [ˈpɑ:sek] ,
was found to be of the order of 4 . 4×10^{75} parsecs ,
曾是 成立 到 是 的 这 命令 的 4 . 4×10^{75} 秒差距 ,

经研究发现，100英寸反射望远镜能够探测到正常星云的距离约为 4.4×10^{75} 秒差距。

[ɔ:(r)][əˈbaʊt] $\frac{1}{600}$ [ðə; ði][ˈreɪdiəs][ɒv; əv] [ˈkɜ:vətʃə(r)] .
or about $\frac{1}{600}$ the radius of curvature .
或者 关于 $\frac{1}{600}$ 这 半径 的 曲率 .

或约为曲率半径的 1/600。

[ʌnˈju:ʒuəli; ʌnˈju:ʒəli] [braɪt] [ˈnebjʊ.li:] , [sʌtʃ] [æz; əz][em] - , [kʊd; kəd][bi:; bi] [ˈfəʊtəɡrəˌæfɪd] [æt; ət]
Unusually bright nebulae , such as M 31 , could be photographed at
异常地 明亮的 星云 , 这样的 作为 M - , 可以 是 拍摄 在

[ˈsevrəl] [taɪmz] [ðɪs] [ˈdɪstəns] ,
several times this distance ,
一些 时代 这 距离 ,

像M31这样异常明亮的星云，可以在数倍于此距离的地方被拍摄到。

[ænd; ənd] [wɪð] [ˈriːznəbl] [ɪnˈkriːsɪz; ˈɪŋkriːsɪz][ɪn][ðə; ði] [spiːd] [ɒv; əv] [pleɪts] [ænd; ənd][saɪz][ɒv; əv]
and with reasonable increases in the speed of plates and size of
和 和 合理的 增加 在 这 速度 的 盘子 和 尺寸 的
[ˈtelɪskoʊps] [aɪ ˈtiː] [meɪ] [brˈkʌm] [ˈpɒsəb(ə)l][tuː; tə] [əbˈzɜːv] [æən; ən] [əˈpriːfəb(ə)l] [ˈfrækʃn] [ɒv; əv][ðə; ði]
telescopes it may become possible to observe an appreciable fraction of the
望远镜 它 可能 变得 可能的 到 观察 一个 值得赞赏 分数 的 这
[ˈaɪnstəɪn] [ˈjuːnɪvɜːs] .
Einstein universe .
爱因斯坦 宇宙 .

随着底片速度和望远镜尺寸的合理提高，观测到爱因斯坦宇宙的相当一部分成为可能。

[maʊnt] [ˈwɪlsn] [əbˈzɜːvətɹi]
Mount Wilson Observatory
山 威尔逊 天文台

威尔逊山天文台

[sepˈtembə(r)] -
September 1926
九月 -

1926年9月

[wʌn] [ˌkɑːntrɪˈbjʊːʃnz] [frəm; frəm][ðə; ði] [maʊnt] [ˈwɪlsn] [əbˈzɜːvətɹi] , [nəʊ] . - .
1 Contributions from the Mount Wilson Observatory , No . 324 .
1 贡献 从 这 山 威尔逊 天文台 , 不 . - .
威尔逊山天文台的贡献，第 324 号。

[tuːˈtuː] [ðɪːz] [ɑː(r); ə(r)][ðə; ði] [tuː] [mæɡəˈlæniːk] [klaʊdz] , [em] - , [ænd; ənd][em] - .
2 These are the two Magellanic Clouds , M 31 , and M 33 .
2 这些 是 这 二 麦哲伦 云 , M - , 和 M - .
2 这就是两个麦哲伦星云，M 31 和 M 33。

[θɹiː] [ˈberli] , [ˈhɑːvəd] [ˈæn(ə)lɪz] , - , - .
3 Bailey , Harvard Annals , 60 , 1908 .
3 贝利 , 哈佛大学 志 , - , - .
3 Bailey, 《哈佛年鉴》, 60, 1908 年。

[fɔːr][ˈhɑːrd,kæseɪ] , [ˈmʌnθli] [nˈəʊtɪsɪz] , - , - , - .
4 Hardcastle , Monthly Notices , 74 , 699 , 1914 .
4 哈德卡斯尔 , 月度 通知 , - , - , - .
4 哈德卡斯尔, 《月刊》, 74, 699, 1914。

[faɪv] [ðɪs] [ˈestɪmət; ˈestɪmənt][baɪ] [sɪːrɪz] [ɪz] [berɪst] [ɒn][ə; eɪ][rɪˈvɪʒ(ə)n][ɒv; əv] [fæθs] [kaʊnts] [ɒv; əv]
5 This estimate by Seares is based on a revision of Fath's counts of
5 这 估计 经过 西尔斯 是 基于 在 一个 修订 的 法斯的 计数 的
[ˈneɪbjʊˌliː] [ɪn] [sɪˈlektɪd] [ˈeəriəz] ([ˌɛmˈtiː] . [ˈwɪlsn] [ˈkɑːntər] . ,
nebulae in Selected Areas (Mt . Wilson Contr . ,
星云 在 已选 区域 (公吨 . 威尔逊 控制 . ,
5 Seares 的这一估计是基于对 Fath 在选定区域（威尔逊山天文台）中星云数量的修订。

[nəʊ] . - ; [æstrəʊˈfɪzɪkl] [ˈdʒɜːn(ə)l] , - , - , -) .
No . 297 ; Astrophysical Journal , 62 , 168 , 1925) .
不 . - ; 天体物理学 杂志 , - , - , -) .
第 297 号；天体物理学杂志，62，168，1925)。

[sɪks] “ [ə; eɪ][ˈdʒen(ə)rəl] [ˈstʌdi] [ɒv; əv] [dɪˈfjuːs] [gəˈlæktɪk] [ˈneɪbjʊˌliː] , ” [ˌɛmˈtiː] . [ˈwɪlsn] [ˈkɑːntər] . , [nəʊ] .
6 “ A General Study of Diffuse Galactic Nebulae , ” Mt . Wilson Contr . , No .
6 “ 一个 一般的 学习 的 扩散 银河 星云 , ” 公吨 . 威尔逊 控制 . , 不 .
- ;
241 ;
- ;
6 “弥漫星系星云的一般研究”，威尔逊山天文台，第 241 号；

[ˌæstrəʊˈfɪzɪkl] [ˈdʒɜːn(ə)l] , - , - , - . [ˈsevən]
Astrophysical Journal , **56** , **162** , **1922** : **7**
天体物理学 杂志 , - , - , - : 7

天体物理学杂志，56，162，1922.7

[ðə; ði][ˌklæsɪfrɪˈkeɪ](ə)n][wɒz; wəz] [prɪˈzentɪd] [ɪn][ðə; ði] [fɔːm] [ɒv; əv][ə; eɪ] [ˌmeməˈrændəm] [tuː; tə][ðə; ði]
The classification was presented in the form of a memorandum to the
这 分类 曾是 呈现 在 这 形式 的 一个 备忘录 到 这
[kəˈmɪ](ə)n] [ɒn] [ˈnebʊˌliː] [ɒv; əv][ðə; ði] [ˌɪntəˈnæ(ə)nəl] [ˌæstrəˈnɒmɪk(ə)l][ˈjuːniən][ɪn] - .
Commission on Nebulae of the International Astronomical Union in 1923 .
委员会 在 星云 的 这 国际的 天文 联盟 在 - .

该分类于 1923 年以备忘录的形式提交给国际天文学联合会星云委员会。

[ˈkɒpɪz] [ɒv; əv][ðə; ði] [ˌmeməˈrændəm] [wɜː(r); wə(r)][dɪˈstrɪbjʊːtɪd; ˈdɪstrɪbjʊːtɪd][baɪ][ðə; ði] [ˈtʃeəmən] [tuː; tə][ɔːl]
Copies of the memorandum were distributed by the chairman to all
副本 的 这 备忘录 是 分布式 经过 这 主席 到 全部
[ˈmembəz] [ɒv; əv][ðə; ði] [kəˈmɪ](ə)n] .
members of the Commission .
成员 的 这 委员会 .

主席将备忘录副本分发给委员会所有成员。

[ðə; ði][ˌklæsɪfrɪˈkeɪ](ə)n][wɒz; wəz] [dɪˈskʌst] [æt; ət][ðə; ði] [ˈkeɪmbrɪdʒ] [ˈmiːtɪŋ] [ɪn] - ,
The classification was discussed at the Cambridge meeting in 1925 ,
这 分类 曾是 讨论 在 这 剑桥 会议 在 - ,
该分类曾在1925年的剑桥会议上讨论过。

[ænd; ænd][hæz; həz] [biːn] [ˈpʌblɪʃt] [ɪn][æn; ən] [əˈkaʊnt] [ɒv; əv][ðə; ði] [ˈmiːtɪŋ] [baɪ][ˈmɪsɪz] . [ˈrɒbəts] [ɪn]
and has been published in an account of the meeting by Mrs . Roberts in
和 有 到过 已发布 在 一个 帐户 的 这 会议 经过 太太 . 罗伯茨 在
[ləstrəˌnəmi] , - , - , - .
L'Astronomie , **40** , **169** , **1926** :
《天文学》 , - , - , - .

罗伯茨夫人于 1926 年在《天文学》杂志第 40 卷第 169 页发表了关于此次会议的记述。

[ˈfɜːðə(r)] [kənˌsɪdəˈreɪ](ə)n][ɒv; əv][ðə; ði][ˈmætə(r)][wɒz; wəz] [left] [tuː; tə][ə; eɪ] [ˈsʌbkəˌmɪti] ,
Further consideration of the matter was left to a subcommittee ,
更远 考虑 的 这 事情 曾是 左边 到 一个 小组委员会 ,
该事项的进一步审议交由一个小组委员会负责。

[wɪð] [ə; eɪ][ˌrezəˈluː](ə)n] [ðæt] [ðə; ði] [əˈdɒptɪd] [ˈsɪstəm] [[ʊd; ʃəd][biː; bi][æz; əz] [ˈpjuːəli] [dɪˈskrɪptɪv] [æz; əz]
with a resolution that the adopted system should be as purely descriptive as
和 一个 解决 那 这 已采用 系统 应该 是 作为 纯粹 描述性的 作为
[ˈpɒsəb(ə)] ,
possible ,
可能的 ,

决议指出，所采用的系统应尽可能纯粹地描述事实。

[ænd; ænd] [friː] [frɒm; frəm][ˈeni] [tɜːmz] [səˈdʒestɪŋ] [ˈɔːdə(r)][ɒv; əv] [ˈfɪzɪk(ə)l] [dɪˈveləpmənt] (
and free from any terms suggesting order of physical development (
和 自由的 从 任何 条款 建议 命令 的 身体的 发展 (
[trænˈzækʃnz] [ɒv; əv][ðə; ði][aɪ] . [ə; eɪ] . [juː] . , [tuːˈtuː] , -) .
Transactions of the I . A . U . : 2 , 1925) :
交易 的 这 我 . 一个 . U . , 2 , -) .

并且不包含任何暗示身体发育顺序的词语（国际天文学联合会会刊，2，1925）。

[ˈmɪsɪz] . [ˈrɒbəts] - [rɪˈpɔːt] [ˈɔːlsəʊ] [ˈɪndɪkerts] [ðə; ði] [ˈprefrəns] [ɒv; əv][ðə; ði] [kəˈmɪ](ə)n] [fɔː(r); fə(r)]
Mrs . Roberts ' report also indicates the preference of the Commission for
太太 . 罗伯茨 - 报告 还 表示 这 偏爱 的 这 委员会 为了
[ðə; ði] [tɜːm] “ [ˈekstrə] - [gəˈlæktɪk] ” [ɪn] [pleɪs] [ɒv; əv][ðə; ði][əˈrɪdʒən(ə)l] ,
the term “ extra - galactic ” in place of the original ,
这 学期 “ 额外的 - 银河系 ” 在 地方 的 这 原来的 ,

罗伯茨夫人的报告还表明，委员会更倾向于用“银河系外”一词来代替原词。

[ænd; ənd] [ðen] [ˌnesəˈserəli] [nɒn] - [kəˈmitl] , “ [nɒn] - [gəˈlæktɪk] .
and then necessarily non - committal , “ non - galactic .
和 然后 一定 非 - 入狱 , “ 非 - 银河系 .
然后必然是不置可否的, “非银河系的”。

” [ˈmiːnwaɪl] [keɪ] . [ˈlʌndˌmɑːrk] ,
” **Meanwhile K . Lundmark ,**
” 同时 K . 伦德马克 ,
“与此同时, K. Lundmark,

[huː] [wɒz; wəz][ˈprez(ə)nt][æt; ət][ðə; ði] [ˈkeɪmbɪdʒ] [ˈmiːtɪŋ] [ænd; ənd][hæz; həz] [sɪns] [biːn] [əˈpɔɪntɪd]
who was present at the Cambridge meeting and has since been appointed
WHO 曾是 展示 在 这 剑桥 会议 和 有 自从 到过 任命
[ə; eɪ][ˈmembə(r)][ɒv; əv][ðə; ði] [kəˈmɪʃ(ə)n] ,
a member of the Commission ,
一个 成员 的 这 委员会 ,
他曾出席剑桥会议, 此后被任命为委员会成员。

[hæz; həz][ˈriːs(ə)ntli] [ˈpʌblɪʃt] ([ˈɑːrkɪv][fɔːr] [mætɪmətɪk] , - [pɔk; ɒx] - , [bənd] 19B , [nəʊ] .
has recently published (Arkiv för Matematik , Astronomi och Fysik , Band 19B , No .
有 最近 已发布 (arkiv 毛皮 数学 , - 哦 - , 乐队 19B , 不 .
[eit] ,
8 ,
8 ,
最近出版了 (Arkiv für Matematik、Astronomi och Fysik、Band 19B、No. 8、

-) [ə; eɪ][ˌklæsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n] , [wɪtʃ] , [ɪkˈsept] [fɔː(r); fə(r)] [nəˈmenʃklətʃə(r)] , [ɪz] [ˈpræktɪkli] [aɪˈdentɪk(ə)l]
1926) a classification , which , except for nomenclature , is practically identical
-) 一个 分类 , 哪个 , 除了 为了 命名法 , 是 几乎 完全相同的
[wɪð] [ðæt] [səbˈmɪtɪd] [baɪ][ˌem ˈiː] .
with that submitted by me .
和 那 提交 经过 我 .
1926 年) 的分类, 除了命名法之外, 实际上与我提交的分类完全相同。

[ˈdɑːktər; draɪv] . [ˈlʌndˌmɑːrk] [meɪks] [nəʊ] [eknˈɒlɪdʒmənts] [ɔː(r)] [ˈrefərənsɪz] [tuː; tə][ðə; ði] [dɪˈskʌʃən]
Dr . Lundmark makes no acknowledgments or references to the discussions
博士 . 伦德马克 制作 不 致谢 或者 参考 到 这 讨论
[ɒv; əv][ðə; ði] [kəˈmɪʃ(ə)n] [ˈʌðə(r)][ðæn; ðən] [ðəʊz] [fɔː(r); fə(r)][ðə; ði][juːz][ɒv; əv][ðə; ði] [tɜːm] “ [gəˈlæktɪk] .
of the Commission other than those for the use of the term “ galactic .
的 这 委员会 其他 比 那些 为了 这 使用 的 这 学期 ” 银河系 .
除了使用“银河系”一词之外, 伦德马克博士没有对委员会的讨论做出任何承认或提及。

” [eit][ˈprɔːbləmz][ɒv; əv] [kɒzˈmɒɡəni] [ænd; ənd][ˈstelə(r)][daɪˈnæmɪks] , - .
” **8 Problems of Cosmogony and Stellar Dynamics , 1919 .**
” 8 问题 的 宇宙起源论 和 恒星 动力学 , - .
《宇宙起源和恒星动力学的8个问题》, 1919年。

[naɪn][en] . [dʒiː] . [siː] . - ([em] -) [meɪ] [biː; bi][æŋ; ən] [ɪkˈsepʃ(ə)n] .
9 N . G . C . 4486 (M 87) may be an exception .
9 N . G . C . - (M -) 可能 是 一个 例外 .
9 NGC 4486 (M 87) 可能是一个例外。

[ɒn][ðə; ði][best] [ˈfəʊtəɡræfs] [meɪd] [wɪð] [ðə; ði] - - [ɪntʃ] [rɪˈflektə(r)] , [ˈnjuːməərəs] [ɪkˈsiːdɪŋli] [feɪnt]
On the best photographs made with the 100 - inch reflector , numerous exceedingly faint
在 这 最好的 照片 制成 和 这 - - 英寸 反射器 , 很多的 非常 头晕的
[ˈɪmɪdʒɪz] ,
images ,
图片 ,
在用100英寸反射望远镜拍摄的最佳照片中, 存在大量极其微弱的图像。

[ə'pærəntli] [ɒv; əv] [stɑːz] , [ɑː(r); ə(r)] [faʊnd] [ə'raʊnd][ðə; ði] [pə'rifəri] .
apparently of stars , are found around the periphery .
显然 的 明星 , 是 成立 大约 这 周边 .

显然, 恒星的某些部分位于其边缘。

[aɪ 'tiː][wɒz; wəz] [ə'mʌŋ] [ðiːz] [ðæt] - ['nəʊvə][ɒv; əv] - [ə'priəd] .
It was among these that Belanowsky's nova of 1919 appeared .
它 曾是 之中 这些 那 - 新星 的 - 出现 .

贝拉诺夫斯基 1919 年的新星就诞生于此。

[ðə; ði] [ɑːbzər'veɪʃənz] [ɑː(r); ə(r)] [dɪ'skraɪbd] [ɪn] [ˌpʌblɪ'keɪʃnz] [ɒv; əv][ðə; ði][æstrə'nɒmɪk(ə)l][sə'saɪəti][ɒv; əv]
The observations are described in Publications of the Astronomical Society of

[ðə; ði][pə'sɪfɪk] , - , - , - .
the Pacific , 35 , 261 , 1923 .
这 太平洋 , - , - , - .

观测结果描述于太平洋天文学会出版物, 35, 261, 1923。

- “ [ˈɜːli] ” [ænd; ənd] “ [lɜːt] , ” [ɪn] [spɑːt] [ɒv; əv][ðəə(r)] ['tempərəl] [kɒnə'teɪʃnz] ,
10 “ Early ” and “ late , ” in spite of their temporal connotations ,
- “ 早期的 ” 和 “ 晚的 , ” 在 尽管如此 的 他们的 颞 内涵 ,

10 “早”和“晚”, 尽管它们带有时间上的含义,

[ə'priə(r)] [tuː; tə][biː; bi][ðə; ði][məʊst] [kən'viːniənt] ['ædʒɪktɪvz] [ə'veɪləb(ə)l][fɔː(r); fə(r)] [dɪ'skraɪbɪŋ] ['relatɪv]
appear to be the most convenient adjectives available for describing relative

[pə'zɪʃnz] [ɪn][ðə; ði] ['siːkwəns] .
positions in the sequence .
职位 在 这 顺序 .

似乎是描述序列中相对位置的最方便的形容词。

[ðɪs] ['siːkwəns] [ɒv; əv] ['strʌktʃərəl] [fɔːmz] [ɪz][æn; ən] [əb'zɜːvd] [fə'nɒmɪnən] .
This sequence of structural forms is an observed phenomenon .
这 顺序 的 结构 表格 是 一个 观察到 现象 .

这种结构形式的序列是一种可观察到的现象。

[æz; əz] [wɪl] [biː; bi] [ʃəʊn] ['leɪtə(r)][ɪn][ðə; ði] [dɪ'skʌ(ə)n] , [aɪ 'tiː] [ɪg'zɪbɪts] [ə; eɪ] [smuːð] [prə'greʃ(ə)n] [ɪn]
As will be shown later in the discussion , it exhibits a smooth progression in

[ˈnjuːkliə(r)][ˌluːmɪ'nɒsəti] ,
nuclear luminosity ,
核 亮度 ,

正如稍后讨论中将要展示的那样, 它的核亮度呈现出平滑的变化趋势。

['sɜːfɪs] ['braɪtnəs] , [dɪ'griː] [ɒv; əv] ['flætniŋ] , ['meɪdʒə(r)][da'ɪæmɪtəz] , [ˌrezə'luːʃ(ə)n] , [ænd; ənd]
surface brightness , degree of flattening , major diameters , resolution , and

[kəm'pleksəti] .
complexity .
复杂 .

表面亮度、扁平度、主直径、分辨率和复杂性。

[æn; ən][æntɪ'θetɪk(ə)l][peə(r)][ɒv; əv] ['ædʒɪktɪvz] [dɪ'nəʊtɪŋ] ['relatɪv] [pə'zɪʃnz] [ɪn][ðə; ði] ['siːkwəns] [ɪz]
An antithetical pair of adjectives denoting relative positions in the sequence is

[dɪ'zaɪərəb(ə)l][fɔː(r); fə(r)] ['meni] ['riːz(ə)nz] ,
desirable for many reasons ,
理想 为了 许多 原因 ,

使用一对表示序列中相对位置的对比形容词有很多好处,

[bʌt; bət] [nʌn] [ɒv; əv][ðə; ði] [prə'gresɪv] [ˌkærəktə'rɪstɪks] [ɑ:(r); ə(r)] [wel] [ə'dæptɪd] [fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði]
but none of the progressive characteristics are well adapted for the
但 没有任何 的 这 进步 特征 是 出色地 改编 为了 这
[ˈpɜ:pəs] .
purpose .
目的 .

但这些渐进式特征都不适合用于此目的。

[tɜ:mz] [wɪtʃ] [ə'plai] [tu;; tə][ˈsɪəri:z][ɪn][ˈdʒen(ə)rəl][ɑ:(r); ə(r)][ə'veɪləb(ə)l] , [haʊ'veə(r)] ,
Terms which apply to series in general are available , however ,
条款 哪个 申请 到 系列 在 一般的 是 可用的 , 然而 ,
[ænd; ænd][ɒv; əv] [ði:z] “ [ˈɜ:li] ” [ænd; ænd] “ [leɪt] ” [ɑ:(r); ə(r)][ðə; ði][məʊst][ˈsu:təb(ə)l] .
and of these “ early ” and “ late ” are the most suitable .
和 的 这些 “ 早期的 ” 和 “ 晚的 ” 是 这 最多 合适的 .

其中“早”和“晚”是最合适的。

[ðeɪ] [kæn; kən][bi;; bi] [ə'sju:md] [tu;; tə] [ɪk'spres] [ə; eɪ] [prə'gre(ə)n] [frəm; frəm][ˈsɪmp(ə)l][tu;; tə][ˈkɒmpleks]
They can be assumed to express a progression from simple to complex
他们 能 是 假定 到 表达 一个 进展 从 简单的 到 复杂的
[fɔ:mz] .
forms .
表格 .

可以认为它们表达了从简单到复杂的发展过程。

[æn; ən] [ək'septɪd] [ˈpresɪdənt] [fɔ:(r); fə(r)] [ðɪs] [ˈju:sɪdʒ][ɪz] [faʊnd] [ɪn][ðə; ði][ˈsɪəri:z][ɒv; əv][ˈstelə(r)] [ˈspektrəl]
An accepted precedent for this usage is found in the series of stellar spectral
一个 公认 先例 为了 这 用法 是 成立 在 这 系列 的 恒星 光谱
[taɪps] .
types .
类型 .

这种用法的公认先例可以在恒星光谱类型系列中找到。

[ðeə(r)][ˈɔ:lsəʊ][ðə; ði] [prə'gre(ə)n] [ɪz] [ə'sju:md] [tu;; tə][bi;; bi][frəm; frəm][ðə; ði][ˈsɪmp(ə)l][tu;; tə][ðə; ði]
There also the progression is assumed to be from the simple to the
那里 还 这 进展 是 假定 到 是 从 这 简单的 到 这
[ˈkɒmpleks] ,
complex ,
复杂的 ,

此外，人们也假定发展过程是从简单到复杂。

[ænd; ænd][ɪn] [vju:] [ɒv; əv][ðə; ði] [ɡreɪt] [kən'vi:niəns] [ɒv; əv][ðə; ði] [tɜ:mz] “ [ˈɜ:li] ” [ænd; ænd] “ [leɪt] ,
and in view of the great convenience of the terms “ early ” and “ late ,
和 在 看法 的 这 伟大的 方便 的 这 条款 “ 早期的 ” 和 “ 晚的 ” ,
[ænd; ænd][ɪn] [vju:] [ɒv; əv][ðə; ði] [ɡreɪt] [kən'vi:niəns] [ɒv; əv][ðə; ði] [tɜ:mz] “ [ˈɜ:li] ” [ænd; ænd] “ [leɪt] ,
鉴于“早”和“晚”这两个词的巨大便利性，

“ [ðə; ði] [ˈtempərəl] [kɒnə'teɪnɪz] , [ˈɑ:ftə(r)][ə; eɪ] [fʊl] [kən,sɪdə'reɪ(ə)n][ɒv; əv][ðeə(r)][ˈpɒsəb(ə)l]
” **the temporal connotations , after a full consideration of their possible**
” 这 显 内涵 , 后 一个 满的 考虑 的 他们的 可能的
[ˈkɒnsɪkwənsɪz] , [hæv; həv] [bi:n] [dɪ'lɪbərətli] [ˌdɪsɪ'gɑ:dɪd] .
consequences , have been deliberately disregarded .
结果 , 有 到过 故意地 被忽视 .

“在充分考虑其可能后果之后，时间上的含义已被刻意忽略。”

- [ˌpʌblɪ'keɪnɪz] [ɒv; əv][ðə; ði] [lɪk] [əb'zɜ:vətɪrɪ] , - , - , - .
11 Publications of the Lick Observatory , 13 , 12 , 1918 .
- 出版物 的 这 舔 天文台 , - , - , - .

11 利克天文台出版物，13，12，1918。

- [ɪz] [braɪtə] [ðæn; ðən] N2 .
12 Hβ is brighter than N2 .
- - 是 更亮 比 N2 .

12 Hβ 比 N2 更亮。

[ˈpætɪz] [wɪð] [ˈsɪmələ(r)] [ˈspektrə] [ɑː(r); ə(r)] [ˈɒf(ə)n] [faʊnd] [ɪn] [ðə; ði] [ɑːmz] [ɒv; əv] [leɪt] - [taɪp] [ˈspaɪrəlz] —
Patches with similar spectra are often found in the arms of late - type spirals —
补丁 和 相似的 光谱 是 经常 成立 在 这 武器 的 晚的 - 类型 螺旋 —
[en] . [dʒiː] . [siː] . - ,
N . G . C . 253 ,
N . G . C . - ,

在晚型旋涡星系的旋臂中经常可以发现具有相似光谱的斑块——例如NGC 253。

[em] - , [em] - .
M 33 , M 101 .
M - , M - .

M 33, M 101。

[ðə; ði] [ˈtɪpɪk(ə)l] [ˈplænətri] [ˈspektrəm] , [weə(r)] - [ɪz] [ˈfeɪntə(r)] [ðæn; ðən] N2 ,
The typical planetary spectrum , where Hβ is fainter than N2 ,
这 典型的 行星 光谱 , 在哪里 - 是 较暗 比 N2 ,

典型的行星光谱中, Hβ 比 N2 更暗,

[ɪz] [faʊnd] [ɪn] [ðə; ði] [reə(r)] [keɪsɪz] [ɒv; əv] [əˈpærəntli] [ˈstelə(r)] [ˈnjuːkliəɪ] [ɒv; əv] [ˈspaɪrəlz] ; [fɔː(r); fə(r)] [ˈɪnstəns]
is found in the rare cases of apparently stellar nuclei of spirals ; for instance
是 成立 在 这 稀有的 案例 的 显然 恒星 细胞核 的 螺旋 ; 为了 实例
,
,
,

在旋涡星系中, 一些罕见的、看似恒星状的星系核中可以发现这种现象; 例如,

[ɪn] [en] . [dʒiː] . [siː] . - , - , [ænd; ənd] - .
in N . G . C . 1068 , 4051 , and 4151 .
在 N . G . C . - , - , 和 - .

在 NGC 1068、4051 和 4151 中。

[hɪə(r)] [ˈɔːlsəʊ] [ðə; ði] [ɪˈmɪj(ə)n] [ˈspektrə] [ɑː(r); ə(r)] [ˈləʊkəlaɪzd] [ænd; ənd] [duː; də] [nɒt] [ɪkˈstend] [ˈəʊvə(r)] [ðə; ði]
Here also the emission spectra are localized and do not extend over the
这里 还 这 排放 光谱 是 本地化 和 做 不是 延长 超过 这
[ˈnebjʊ,liː] .
nebulae .
星云 .

这里的发射光谱也是局部的, 不会延伸到整个星云。

- [ˈmʌnθli] [nˈəʊtɪsɪz] . - , - , - .
13 Monthly Notices . 74 , 699 , 1914 .
- 月度 通知 . - , - , - .

13 月刊.74, 699, 1914。

- [ˈænələn] [dɜːr] [ˈwiːnə(r)] - , - , - .
14 Annalen der Wiener Sternwarte , 20 , 1907 .
- 安娜伦 德尔 维纳 - , - , - .

14 《维也纳年鉴》, 1907 年 20 日。

- [æstrəˈnɔːmɪ] [ˈnɑːx,ɪxtən] , - , - , - .
15 Astronomische Nachrichten , 214 , 425 , 1921 .
- 天文 新闻 , - , - , - .

15 《天文学新闻》, 214, 425, 1921。

- [ˌpʌblɪˈkeɪŋz] [ɒv; əv] [ðə; ði] [lɪk] [əbˈzɜːvətɪrɪ] , - , - .
16 Publications of the Lick Observatory , 13 , 1918 .
- 出版物 的 这 舔 天文台 , - , - .

利克天文台出版物 16, 13, 1918 年。

[mi:n] - . - . -
Mean 10 . 44 0 . 12
意思是 - . - . - . -

平均值 10.44 0.12

- [ɛm'ti:] . ['wɪlsn] ['kɑ:ntər] . , [nəʊ] . - ; [æstrəʊ'fɪzɪkl] ['dʒɜ:n(ə)l] , - , - , - .
19 Mt . Wilson Contr . , No . 191 ; Astrophysical Journal , 52 , 162 , 1920 .
- 公吨 . 威尔逊 控制 . , 不 . - ; 天体物理学 杂志 , - , - , - .

19 Mt. Wilson Contr., 第 191 号; 天体物理学杂志, 52, 162, 1920。

- [pi:z] , [ɛm'ti:] . ['wɪlsn] [kəm] . , [nəʊ] . - ; [prə'si:dɪŋz] [ɒv; əv][ðə; ði][ˈnæʃ(ə)nəl] [ə'kædəmi] [ɒv; əv]
20 Pease , Mt . Wilson Comm . , No . 51 ; Proceedings of the National Academy of
- 皮斯 , 公吨 . 威尔逊 通讯 . , 不 . - ; 诉讼程序 的 这 国家的 学院 的

['saɪəns] , [fɔ:r] , - , - .
Sciences , 4 , 21 , 1918 .
科学 , 4 , - , - .

20 Pease, 威尔逊山委员会, 第 51 号; 美国国家科学院院刊, 4, 21, 1918 年。

- [pi:z] , [ɛm'ti:] . ['wɪlsn] [kəm] . , [nəʊ] . - : ['ɪbɪd] . , [tu:'tu:] , - , - .
21 Pease , Mt . Wilson Comm . , No . 32 : ibid . , 2 , 517 , 1916 .
- 皮斯 , 公吨 . 威尔逊 通讯 . , 不 . - : 同上 . , 2 , - , - .

21 Pease, Mt. Wilson Comm., 第 32 号: 同上, 2, 517, 1916 年。

- [æstrəʊ'fɪzɪkl] ['dʒɜ:n(ə)l] , - , - , - .
22 Astrophysical Journal , 55 , 406 , 1922 .
- 天体物理学 杂志 , - , - , - .

22 天体物理学杂志, 55, 406, 1922。

- ['mʌnθli] [n'əʊtɪsɪz] , - , - , - .
23 Monthly Notices , 82 , 133 , 1922 .
- 月度 通知 , - , - , - .

23 月刊, 82、133、1922。

- [æstrə'nɒmɪk(ə)l]['dʒɜ:n(ə)l] , - , - , - .
24 Astronomical Journal , 28 , 75 , 1914 .
- 天文 杂志 , - , - , - .

24 天文杂志, 28, 75, 1914。

- [ɛm'ti:] . ['wɪlsn] ['kɑ:ntər] . , [nəʊ] . - ; [æstrəʊ'fɪzɪkl] ['dʒɜ:n(ə)l] , - , - , - .
25 Mt . Wilson Contr . , No . 297 ; Astrophysical Journal , 62 , 168 , 1925 .
- 公吨 . 威尔逊 控制 . , 不 . - ; 天体物理学 杂志 , - , - , - .

25 Mt. Wilson Contr., 第 297 号; 天体物理学杂志, 62, 168, 1925。

- [ðə; ði][ˈleɪtɪst][ænd; ənd][məʊst][rɪ'laɪəb(ə)l] [rɪ'zʌltz] ['beərɪŋ] [ɒn][ðə; ði] [dɪstrɪ'bju:ʃn] [ɒv; əv][feɪnt] (
26 The latest and most reliable results bearing on the distribution of faint (
- 这 最新的 和 最多 可靠的 结果 轴承 在 这 分配 的 头晕的 (
[hens] [ə'pærəntli] ['dɪstənt]) ['nebjʊ.li:] [ɑ:(r); ə(r)] [faʊnd] [ɪn] - [rɪ'vɪʒ(ə)n][ænd; ənd] [dɪ'skʌʃ(ə)n]
hence apparently distant) nebulae are found in Seares's revision and discussion
因此 显然 遥远) 星云 是 成立 在 - 修订 和 讨论
[ɒv; əv][ðə; ði] [kaʊnts] [meɪd] [baɪ] [fæθ] [ɒn] [plerts] [ɒv; əv][ðə; ði] [sɪ'lektɪd] ['eəriəz] [wɪð] [ðə; ði] - - [ɪnt]
of the counts made by Fath on plates of the Selected Areas with the 60 - inch
的 这 计数 制成 经过 法斯 在 盘子 的 这 已选 区域 和 这 - - 英寸
[rɪ'flektə(r)] .
reflector .
反射器 .

26 关于暗淡（因此显然遥远）星云分布的最新和最可靠的结果，可以在 Seares 对 Fath 使用 60 英寸反射望远镜对选定区域底片进行计数的修订和讨论中找到。

[wen] [ðə; ði] [ˈɪnfluəns] [ɒv; əv][ðə; ði][ˈklʌstə(r)][ɪn][ˈvɜːgəʊ][ɪz] [ɪˈlɪmɪneɪtɪd] [ðə; ði][ˈdensəti] [əˈpriːz] [tuː; tə]
When the influence of the cluster in Virgo is eliminated the density appears to
什么时候 这 影响 的 这 簇 在 处女座 是 已淘汰 这 密度 出现 到
[biː; bi] [ˈrʌfli] [ˈjuːnɪfɔːm][fɔː(r); fə(r)][ɔːl][ˈætɪtʃ,uːdz][ˈgreɪtə(r)][ðæn; ðən][əˈbaʊt] 25° .
be roughly uniform for all latitudes greater than about 25° .
是 大致 制服 为了 全部 纬度 更大的 比 关于 25° .

当消除室女座星系团的影响后，对于大于约 25° 的所有纬度，星系密度似乎大致均匀。

- [ˈmʌnθli] [nˈəʊtɪsɪz] , - , [θriː] , - .
27 Monthly Notices , 78 , 3 , 1917 .
- 月度 通知 , - , 3 , - .

27 月刊, 78, 3, 1917。

- [haːs] , [ɪntrəˈdʌkʃn] [tuː; tə] [θɪəˈretɪk(ə)l] [ˈfɪzɪks] , [tuːˈtuː] , - , - .
28 Haas , Introduction to Theoretical Physics , 2 , 373 , 1925 .
- 哈斯 , 介绍 到 理论 物理 , 2 , - , - .

28 Haas, 《理论物理导论》，第2卷，第373页，1925年。

[-] [nəʊts]
Transcriber's Notes
转录员的 笔记

转录者注释

[tekst] [nəʊts] :
Text notes :
文本 笔记 :

文本注释：

[fɔː(r); fə(r)][ðə; ði][,eɪtʃ tiː em ˈel] [ˈvɜː(ə)n] ,
For the HTML version ,
为了 这 HTML 版本 ,

对于HTML版本，

[peɪdʒ] [ˈnʌmbəz] [ɒv; əv][ðə; ði][əˈrɪdʒən(ə)l] [ˈprɪntɪd] [tekst][ɑː(r); ə(r)] [dɪˈspleɪd] [wɪˈðɪn] [ˈbreɪsɪz][tuː; tə][ðə; ði]
page numbers of the original printed text are displayed within braces to the
页 数字 的 这 原来的 打印 文本 是 显示 之内 牙套 到 这
[saɪd][ɒv; əv][ðə; ði][tekst] .
side of the text .
边 的 这 文本 .

原文的页码显示在文本旁边的括号内。

[ðə; ði] [ˈnʌmbəz] [hæv; həv] [biːn] [ˌriːˈmæpt] [tuː; tə] [stɑːt] [æt; ət][peɪdʒ][wʌn] .
The numbers have been remapped to start at page 1 .
这 数字 有 到过 重新映射 到 开始 在 页 1 .

数字已重新排列，从第 1 页开始。

[ˈfʊtnoʊt] [hæv; həv] [biːn] [ˌɪnˈʌmbəd] [ænd; ənd] [muːvd] [tuː; tə][ðə; ði][end][ɒv; əv][ðə; ði][ˈpeɪpə(r)] .
Footnotes have been renumbered and moved to the end of the paper .
脚注 有 到过 重新编号 和 已搬 到 这 结尾 的 这 纸 .

脚注已重新编号并移至论文末尾。

[ˈteɪblz] [hæv; həv] [biːn] [muːvd] [tuː; tə][əˈvɔɪd] [ˈsplɪtɪŋ] [ˈpærəɡrɑːfs] .
Tables have been moved to avoid splitting paragraphs .
表格 有 到过 已搬 到 避免 分裂 段落 .

表格位置已调整，以避免段落被拆分。

[ɪn][sʌm; səm][keɪsɪz][ðə; ði] [ˈteɪblz] [hæv; həv] [biːn] [ˌriːkənˈfɪɡə] [ɔː(r)][splɪt][ɪn][ˈɔːdə(r)][tuː; tə] [wɜːk]
In some cases the tables have been reconfigured or split in order to work
在 一些 案例 这 表格 有 到过 重新配置 或者 分裂 在 命令 到 工作
[ˈbetə(r)] [wɪð] [iː] - [ˈrɪdə] .
better with e - readers .
更好的 和 e - 读者 .

在某些情况下，表格已被重新配置或拆分，以便更好地与电子阅读器配合使用。

[æz; əz][ə; eɪ] [rɪˈzʌlt] , [peɪdʒ] [ˈnʌmbəz] [meɪ] [nɒt][biː; bi] [ˈækjərət] [fɔː(r); fə(r)] [ˈteɪblz] [ænd; ənd][əˈdʒeɪs(ə)nt]
As a result , page numbers may not be accurate for tables and adjacent
作为 一个 结果 , 页 数字 可能 不是 是 准确的 为了 表格 和 邻近的
[tekst] .
text .
文本 :

因此, 表格和相邻文本的页码可能不准确。

[sʌm; səm][ɒv; əv][ðə; ði][mæθəˈmætɪk(ə)] [ˈkweɪznz] [wɜː(r); wə(r)] [kriˈeɪtɪd] [ˈjuːzɪŋ][teks] [nəʊˈteɪŋ] [ðæt]
Some of the mathematical equations were created using TeX notation that
一些 的 这 数学 方程式 是 创建 使用 TeX 符号 那
[wɒz; wəz] [kənˈvɜːtɪd] [ˈɪntuː][ˌesˈviːˈdʒiː][ˈɪmɪdʒɪz][ˈvaɪə][ðə; ði] tex2svg [ˈfʌŋk(ə)n][ɪn] - .
was converted into SVG images via the tex2svg function in MathJax .
曾是 转换 进入 SVG 图片 通过 这 tex2svg 功能 在 - .
一些数学方程式是用 TeX 表示法创建的, 并通过 MathJax 中的 tex2svg 函数将其转换为 SVG 图像。

[ðə; ði][teks] [nəʊˈteɪŋ] [ɪz] [kənˈteɪnd] [ɪn][ðə; ði][pleɪn][tekst] [ˈvɜːj(ə)n] .
The Tex notation is contained in the plain text version .
这 德州 符号 是 包含 在 这 清楚的 文本 版本 :
TeX 表示法包含在纯文本版本中。

[ɪkˈsept] [æz; əz] [ˈmenʃ(ə)nd] [əˈbʌv] [ˈevri] [ˈefət] [hæz; həz] [biːn] [meɪd] [tuː; tə] [ˈreplɪkeɪt] [ðɪs] [tekst]
Except as mentioned above every effort has been made to replicate this text
除了 作为 提及 多于 每一个 努力 有 到过 制成 到 复制 这 文本
[æz; əz] [ˈfeɪθfəli] [æz; əz][ˈpɒsəb(ə)] ,
as faithfully as possible ,
作为 忠实 作为 可能的 ,
除了上述提及的情况外, 我们已尽一切努力尽可能忠实地复制了本文。

[ɪnˈkluːdɪŋ] [nɒn] - [ˈstændəd] [ˌpʌŋktʃuˈeɪŋ] , [ɪnkənˈsɪstəntli] [ˈhaɪfəneɪtɪd] [wɜːdz] , [ˌet ˈsetərə; ɪt ˈsetərə] .
including non - standard punctuation , inconsistently hyphenated words , etc .
包括 非 - 标准 标点 , 不一致 连字符 字 , ETC .
包括不规范的标点符号、不一致的连字符连接等。

[ðə; ði][əˈrɪdʒən(ə)] [ˈprɪntɪd] [tekst][ɪz][əˈveɪləb(ə)][frɒm; frəm] [ˈhæθɪˌtrʌst] [æt; ət] :
The original printed text is available from HathiTrust at :
这 原来的 打印 文本 是 可用的 从 哈提信托 在 :
原文印刷版可从 HathiTrust 获取:

[ˌertʃiːˈtiːˈpiːˈes] : / / [ˌertʃˈdiːˈel] . [ˈhænd(ə)] . [net] / - / uc1 . b3805680 ([siː] [ˌpiːˈdʒiː] -) .
https : / / hdl . handle . net / 2027 / uc1 . b3805680 (see pg 353) .
https : / / 高密度脂蛋白 . 处理 . 网 / - / uc1 . b3805680 (看 页 -) .
https://hdl.handle.net/2027/uc1.b3805680 (参见第 353 页)。

[ðə; ði] [ˈaʊtlaɪn] “ [ˌklæsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n] [ɒv; əv] [ˈnebjʊˌliː] ” [ˈstartɪŋ] [ɒn][peɪdʒ][θɪriː][ˈlɪsts][en] . [dʒiː] . [siː] .
The outline “ CLASSIFICATION OF NEBULAE ” starting on page 3 lists N . G . C .
这 大纲 “ 分类 的 星云 ” 开始 在 页 3 列表 N . G . C :
- [æz; əz][ə; eɪ] [taɪp] E7 [ˈnebjələ] .
2117 as a type E7 nebula .
- 作为 一个 类型 E7 星云 :
从第 3 页开始的“星云分类”大纲将 NGC 2117 列为 E7 型星云。

[ðə; ði] [ˈvɜːj(ə)n] [ɒv; əv] [ðɪs] [ˈpeɪpə(r)] [ˈprɪntɪd] [ɪn] [ˌkɑːntrɪˈbjʊːnɪz] [frɒm; frəm][ðə; ði] [maʊnt] [ˈwɪlsn]
The version of this paper printed in Contributions from the Mount Wilson
这 版本 的 这 纸 打印 在 贡献 从 这 山 威尔逊
[əbˈzɜːvətɪri] [nəʊ] . - [ˈlɪsts][en] . [dʒiː] . [siː] - .
Observatory No . 324 lists N . G . C 3115 .
天文台 不 . - 列表 N . G . C - .
本文的版本刊登于威尔逊山天文台论文集第 324 号, 其中列出了 NGC 3115。

[ˈʌðəwaɪz] [ðə; ði][ˈpeɪpəz][ɑː(r); ə(r)] [ɪˈsenʃəli] [aɪˈdentɪk(ə)l] .
Otherwise the papers are essentially identical .
否则 这 文件 是 本质上 完全相同的 .
除此之外，两篇论文基本相同。

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

听书破万卷

开口如有神

